



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1185/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1185/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1185/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1185/A

F. VII

1185
A 7/c

Hoepli
May 03

44. a. 10812



ANDREAE
CAESALPINI
ARTIS
MEDICAE.
LIBER VII.

DE MORBIS
Ventris.



ROMAE,
Ex Typographia Aloysii Zannetti
MDCIII.

Superiorum permissu.

AMORPHAE

CATALPINE

ARTIS

MEDICAE.

LIBER VII.

DE MORBIS

VENA.

DE MORBIS
VENA

DE MORBIS

³
ANDREAE

CAESALPINI

ARTIS MEDICÆ

LIBER SEPTIMVS

DE MORBIS VENTRIS.



*Partium naturalium
apparatus. Cap. I.*



ACVLTA
naturalis est po
tentia animæ
vegetatiue, cu
ius actio est ge
neratio sibi si
milis, auctio, & nutritio; Ope
ra sunt particulæ omnes, ea
rundem perfecta magnitudo,
& conseruatio. Materia ge
nerationis quidem appellatur
semen; auctiois autem & nu
tritionis alimentum. Effi
ciens

a

2

ciens

4 *Artis Medicae lib. 7.*

ciens calor innatus, seu spiritus animæ particeps: Calore fit alteratio, ratione animæ perfectio. Animæ vegetatiuæ quatuor facultates famulantur, naturales appellatæ: Attractrix alimenti, Retentrix, Concoctrix, & Expultrix inutilium. horum gratia multorum instrumentorum apparatus opus fuit. Quæ trium generum sunt: Quædam ad coctionem alimenti, quædam ad ductum, quædam ad excrementorum separationem. Ad Coctionem ventres dati sunt, quorum primus Ventriculus, quem ventrem superiorem vocat Galenus, ad ductum alimenti. Intestina, qui venter inferior à Galeno dicitur, (nā in ductu etiam coquitur alimentum) simul & continent excrementa crassa, vt triplicem usum præstent. Primum ad distributionem alimenti veluti via quædam publica, inquam

1. fac. na.
10.

4. vs. pa.
17.

De Morb. Ventr. 5

quam frequentes venæ perueniunt, ad sugendum alimentum. Alterum ad coctionem, quæ in transitu fit. Tertium ad expulsionem excrementorum, quæ relinquuntur post suctionem à venis factam. Ut autem eorum longitudo in aluo contineri posset, circularibus circumuolutionibus accommodata sunt, per Mesenterium pendentia ex dorso; partim gracilia, partim crassa. Gracilia superiora, Duodenum ex ore inferiori ventriculi exortum: Jejunum, Ileum iuxta Umbilicū replicata vsque ad pubem. Crassa interiora iam fæces continent. Cæcum, quod nothæ tantum gratia hominibus datum est, Exiguum. Colon sinuosum ne citius defluant excrementa, incipit ab Ileo iuxta renem dextrum, inde antè sub Ventriculo veluti cingulum tendit ad renem sinistrum. Rectum substantia

a 3 cras-

6 *Artis Medicæ lib. 7.*

crassiori constat, sub rene sinistro ex Colo nascitur, inde flectitur ad spinam, & deorsum prorepit ad exitum excrementorum. Constant tam Intestina, quàm Ventriculus duplici tunica, quarum interna villis rectis constat ad attractionem: externa villis transuersis ad retentionem & expulsionem. Nervos habent, quibus sentiunt, à sexto pari nervorum cerebri. Alterum genus vasorum datum est, quod simul facit ad ductum alimenti, & coctionem in transitu, Venæ & Arteriæ. Venæ latæ duæ, a quibus multi rami sparguntur. Porta & Caua, quarum veluti radicatio in Hepate est. Ex Porta ramuli multi ad intestina, & ventriculum tēdunt vnā cum Arterijs per mesenterium; vnde venæ meseraicæ vocantur, sugentes Chylum, vt ferāt ad Hepar, & interim in sanguinem conuertunt. Ex ijs quædam

De Morb. Ventr. 7

dam faciem sanguinis separāt,
ducentes ad Lienem, vt ex Lie
ne partim in Intestina crassa,
exonerent, partim ad os Ven
triculi superius, vt ad cibi ap
petentiam excitentur. Ad te
nue autem excremētum, quod
in generatione sanguinis fit,
natura instituit Vesicam fel
lis sub Hepate, vt inde exone
retur ad Duodenū intestinū,
& ad excretionem irritet. Ve
na autem Caua ramos in to
tum corpus dispergit, vt simul
cum Arterijs vniuersas par
tes nutrant. Ab eadem Caua
rami quidam insignes ad re
nes tendunt, Venæ emulgen
tes vocatæ, per quas superflua
sanguinis aquositas excerni
tur, vt per vasa vrinaria in Ve
sicam feratur, vnde vrina red
ditur. Prope emulgentes alij
rami cum Arterijs ad Testicu
los descendunt, materiam se
minis ferentes, ideo vasa sper
matica vocata, vt postquā in

a 4 Te-

8 *Artis Medicae lib. 7.*

Testiculis excrementū id separatum fuerit, excernatur per vasa eiaculantia in pudendū. Continentur hæc omnia sub septo Transuerso intra Abdomen. Totam cavitatem ambit Peritonæum membrana, admodum dura, quam tegunt mūscoli Abdominis ad expressionem faccum necessarij. Ventriculo data est prima coctio alimenti, quæ elixationi similis est. Arist. Ideo eget pituita ex Capite, quæ proxima est sanguinis materia. & cibi duriores egent potu, vt soluantur in Chylum, quæ species est pituitæ. Cum autem ventriculi substantia alba sit, frigida & exanguis: Coctio autem à calore fiat: Calorem nativū habet à corde per Arterias: fouet pinguedo Mesenterij, Omenti, Abdominis. Hepar amplectens in dextris, Lien in sinistris. Os superius, qui stomachus vocatur, quæ datur

4. v. s. p. a. 1.

4. Met. 3.

4. v. s. p. a. 9.
8.

De Morb. Ventr. 9

datur cibi ingressus per Oesophagum, prope cor est; Os inferius, vnde datur exitus in Intestina, sub Hepate sitū est. Media cauitas, quæ fundus Ventriculi, vocatur, sub mucronata cartilagine pectoris est ad dorsū supra Renes. Sed oritur dubitatio circa Vētriculi & Intestinorum nutritionem. Cum enim necesse sit omnes partes nutriri sanguine, Venæ meseraicæ non possunt illis sanguinem tribuere, quia datæ sunt vt sugant Chylū, & ferant ad Hepar: simul autem per easdē ferri sursū Chylū & sanguinem deorsum, absurdum est; neque diuersis temporibus: numquam enim Venæ meseraicæ repertæ sūt chylō plenæ, sed semper sanguine: quomodo igitur sugūt Chylū vt omnes fatentur? Præterea, si concoctio ab vnoquoque fit, vt fruatur materia quæ concoquitur: Ventriculus & Intesti.

testina nutrietur Chylo: quod
 a quibusdam conceditur. Nā
 infantes in vtero reperiuntur
 pituitam in ventriculo habe-
 re: quod ab auctore, qui li-
 brum de Principijs cōscripsit,
 2. Ge. 47. 5 adscriptum Hippocrati, puta-
 tum est, quia infans ex vtero
 labijs fugit: quam sententiam
 Aristoteles tribuit Democri-
 to. Sed pituita huiusmodi ex
 capite colligitur, vt Venæ me-
 seraicæ materiam sanguinis
 habeāt, quæ feratur ad Hepar.
 Quod autem sanguis semper
 reperiatur in venis illis, num-
 quam autē materia alba: cau-
 sa est, quia Arteriæ cū Venis
 delatæ per anastomasm san-
 guinem in Venas trāsfundūt,
 vnde Chyli fit cōuersio in san-
 guinem, vt vinum facit aquæ
 mixtum. Hoc modo nulla dif-
 ficultas relinquitur: nutritur
 enim Ventriculus & Intestina
 ex chylosa substantia, quam
 in concoctione eliciunt ex ci-
 bis

De Morb. Vent. II

bis, sed admixtione sanguinis
arterialis, sine quo nulla fit
nutritio. Continue autem fer-
tur sursum per Venas meseraï-
cas ad Hepar materia sangui-
nis, & deorsum per Arterias
sanguis perfectissimus. Huius
gratia Arteriæ numerosiores
his datæ sunt, quam ceteris
partibus, & Omentum retis si-
militudine ex ijs contextum
est, non solum vt nutrentur
Intestina & Vêtriculus, sed e-
tiã vt in illis inciperet sangui-
nis generatio, quam neque Ve-
narum tunica, neque Arteria-
rum, neque Ventriculi, & In-
testinorum substantia alba ef-
ficere possunt: sed sola sangui-
nis arterialis substãtia ex fon-
te caloris innati emanans.

*De Ventriculi & Intestino-
rum affectibus & dolo-
re. Cap. 2.*

Vitia Ventriculi alia sunt
in ingressu cibi, id est
Oesophago, & ore superiori,
alia in egressu, id est ore in-
feriori; alia in fundo. Oeso-
phagi affectus, quibus impe-
ditur deuoratio, vel est tu-
mor, vel compressio à verte-
bris luxatis, vt in Angina: vel
obstructio, vt ex duro aliquo
impacto, aut spina; vel vlcus:
vel sola intemperies sicca: vel
frigida, qua redditur imbecil-
lis ad deuorandum, vt quibus-
dam contigit ex potu aquæ
frigida: alijs ex febre. Sed hæc
pertinent ad morbos Thora-
cis; nam remedia externa ad
spinam dorsi applicanda sunt:
licet stomachus aliquando vo-
cetur.

5. loc. af. 5 *13 Met. 17* *5. lo. af. 7.* Oris ventriculi affectus.
Car-

De Morb. Ventr. 13

Cardialgia, id est Cordis dolor (nam antiquis ob affinitatem Cor appellatum est) Syncope stomachica, Singultus, Conulsio, Comitiales, Melancholiae, Sopores: Suffusiones potius imaginationes suffusionum ob communionem per nervos cum cerebro. Amplius appetitiae deprauatae cibi aut potus, Fames canina, Bulimus, Sitis, Pica, Nausea, Diminutae, quae inappetentia. In fundo ventriculi Cruditas, Tarda coctio, Ciborum corruptio. In Piloro id est ostio inferiori irrationes ad expellendum nunc per alui fluxum, nunc per vomitum, nunc per utramque partem, qui morbus Cholera vocatur. Aut tardus descensus ciborum, unde alius sicca. Sed prius de Dolo-
re agamus.

Ventriculi dolor in ore superiori magis fit, ubi sensus exquisitior, saepe Cordi adscribitur

14 *Artis Medicæ lib. 7.*

bitur ob propinquitatem: unde Cardialgia vocatur, si cum
2. Met. 7. febre, Aet. Causa Solutio continui vel alteratio: licet omnis ad solutionem continui re
2. Catat. 1 ducatur à Gal. Solutionis species, Ruptio, quæ ob distensionem fit ab humore, vel flatu replente: vel ob siccitatem immodicam, at non sine motu distendente, ut à cibis assumptis.

Contusio ab ictu externo, aut duro corpore incubente; ut facit lapis in Vesica. Erosio ex mordente succo, Vermibus. Trall. Alteratio confertim facta à refrigerante, aut calefaciente, aut siccante vel spiritu, vel humore, vel medicamento: per essentiam, si in ventriculo geniti sint, aut maneant. Per consensum, si aliunde ferantur, aut sola qualitas communicetur: ut contingit aliquando ex vulnere capitis

De Morb. Ventr. 15

capitis cum fractura ossis :
signum enim est fracti os-
sis , dolor Ventriculi , aut
vomitus per nervos commu-
nicato solo dolore, non mate-
ria. Simili modo aliquando
conuulsiones fiunt per con-
sensum.

Ex quibus colligi possunt
differentiæ. Exempla: Qui-
dam corripuntur dolore Ven-
triculi ante cibum , sedatur
assumpto cibo. contingit in
Picrocholis ob bilis effusione
in ieiunio. Cum enim Venæ
meseraicæ sugant, nec cibum
inueniant, replentur bile, quā
transfundunt in Vētriculum :
vnde dolor. Quidam statim
assumpto cibo dolent, quod
contingit in sicco ventriculo,
aut vlcere, quia ex motu ex-
citatur solutio continui. Qui-
dam paulo post cibum, nec
sedatur, nisi post coctionem :
Contingit hoc in Hypochon-
driaca passione ob flatum.

Qui-

16 *Artis Medicae lib. 7.*

Quidam post cibum tribus
aut quatuor horis, aliquando
tardius aduenit ob cibi cor-
ruptionem: sedatur vomitu:
aliquando perseverat, quan-
do imbibitur in tunicis. Qui-
dam post somnum ob descen-
sum à capite, sedatur vomitu.
Quidam continuus est,
cum in tunicis continetur: cū
febre in inflammatione Ven-
triculi. Quidam per circuitus
in febrium accessionibus, aut
sine febre ob motū humoris,
aut flatus à quacunque causa.

12. Met. 8 Signa doloris habentur ex re-
latu ægri, nisi infans sit, aut
mens laboret. In infante
eiulatus cum vomitu aut sin-
gultu, aut motus labij infe-
rioris: Pulsus afflictatio. Di-
stinguitur à Colica loco supe-
riori. Si in Oesophago, angus-
tia in deglutiendo, dolor pro-
pe dorsum Si in ore ventricu-
li: in sinistra parte, videtur in
Corde syncope stomachica:

Pul.

De Morb. Ventr. 17

Pulsus afflictatio, Conuulsio.
Si in fundo, dolor sub mucro-
nata cartilagine; ambigit
cum Colica Si in ostio inferio-
ri, dolor in dextra: ambigit
cum Hepate Ileo. Si in ante-
riori parte, tactu sentitur. Si
in posteriori, communicatur
Dorso. Signa affectus Tensio-
nis, Tumor, Durities in Hypo-
chondrio. Si inflammatio, do-
let ad tactum; si ex flatu, Ru- 12. Morb.
gitus, Ructus, Mobilitas, non
Grauitas: infestat per accessio-
nes. Ex humore pituitoso, gra-
uitas noctu magis, Pulsus tar-
dus, rarus, paruus. Vomitus
acidus. Ex inflammatione,
calor, febris non admodum ar-
dens, sitis, deiecta appetentia,
Pulsus durus, dolor cōtinuus,
exacerbatur assumpto cibo:
Vomitus vel deiectio Singul-
tus. Extremorum refrigera-
tio insequitur magnas inflam-
mationes internas. Erosionis,
morsus, singultus, syncope, su-
do-

18 *Artis Medicæ lib. 7*

diores frigidi, pulsus valde par-
ui: Ex bile, vomitus amarus,
12. Met. 8 æruginosus, porraceus. Ex
5. lo. af. 6. atra bile, Vomitus fuscus,
acerbus, acris, obstupefaciēs
dentes. Ex pituita falsa, fitis
ingens, oris falsedo. Ex vermi-
bus, fætor oris peculiaris, vt
in pueris. Vlcera, irritatio ab
5. lor. aff. acidis, austeris. Ex siccitate
extenuatio Abdominis, ali-
quando totius. Sentitur pulsa-
tio sub Vētriculo, in plano ha-
bitu nequaquam, Clydones,
1. dig. pn. 8. idest fluctuatio cum sonitu tã-
quam in vtre, quia vitiatur am-
plexus: & ciborum corruptio.
Si ex proprio affectu, irritatur
5. lo. af. 6. à quacunque vel minima cau-
sa, vt Venere, Vino: imbecilli-
tas, nimius sensus. Per consen-
sum, affligi cum partibus con-
sensum facientibus. Progno-
stica. Inflammatio periculo-
sa, vbi syncopen facit, lethali-
lis. Singultus malus. Ex sic-
12. Met. 3 7. Aph. 3. citate, incurabilis si ex febre
ortum

De Morb. Ventr. 19

ortum ducit. Ceteri difficil-
limi. Ulcera difficillime & lon-
go tempore sanantur. Natu-
maiores omnes pereunt. Ex *s. lo. 4. 5.*
ceteris causis sanantur, bre-
uius ex bile, tardius ex pitui-
ta, difficilior ex atra.

Curatio doloris Ventriculi.

Cap. 3.

Curatio vna ad Sympto-
ma per mitigantia Ano- *s. Simp. 19*
dina: altera ad affectus per sa-
nātia. Anodina vera tutiora ca-
lida in primo gradu tenuium
partiū, rarefaciētia, nullum a-
stringēs etiāsi affectus requi-
rat. Chamæmelum, Anethū,
Althæa, Fœnogræcum. Ex
aqua, aut oleo dulci fouere,
irrigare, inungere. Intus oleū
Amygdalarum dulcium vn-
cijs quatuor vsq; ad sex simul
emollit aluum, aut cochleari-
bus ad solam mitigationem
in omnibus, magis in frigidis.
Anodina falsa periculosa: ybi
vrget

12. *M. 11.8* vrget vehementia, in calidis
 magis. Obstupefacientia fri-
 gida in 4. non valde humida :
 Cicuta sicca, Mādragoræ cor-
 tex, Hyoscyami semen, Opiū:
 admiscenda siccantia calida,
 & odorata ad correctionem.
 Theriaca recens, Philoniū Ro-
 manum, scrupulo vno. Troci-
 sci de stella drachma vna vsq;
 ad duas. Ras. cum vino ad pro-
 fundos dolores, ad affectus Di-
 gerentia flatus, Euacuantia,
 humores, Alterantia qualita-
 tes excedentes: Eligenda quæ
 Ventriculo familiaria Stoma-
 chica vocata non sine astri-
 ctione ad robur ob necessita-
 tem coctionis: odorata pro-
 pter Cordis & Cerebri affinita-
 tem. Inter calida Absynthiū,
 Spica, Cinnamomum, Macis,
 Aloes, Mastiche. Inter frigida
 Rosæ, Flores Labruscæ, Mala
 cotonea.

11. *Meth.*
 16.

Ad flatus digerendos cali-
 da, & siccantia, vulgo Carmi-
 nati-

De Morb. Ventr. 21

natiua, Semen Dauci, Ameos,
Cymini, Anisi, Fæniculi, Co-
riandri, Sefeli, Sampfucum,
Chamæmelum, Anethum,
Lauri folia, Baccæ, Ruta. In-
tus in potu pulueres, vel deco-
cta in vino generoso. Electua-
ria Diatrion pipereon Diani-
sum, Diacyminum, Diaga-
lunga, Cibus paucus, nullus in
accessione, Carnes tostæ, Aui-
culæ cum pipere, Gariophyl-
lis. Extra fomentum ex aqua
& vino generoso incoctis su-
pradictis, & additis Stoma-
chicis astringentibus Sacculi.
Mica panis calidi ex oleo nar-
dino asperso cumino: Cucur-
bitula magna cum multa flā-
ma per horā illico sanat quasi
incantamentum. An aliquan- 12. Met. 8
do flatus per repellentia pro-
pelluntur? præcipue si aliun-
de adueniant? Ad Pituitam,
calefacientia conuenirent, sed
nocent; quia pituitam in flatū
conuertunt: Incidentia, & cō-
co-

22 *Artis Medicae lib. 7.*

coquentia non multum calida, attenuantia. Oxymel 5. Comp. Scylliticum, Decoctum Hyssopi, Origani, Thymi, Euacuatio per vomitum ex decocto Anethi, vel Raphanum cum oxymelite. Hiera ad imbibitos in tunicis, non ea quæ trahunt a lōginquis. Terebynthia vncia semis, vt superbibat vinum generosum. Aqua Tectuccij tribus diebus. Ad reliquias in hyeme Aquæ ardentis vncia vna cum vino maluatico. Decoctio ligni sōis fafras. Extra fouere multum oleo Absynthij, Nardino Mastichino: Inunctio ex oleo nucis muscatæ, Anisi. Panis tostus, & imbutus vino maluatico insperso puluere Gariophyllorum, Absynthio: Ad bilē & omnes humores tenues & aeres, Euacuatio per vomitum abstergentibus sine morfu: aqua tepida, aqua Hordei. Ad eos qui in villis: nil præ-

præstantius Hiera, 5. Ascle- 8. *Catal. 1*
piades exhibebat. Specierum
drachnam vnam cum aqua
frigida vncijs sex ne fieret sub
uersio, non cum melle: Gale-
nus exhibet in pillulis obama-
ritudinem drachmas tres. Si 12. *Mot. 8*
non succedat euacuatio, sanan-
dum per Epicrasim: Alteran-
tibus frigidis & humidis mo-
dice astringentibus ad robur,
& repellendum. Aquæ frigi-
dæ vnciæ quatuor vel sex per
interualla bis vel ter. Postea
cibis reuocandus si perduret
cum animi deliquio: Succus 8. *Catal. 4*
assidue dandus ex Malis coto-
neis, Pyris Mespilis, baccis Iu-
niperi, Pāpinis rosis, Mali pu-
nici nucleum non habentis.
Omphacij succus ex aqua.
Trociscos ex nucleis pineis, se-
minibus Cucumeris, Myrthi
baccis, croco, rosis, bibat ex
aqua. Nardus, & rosæ cum
aqua frigida. Semina Portula-
cæ, Atriplicis, Rumicis syl. la-
ctuca

24 *Artis Medice lib. 7.*

Stuca, althææ, Mastiche. Sy-
ruppus de Ribes de Agresta,
Oxyfacchara. Extra folia vi-
tis viridia, & trita, Mala coto-
nea, Mespilacum cerato, Oleū
rosaceum omphacinum. Myr-
thi folia, Rubi, Lentisci. Portu-
laca subacta cum polenta fri-
gida. Si nimium æstuosi, aqua
frigida in Vescica: Nix, Cucur-
bitarum ramenta, sed nō diu-
tius. Si non succedat per Epi-
craſim, confugiendum ad ob-
stupeſcientia: Aſter ſtoma-
chicus: qui hodie Trociſci de
ſtella. Auic. ad atram bilem.

8. catat. 3

De paſſione Hypochondriaca.

Cap. 4.

8. lo. af. 7. **I**N paſſione Hypochon-
driaca, quam Diocles de-
ſcribit in hunc modum. Af-
ſumpto cibo coctu difficili, &
cauſtico, ſuccedit ſputum hu-
midum & multum, ruſtus aci-
dus, flatus, æſtus in præcor-
dijs

De Morb. Ventr. 25

dijs, postea fluctuatio, aliquan-
do Ventriculi vehementes do-
lores, qui cōcoctis cibis quie-
scūt. sed alijs indigestis reuer-
tuntur aliquando ieiunis. Euo-
munt cibos crudos, pituitam
subamarā, calidā & acidā, vel
quæ aliquando obstupefacit
dentes: Morbus diuturnus, in-
cipit aliquando ab ineunte
ætate. Contingit ob vehemē-
tem caliditatem, in Venis me-
sentericis adurentem sanguinē.

Idem traditur ab Hippocrate 2. *Morb.*

Auante ab eo vocatur, idest
morbus siccatorius: de quo in-
quit. Neque sine cibo esse, ne-
que cibum acceptum tolera-
re potest: Nam sine cibo visce-
ra sugunt, os Ventriculi dolet,
alias alia vomit, exspuit, à qui-
bus aliquantisper melius ha-
bere videtur, sed ubi cibum
assumpsit, ructus, ardor, ru-
bor, deiciēdi cupiditas, solus
flatus prodit, dolor capitis,
punctio veluti ab aciculis mo-

b do

26 *Artis Medice lib. 7.*

do in vna parte, modo in alia.
Crurum grauitas, cōsumptio,
& imbecillitas. Curat autem
in hunc modum. Purgandus
prius per inferiora, postea per
superiora, & à capite. Vomat
post cibum: Abstineat à dul-
cibus, & oleosis, & pinguibus,
ab ebrietate. Lac, & Serum
asininum præbe. Lauit in æsta-
te aqua frigida. Paulo infe-
rius similem morbum tradit,
quem vocat Morbum nigrū,
& similem curationem adhi-
bet. Iterum in libro de Inter-
nis affectionibus in Icteria,
nigra post purgationem Serū,
& Lac Bubulum, aut Caprarū
exhibet. Sed libro 2. de Mor-
bis Lac, & Serum prohibet
spleneticiis. Galenus Lac Asi-
ninum, aut Muliebre, aut Bu-
bulum silicibus incoctum po-
tandum tradit ad atram bi-
lē temperandam, & abluen-
dam. Vnguentum Nardinum
ex aqua potatum, Decoctum
floris

8. *Catat. 4*

De Morb. Ventr. 27

floris Iunci odorati & Rosarū
flore insperso: Portulacæ suc-
cus per se, & cum Nardo oui
Vitellum tostum, & in farinā
comminutum cum polenta.

Amaræ Nuces, Pineæ, semina
Cucumeris. Extra ad mitigā-
das exacerbationes, & disten-
siones in Hypochondriacis,
Spōgia ex aceto calido, Atra-
mentum futorium, & Alumen
cum melle. Aloes cum cerato
Myrthino: Hederæ folia in vi-
no cocta: Bouinum stercus cū
vino. Plantago cum sale, Mar-
rubium cum Pane & Rosaceo.

Si nimis distendatur, sangui-
nis missio, Alui subductio cū
glande: post Hiera in potu. Ho-
die purgamus ex syrappo de
Polypodio: efficacius pillulis
de lapide Lazuli. Antimonio
præparato, vt postea Sero, aut
Lacte mitigetur noxa. Victus
ex ijs quæ difficulter corrup-
puntur, & sunt boni succi. Pa-
nis parum fermentatus, aut

8. Catat. 4

b 2 nihil

28 *Artis Medicae lib. 7.*

nihil: Ex carnibus Venter, Ro-
stra, Pedes, Turdi, Perdices,
Testacea, Cochleæ, Sifarum,
coctum, Bulbi cocti, Beta,
Brassica, Oriza: Ex crudis Ci-
corium, Lactuca, Mala, Mela-
pia, Mala cotonea, Mespila,
Punica, Panis infusus in vino
Granatorum, Ptisana cum eo-
dem, Vinum dulce in atra bi-
le, austerum in flaua.

*De Curatione inflammatio-
nis Ventriculi, siccitatis,
& Vlceris. Cap. 5.*

12. Met. 8 **A**D inflammationem, Ve-
næ sectio, vbi vires valēt.
An vires non valent in synco-
pe? Paul. Aet. Trall non secāt.
Ras. & Auic. secant Basilicam
iteratis vicibus. Vbi non li-
ceat, reuellendum in contra-
ria, aut deriuādum in propin-
qua. Clysteribus, frictionibus
1. Gla. 14. extremorum, Hirudinibus,
Cucurbitulis. Si dolor persi-
stat,

stat, signum est impactum esse
humorem, qui digerentia re-
quirit, non euacuantia per
pharmacum ob cruditatem:
nisi sua sponte concitata id na-
tura expetat. Non vomitu *8. Cat. 3*
Auic. sed leniētibus in initio:
Cassia drachmæ tres, Olei
Amygdalarū dulcium drach-
mæ duæ cum aqua Endiuia,
Solatri, Absynthij. Ras. cum
succo Endiuia singulis diebus
vsque in finem. Syruppi, refri-
gerantes vsque ad 7. De Endi-
uia Rosatus, de succo Aceto-
sæ. Non acida intus, quia mor-
dent. Post 7. digerentia, aqua
Feniculi, Apii, cum succo Ab-
synthia, Troisci de Rosis, Spi-
ca. Cum desinit inflammatio,
Syruppus acetosus. Conco-
cta materia, Gal. exhibet Hie- *8. Cat. 3. 1*
ram. Extra digerentibus ad-
miscenda astringentia, alio-
qui periculum de vita. In prin-
cipio sola astringentia ad re-
pellendum: At sola non per-
b 3 meant

30 *Artis Medicæ lib. 7.*

meant ob profunditatem, ideo præferuntur mixta amaritudini. Absynthium Ponticum in oleo Omphacino, Melino, Mastichino, Lentiscino. Nardinum cum Rosaceo: non Myrthinum ob crassitiem Ceratum, Cera, Nardini vtriusque vncia vna, Aloes, Mastiche vtriusque drachma vna: Omphacii drachma vna: misce cum cerato derafo, cui admisceantur Hypocistis. Oenanthæ, idest Labruscæ germina cum flore. Rhois succus, Cataplasma ex Oenanthæ, Croco, Rosis, Militoto, Mastiche, Succino, Dactylis cum vino Myrthino, & cerato. Aliud ex Malis cotoneis in Vino, aut Aceto coctis, Melle addito, Pipere, Zinzibere. Vigente inflammatione minuenda astringentia, addenda acria, & amara, vt digerant, & euocent: Nardus Cyperus, Iris, Myrrha, Melilotum, Crocum.

Ad

De Morb. Ventr. 31

Ad inueteratam, & duritiem:
Malagma ex Meliloto. *Hodie 8. Catat. 5*
Emplastrum de Meliloto, sed
præcedant fomenta, sequantur
Vngueta. Victus tenuissimus,
ne augeatur inflammatio, vel
cibus corrumpatur. *Raf. fo. 11. Met. 17*
lo potu aquæ Hordei, succus
Granatorū. Rob. & fructibus.
Prohibet confectiones ex mel
le, Auic. concedit Cucurbi-
tam, Atriplicem. Ad vlcera,
si purulenta, abstergere sine
morsu, non Melle, sed lacte,
extinctis calculis, aut Caly-
be. Diosc. Si prohibet febris,
ex aqua Hordei, Ptisana: suc-
co Plantaginis. Eadem ad ve-
neria erodentia, & ad oleum
Vitrioli haustum.
Cū cessauerit inflāmatio, Glu-
tinantia. Bolus Armenus cum
Saccharo rosaceo, Thure, Ma-
stiche, Aloe. Trocisci de Spo-
dio, de Charabe, Cibi diffici-
lis corruptionis ex Vētribus,
Pedibus, Testaceis. Ad solam

oup b 4 ficci-

32 *Arcis Medicae lib. 7.*

siccitatem, si ex frigore, Formêta calida ex Aqua & Oleo. Frictiones Ventriculi. Emollientia, Galbanum, Bdellium ex vino solutum & impositum: oleum Nucis muscatae, Balsamum. Si ex humiditatis consumptione in Atrophia, Fe-

7. Met. 6. bre. Nutrimentum humidum nullum austerum, Lac asininum, Ptisana, Iuscula: In coena reliqua cibaria, Testiculi gallorum, Aloae, Pisces laxatiles, Auiculae. Vinum non vinosum, nam ferit vires imbecilles: Olygophorum, tenue ut penetret angusta. Extra oleum Amygdalarum dulcium, irrigatio Ventriculi ex Oleo dulci, aut decocto Ventrium, capitis Castrati.

De Colica & Iliaca pulsione.
Cap. 6.

Colica à loco dicta, transfertur tamen ad dolores quo.

De Morb. Ventr. 33

quoque tenuium Intestinarum.
 Propria, est constitutio plenioris Intestini diuturna, in qua
 per intervalla fiunt cruciatus intolerabiles. respirationis
 difficultas, sudores, & perfrictiones. In dextris magis,
 forte ob Cæcum Intestinum.
 Causa, pituita frigida, vitrea, quæ vel tactu frigida.
 Flatus in crassis tunicis comprehensus. Ex potu aquæ frigidæ,
 cibis flatuosis in intemperie frigida. Putata Colica,
 dolor Intestinarum ex mordentibus succis. In tenuibus
 Intestinis magis ob fellis vicinitatem. Iliaca passio, Ileos
 ab Ileo Intestino iuxta os Ilij, quod vulgo appellatur *Fianco*:
 unde *Mal di Fianco*. Volvulus à Symptomate dictus
 Chordapfos. Tumor in tenui Intestino, ut videatur chordæ
 modo conuolui: unde dolores vehementissimi, graviter
 vomitibus cruciantes, ut in fi

2. lo. af. 5.

li. Def.

6. lo. af. 2.

9. Met. 1.

1. lo. af. 4.

12. Met. 7

2. Met. 2.

6. lo. af. 2.

b s ne

34 *Artis Medicæ lib. 7.*

ne sterco quoque vomant,
vulgo Miserere mei. Nam
clausio descensum prohibet.
II. Def. Est phlegmone Intestinorum,
quo nec flatus infra, nec deie-
ctiones transmittuntur, sequan-
tur tormina vehementia, &
cruciatus intolerabiles. Pro-
prie est tenuioris Intestini
morbis, aliquando Crassi. Cau-
2. in 3. E- sæ, inflammatio, vel aridi ster-
pi. 6. coris obstructio. Hipp. inquit,
6. lo. aff. 2. Morbus acutus, & periculosus
de Aff. fit, cum sterco aceruatim cõ-
bustus in Intestino pituitam
collegerit, vnde intumescit
Intestinum, neque pharmaca
superne suscipit, sed euomit,
neque infusa inferne admittit.
Aliquando Hernia in causa est,
cum descendit in scrotum
clauditur Intestinum in loco
angusto, vnde collectio Chy-
li. Aliquando stillicidium vri-
6. Aph. 44 næ. Sed modum non videt Gal,
quo vel à pituita fieri possit
obstructio in amplo meatu In-
testi-

De Morb. Ventr. 35

testinarum, vel compressio
à Vesica in stillicidio. An.
Chordapfos dictus est, cum
intorquetur Intestinum con-
uulsis villis, aut per se à pitui-
ta, aut per consensum à stillici-
dio. Ideo febris superueniēs,
& à conuulsione liberat, & à
stillicidio. Contingit in Au-
tumno ob prauos humores in 3. Aph. 22
profundum detrusos. Alibi
Hipp. tres species Voluuli tra Inst. aff.
dit, Icterodes, Hæmatodes,
& Cachexiæ species: quia in
illis superuenire solet. Signa,
Dolores Ventrīs sublimes le- 6. Aph. 7.
uiore, qui non sublimes for-
tiores. Galenus inquit: Qui
in Intestinis & Ventriculo nō
sublimes, sed profundi: qui su-
pra Abdominis membranam
superficiales sunt. Veræ Co-
licæ. dolor veluti à terebra 2. l. a. 5.
perforante, aut palos infixō. Re. af. 3.
quod in tenuibus non contin-
git. Distinguitur à Nephriti-
cis difficillime, quia simul af-
ficiun-

36 *Artis Medicæ lib. 7.*

ficiuntur ob nexum, & quia
tenduntur partes veluti funi-
culus, vnde nec supra ructus;
nec infra flatus, quasi princi-
pium sit Ileï. In Colica dolor
minus fixus, occupans etiam
supra renes, & ad sinistrum ex
dextris iuxta fundum Ventri-

6. lo. af. 2. culi. Excrementa flatuosa,
aquæ supernatantia, similia
stercori Bubulo, Nausea, Vo-
mitus assidui, pituitosi ma-
gis quam in Nephriticis. Cru-
ditas præcedens, & sequens.

2. lo. af. 5. Iuuantur Clysteribus, & eua-
cuationibus pituitæ vitreæ.

12. Met. 8 Circuitus ob flatus. In supe-
riori Intestino dolor remis-
sior: Circa Umbilicum magis
& inferius, mordens. Excre-
menta biliosa, sitis, desinere
solet in dysenteriam. Contingit
tamen e conuerso: à frigi-
dis in superiori, à calidis in
inferiori. Signa Ileï, dolor pro-
fundus in Vêtre infra è regio-
ne Ventriculi: Vomitus mul-
ti,

De Morb. Ventr. 37

ti, potum non continent, quod *2. 13. Epi.*
signum non perpetuum, sed *6.*
malum. 7. Aph. 10. Sed nihil
descendere signum esse perpe-
tuum tradit Galenus, pauca
tamen descendebant in mulie-
re, quam Hipp. recenset in E-
pidemijs. Si Stercus vomant,
clarissimum indicatiū est subti-
lia esse Intestina, nam chylosa
sunt, non crassa. Deiectiones
paucae, crudae: Extrema fri-
gida, Insomnes, non sitibundi.
Signum inflammationis, febris.
Obstruentis stercoris duri-
ties, quae deprehendi potest
Cels. si vtraque manus supra *de Affe.*
summum Vētre[m] imponatur,
& deducatur paulatim. Quod
in crassis Intestinis magis.
Prognostica. Colica vera diu-
turna est: aliquando syncopē
& mortem inducit. In tenui- *2. 16. af. 1.*
bus deterior, quam in crassis:
quia afficit Hepar, & Lienem.
Quibus tormina, & circa Vm *2. 13. Ep. d*
bilicum dolores, & Lumborū
dolor

38 *Artis Medicae lib. 7.*

- dolor, qui neque à medicamē
4. Aph. 11 tis, neque aliter soluitur, in
 Hydropem siccam termina-
 tur. Voluulus omnis pericu-
 losus, sed lethalis, si stercorea
 vomant; vix aliquis seruatus.
6. lo. af. 2. Quibus ex stillicidio Ileos su-
 peruenit, in 7. diebus pereunt,
6. Aph. 44 nisi febre superueniente satis
 Vrina fluxerit: quia febris cō-
4. Aph. 57 uulsionem soluit. Ab Ileo vo-
 mitus, singultus desipientia,
7. Aph. 10 vel conuulsio malum: quia
 replentur superiora Intestina.
 Si Vuluulo amoto febris cor-
 ripiat, desperata salus, nam
3. Morb. forte alius soluta ipsum oc-
 cidet.

Curatio Colicae, & Iliacae.
Cap. 7.

11. Met. 16 **A**D Colicam ex flatu dissi-
 pantia calida, & sicca
 tenuium partium non astring-
 gentia. sed rarefacientia, vt
 spiritus efflent: calida in pri-
 mo

mo vera Anodina. Chamæmelum, Anethum, Althæa, Fæno-græcum, semen Lini, Sapa dulcis, Oleum dulce, Aqua calida, pinguedines recentes non falitæ. In fomentis, Clysteribus, & Cataplasmatis, additis digerentibus, quæ flatum dissoluunt: Semina Dauci, Sese-
li, Sisonis, Ameos, Apij, Anisi, Feniculi, Ruta: Allium, Castorium, Angelicæ radix, Imperatoricæ. Diacyminum, Theriaca: in potu ex vino, aut aquis illatitijs, ex Chamæmelo, Anetho. Iniectiones ex iisdem oleo incoctis, aut solutis, addita pinguedine Anserina recenti, aut Gallinacea. Fomenta Ventrī imponenda humida ex Lixiuio incoctis prædictis. Sacculi ex Milio, Sale, Furfure & Seminibus digerentibus. Aut Cinis calidus in testa, superposita Ruta, Sampsuco: Tandem Cataplasma ex stercore Columbino cocto in vino.

40 *Artis Medicae lib. 7.*

62. Met. 8. no. Si dolor non cesset, Cucurbitula cum flāma copiosa ad Umbilicum illico sanat: vbi ex flatu. Si ex vsu calidorū nō cessat dolor, sed irritatur amplius, cōfugiendum ad Obstupescientia, Colica appellata ceteris opiatīs efficaciora.:
9. Cat. 4. Opij, Castorei, vtriūque fabæ magnitudinē, dissolue in lib. vnā Olei, & pinguedine pro Clysteri: Aut Lanula excipiat, quæ filo appensa intromittatur penitissime. Philonium Tarsense efficacissimum fabæ magnitudine. Philonium Romanū drachmæ duæ ex aqua calida potum. Ad humores crassos, & frigidos attenuantia, & euacuantia, non vehementer calida, ne in flatum conuertant: sed siccantia mediocriter calida in victu magis, Oxymel 5. Comp. cum decocto Hyssopi, Origani, Serpilli. Euacuantia per Clysteres, oleum Rutaceum, nam trahit

De Morb. Ventr. 41

trahit pituitam vitream, addi-
ta Sapa, aut Vino generoso:
Centauri decoctum, Colocyn-
this, Agaricus, Diaphinicon,
Benedicta, Hiera picra; Hie-
ralogodion addita in Clyste-
ri. In potu Diaphinicon cum
aqua Chamæmeli. Pillulæ ag-
gregatiuæ, Aqua Porrettæ,
Tectucci abluunt & siccant *12. Met. 7*
Intestina. Galenus inquit: Ge-
nerosi, & fortes abstinent à Ca-
taplasmate & Clysteribus so-
lo victu contenti. Panis deco-
ctus cum Aniso, Anetho, Apij
radice, Pipere, Auiculæ mon-
tanæ, Ptisana cum Pipere, A-
mygdalis, Porro. Rustici reme-
dium. Cingere Ventrem, co-
medere Allia cum Pane, nihil
bibere, labores cōsuetos exer-
cere: vesperi Vinum bibere,
generosum meracius, sine ci-
bo dormire. Ne reuertatur *9. Cat. 4*
affectus. Gallinarum in tera-
nea omnia in fictili assata, tri-
ta, & reposita. dosis drachma
vna

42 *Artis Medicae lib. 7.*

vna, & semis cum Dauci cre-
tici tantundem ex aqua mul-
ta in potu. Aliud. Ameos dra-
chmas sex: Apij drachmas
quinque: Dauci Cretici drach-
mas duas: Piperis albi drach-
mam vnam: puluere vtatur
in condimentis. Potio ex Sa-
lice bibenda per annum in sin-
gulis mensibus triduo. Reci-
pit Corticis Salicis viridis
drachmas quinque, Zinzibe-
ris, Piperis albi vtriusque dra-
chmas quatuor, Dactylorum
numero tres, Rutæ viridis ra-
mos quinque, coque in aqua
pluuia ad tertias. Dosis vn-
ciæ quatuor. Allia in Vino
Falerno cocta Recipit. Cor-
nu cerui tenerrimi vsti co-
chlearia tria: Piperis albi gra-
na decem, Myrrhæ parum
odoris gratia: Cochlearum
testa: omnia trita decoquan-
tur: bibitur tribus diebus. An
valide siccantia sine morfu cū
quadam astrictione, Intestina
tuen.

De Morb. Ventr. 43

tuentur? Ad Colicam ex Cal-
lidis humoribus, & morden-
tibus, contemperantia per fri-
gida & humida: & Euacuan- *12. Met. 7*
tia sæpius repetita. Alterant
cibi actu & potestate frigidi,
& qui difficiles ad corrumpē-
dum: Halica magis quam
Ptisana: Intubus Lactuca. Pu-
nica, Pira, Cucumis. Pisces
duræ carnis, Polypus: Ostra-
codermata, pedes Bubuli
Paul. Vinum Austerū, Rhois
cremor dilutus, vbi suspitio
est Dysenteriae. Sy. rosatus,
Violatus, de Papauere, Aceto-
sus. Aqua Hordei, Capillorū
Veneris: Aqua frigida in Ae-
state sitibundis: Opiata tum *Ibid. 7. 8.*
ratione doloris, tum causæ. *1. lo. af. 4.*
nam irritantur à calorificis
tum intus, tum extra, etiam si
sint vera Anodyna. Euacuan-
tia ex Hieracurauit Galen.
quendam diebus quindecim.
Cassia cum speciebus Hieræ.
Sy. rosatus solutinus. Sena in
Sero

44 *Artis Medicæ lib. 7.*

Sero Lactis, Aqua Tectucci,
Serum vaccinum, Clysteres
ex decocto Violarum, Maluæ,
Beta, Parietariæ.

6. Aph. 36 Ad Voluulum ex inflam-
matione, Venæ sectio: Ex pe-
dis interna, quæ simul ad stil-
licidium facit, vel ex poplite,
sed ab initio ex interna cubi-
ti ad reuellendum: postea etiã
ex Hæmorrhoidibus, Cucur-
bitulis in Dorso, Clysteres ex
oleo Rosaceo, Chamæmelino,
vel decocto Fanogræci, Al-
thæ, Cassia. Exterius inun-
gere ex Oleo rosaceo Chamæ-
melino, Pinguedine Anatis.
Per superiora nec medicamen-
ta, nec alterantes potiones ob-
vomitum. Sed victus virium
ratione tenuissimus, Ptisana,
aqua Hordei. Si ex stercore
duriori, Lubricantia: Clyste-
res ex Oleo, Butyro, oleum
seminis Lini. Victus humidus
ex Malua cum Oleo, Ius Gal-
li. Trall. Catapotia ex Plum-
bo,

De Morb. Ventr. 45

bo, ut pōdere deoluatur deorsum. Intromissio flatus per fistulam, ut distendantur Intestina, mox Clyster intromittatur ex hydraleo, ac nitro. Idē Hipp. inquit: Hunc humectare *De Af.* oportet, & intrinsecus & extrinsecus, & multa calida lauare, & bibenda dare quæ aluum mouent, & vrinam subducunt. Eundem morbum cui *4. Acu. 103* rat in Cholera arida, inquit *104.* enim: Ab arida Cholera Venter inflatur, strepitus fiunt, & dolor tum laterum, tum lumborum, nihilq. aluus deijcit, sed astringitur. Ita affectum ne vomat, seruato, venterque subducatur. Clysterē ergo ex calido & perquam pingui adhibebis, perunctumque in calidam aquam demittes, & quā plurimam in Scapha reclinās sensim perfundes. Perfusio enim efficacior est quam simplex lauatio. Facit & ad inflammationem, ut in Peripneumonia.

46 *Artis Medica lib. 7.*

monia. Si ex stillicido, aut ner-
uis contractis: Oleum dulci-
finum valde calidum bibitū,
& infusum præcipue oleum
Amygdalarum dulcium, addi-
ta Terebinthina vsque ad vn-
ciam semis: Balneum relaxās
in Hydræleo incoctis Anody-
nis. Liber de Paratu facilibus
ad Solonem, tradit sanatum
quendam, qui stercora vome-
bat, balneo: & oleo Anethino
bibito, vt postea esitaret
micas calidas, ne euomat.
Sic sanatum principem in A-
sia. Si calfacto Venter subdu-
citur, morbus solutus est.

2. Pa. fa.
32.

De vitijs appetentia.

Cap. 8.

Appetentia pertinet ad fa-
cultatem attractricem
cibi vel potus. Fames & sitis
vtriusque inappetentia inno-
minata est. Symptomata sunt
sy. dif. 4. facultatis naturalis, quæ sine
co-

cognitione agit. Animalis quoque. Nam quinque Symptomata ordine sequuntur. Vacuatio: vacuatorum appetentia naturalis; Ventriculi suctus, idest vehemens attractio; nam in ieiunio viscera fugunt, Hipp. Suctionis sensus. Appetentia animalis. Inappetentia causa, seu amissa, seu diminuta, amissio, aut diminutio, sensus, vel ob magnam intemperiem in febre maligna, in inflammatione Ventriculi, in Paralyfi. Non fieri suctum, aut imbecillem, ob flauam bilem relaxantem; Nauseam, Ulcus. Non euacuari corpus ob densitatem, ocium, victum delitiosum. Appetentia virosae excedentis modum secundum quantitatem, quae fames Canina vocatur, & Bulimus; causa est, vel sola frigiditas, vel succus acidus in ore Ventriculi, qui affectum suctui similem facit, & appetentiam

1. Sy. ca. 8

2. Mor.

48 *Artis Medicae lib. 7.*

tiam calidi, & sicci, quæ fa-
mes est, non frigidi, & humidi,
quæ sitis est. Aut immodica
digestio in toto ob caloris ro-
bur, raritatem corporis, vnde
fames naturalis, vt instauretur
deperditum. Vel ob vermem
latum Trall. absumentem ali-
mentum; Aut ob retentricis
imbecillitatem, in Lienteria.

1. *Gla. 14.* Vulimus, seu Vulimia adiun-
ctum habet animi deliquium;
indigentia simul, & imbecil-
litas, & refrigeratio oris Ven-

1. *Sy. ca. 7.* triculi. Trall. calorem, vt in
febre aliquando voracitas,
quia expetunt expleri, sed vi-
rium imbecillitas non fert.

2. *Aph. 21* Gal. inquit, vehemens esuri-
tio, quam Græci Bulimon vo-
cant, est casus potentia ex fri-
gore exteriori, quæ a fame
quidem ortum duxit, sed eam
amplius non habet. Desinit
autem fames, vt reliquæ facu-
tates ob magnam intemperie
quancumque. Hipp. inquit,

4. *in 6. E-
pi. 13.*

Aqua,

Aqua edax, vigilia edax. Aqua quidem ob refrigerationem Ventriculi: Vigilia ob totius euacuationem. sic labores. Appetentia excedens modum in qualitate Citta. Grace vocatur, Cittaſis Celſo, Latine Picatio. Appetunt aliena maxime acuta, acerba, acria, vt Carbones, Terram, Cimoliam, Teſtas: Obnoxia *i. ſy. c. 7.* vterog gerentes à ſecundo menſe, vſque ad tertium: Pueri, aliquando viri Lienoſi ob ſuccos vitioſos, putantur ob ſimilitudinem cum ſuccis appeti: An quia ſentiunt aliquam vtilitatem: vt aues ex lapillis? Siſis imminuta, aut deperdita cauſa: vel ſenſus laſio in febribus malignis, vel exceſſus humoris frigidi in diſtillationibus pituita. Deprauata in quantitate: Feruor, aut ob ſuccum bilioſum, aut falſum: aut febrilem caliditatem. Nimiſia humidi reſolutio, euacua
c tio

30 *Artis Medicæ lib. 7.*

tio in sudoribus, purgationibus, Diabete. Inexplebilis fitis ex Dipfade, Vipera, comestis, aut ictu. Ex Vino veteri ad ebrietatem, Aqua marina, Febre ardente. Deprauata in qualitate, vt cupiant aliena in potu, succorum prauitas in causa est, vt qui longo tempore vsi sunt vitiosis. Intemperies calida Ventriculi inappetentiam cibi facit, laxando solida, vnde imbecilliora ad trahendum, & liquando replet. Appetentiam autem potus, qui feruorem extinguat. Frigiditas opposita præstat appetentiam cibi exprimendo, & vt calefiat. Inappetentiam potus, quia frigiditas lædit. Intemperies, vel simplices, vel cum humore circa os Ventriculi, cuius Symptomata sunt fames, & fitis, aut quantitate, aut qualitate deprauata. Quæ vero ratione totius corporis contingunt fames & fitis, natura-

De Morb. Ventr. 51

naturales sunt. Signa inappetē-
tiæ ob sensus læsionem: etiam
gustus læsus est, ratione in-
temperiei calidæ in febribus:
vitio neruorum in Paralyfi.
Ratione humorum calidorū
in Ventriculo: Oris amaritu-
do, Nausea: contingit in con-
ualescentibus non purgatis. 2. Aph. 8.
Non euacuari? Corpus osten-
dit habitus pituitosus, pin-
guis: victus delitiosus, ociū.

Totius frigiditas, Senectus:
densitas cutis. Famis caninæ
signa ob Ventriculi frigidita-
tem: multa deiectio sumpto- 1. sy. ca. 7.
rum: si ob succum acidum,
deprehenditur vomitu post
cibum, & morfu. Si ob im-
modicam consumptionem,
adeſt paucitas excremento-
rum: arguitur ex præceden-
tibus euacuationibus, longis
inedijs, vigilijs, laboribus:
Ob robur caloris, ætas in-
augmentum tendens. Ob ver-
mem latum: Atrophia, im-
becil-

52 *Artis Medicæ lib. 7.*

beeillitas, etiã si multa inge-
ratur. Bulimi signa, si nō assu-
mant, incidunt in animi de-
liquium. Picationis signa pa-
tent sensui.

Sitis deperditæ aut imini-
nutæ ob læsionem sensus, in
febre lingua arida sine siti.

Ex humiditate, distillatio.

Ob frigiditatem Fames. Im-

modicæ ex sola caliditate,

Æstus, Vini generosi potus,

Comestio calidorum, falso-

rum. Diptadis, aut Viperae

cum humore: Salsedo oris,

amaritudo: excreta. Ex hu-

mid resolutione, febris: Eua-

cuationes præcedentes. Pro-

gnostica. Magna auersatio tū-

cibi, tum potus mala, nam

significat magnam intempe-

riem, & pestilentem. Fames

Canina longo tempore sana-

tur Gal. Vulimus lethalis est.

2. Aph. 21

Cura-

Curatio Inappetentia: Famis
Canina, & sitis.

Cap. 9.

AD Inappetentiam ex in-
temperie calida Ventri-
culi, qua prohibetur succus
refrigeratio, & astrictio oris
Ventriculi. Si cum humore
relaxante euacuatio. Hipp.
Si quis à morbo non corro- 2. Aph. 8.
boratur, cibum non assumēs,
purgatione egere significa-
tur. Gal. per vomitum, & de-
iectionem ex Hiera. Nos per
aquam Tettuccij prius ad ab-
stergendum, postea ex Aqua
Villensi, aut Ficoncellæ ad
refrigarandum & astringendū.
Bilis repercussio & oris astri-
ctio intus Oxyfacchara, Ace-
tosus s. sy. de succo Acetosæ,
de Limonibus, de acido Ci-
tri: de Ribes, de Agresta,
Aqua Endiuia, Rosarum. Ci-
bi boni succi ex acidis condi-

c 3 ti.

34 *Artis Medicæ lib. 7.*

ti. Fructus autumnales, Mala, Pyra, Cucumeres, Pepones, Fraga, Punica. Potus aquæ frigida ante cibum. Vinum rubrum astringens. Extra inunctiones ex Rosaceo, Melino, ablutio in aqua frigida.

4. in 6. Ep.
18.

Ad Inappetentiam ex impedita resolutione. Inedia, Frictiones, Exercitatio: Balnea calida. Vigilia. Intus de obstruentia ex Oxymelite. Absynthio, Menta, corticibus Citri conditis. Aquæ ardentis modicum cum melle rosaceo. Victus extenuans, Auiculæ montanæ, Bulbi, Allia, Cœpæ, Capparis. Sassa-menta. Decoctio ligni Sassafras.

6. Aph. 21

Ad Famem Caninam ex sola frigiditate Vêtriculi, Thoraxis, idest larga vini potio: Gal. eligendum vinum sufficienter calidum, subrubrum, vel rubrum non astringens: Nam

De Morb. Ventr. 53

Nam alba frigidiora sunt:
Fulua & Flaua calidiora. Ru- 5. *Acn. 8.*
bra in medio. Præsumant pin-
guia edulia, Carnem suillam
& fercula ex multo oleo: nil
austerum, nec astringens: po-
stea vinū abundanter bibant:
cogantur, si non sitiant. Oui
vitellus assus post cibum.
Auic. Vinum etiam ieiunis
exhibet, & calidum: Vitat in
solutione Ventris, quia non
austerum auget solutionem.
An in plerisque deiectio mul-
ta crudorum fit, quia alimen-
tum non fertur in corpus: re- 12. *M. 4.*
medium est vinum tenuius.
Hoc victu statim mitigantur,
& longo tempore in totum
sanantur. Ex succo acido,
euacuatio per vomitum post
cibum, & per Hieram. 5. Al-
terarantia prædicta, nā qua-
litate magis peccat quā mul-
titudine. Cōtemperatur pin-
guibus, digeritur vino, & ex-
purgatur.

c 4

Ad

Ad Furiam Caninam ex nimia resolutione, aut euacuatione, permittit Gal. ut multa assumant, quia egent refectioe, nisi peruenerint ad triplum, aut quadruplum consuetorum ciborum. Non conuenit his vini repletio, nec ante cibum nam minatur deliria, & conuulsiones. Magis aqua frigida potus. Cibus autem replendi sunt pro virium ratione. Nam quæ longo tempore extenuata sunt, lente reficere oportet, quæ vero breui, breuiter. Quia vel spiritus, vel humores, vel solida consumpta sunt. Similiter, quæ vniuersim, & velociter nutriunt, celeres sunt excretiones. Cum solida reddita sunt imbecillia, non licet cito reficere. Ad magnam dissipationem solidorum conueniunt cibi crassi, Omasum, Vuluula, Pedes vaccini Trall. Cochleæ, Testudines. An.
lac

lac Bubulinum ad habitum
refrigerandum? Pororum a-
strictio Balneū aluminosum,
ferreum. Inunctio ex Oleo
Myrrhino. Opium ex aqua
frigida ante cibum. Ad Bu-
linum. Reuocandi à deliquio
animi odoramentis aceti, Pu 8. *Cap. 4.*
legij, terra aceto macerata,
Malis, Pyris, & alijs, quæ ad
manum sunt, olfactu. Fricatio-
nibus extremorum, Punctura
maxillarum, tractione Capil-
lorum, Aurium.

Exhibendus panis in vino
diluto, ova sorbilia: Bulbi,
Cochleæ, Caro suilla assa ni-
dorosa, & bene condita. Gal.
Calefacientibus curandum: *1. Gla. 14*
Vino calida temperato cibus
calefacientibus. Fricatio &
calefactio ad ignem. Fouen-
triculum Menta, Absynthio,
Meliloto, Gariophyllis, Cin-
namomo: Oleo nucis Musca-
tæ. Cataplasma ex medulla
panis, ex vino, & Gariophyl-
lis.

38 *Artis Medica lib. 7.*

lis. Trall. Adhibet refrigera-
rantia, & Opium ex aqua fri-
gida. An hæc ad nimiam to-
tius caliditatem dissipantem?

Ad Picationem: humoris

1. sy. 6. 7. prauæ euacuatio per vomitū,
& deiectionem. Coctio, & Ci-
bi abſtinentia Vomitorium.
Auic. Sumat Piſces ſalitos, &
Raphanum infuſum in Oxy-
melite, poſtea bibat decoctū
Phaſcoli rubei, Anethi, ſemi-
nis Naſturtij, Erucae. Vtatur
ſemel in menſe, vel bis. Purga-
tio ex Hiera, Mirabolaniſ,
Turbit. Diſeſtio ex Ameos,
Cumino, Cardamomo, Cu-
bebæ, Saccharo, ad pondus
omnium: fiat puluis omni ho-
ra lingendus.

Cibi difficilis corruptionis.
Pulli Columbarum. Meſ. Ele-
ctuarium componit. Recipit
Capulorum glandium drach-
mas duas, Aniſi drachmas
tres: Myrrha drachmas duas:
Mirabolanorum nigrorum,
Embli-

De Morb. Ventr. 59

Embllicorum, Belliricorum,
singul. drachmas sex. Sco-
ria ferri infusæ in aceto sic-
catae, & torrefactæ drach.
octo. Cardamomi maioris,
Cubebe vtriusq; drach. tres.
Sacchari quantum sufficit fiat
Electuarium, cuius Dosis,
drach. vna & semis cum aqua
floris rosmarini ieiuno Ven-
triculo.

Ad sitim excitandam, ca-
lescientia & siccantia: Acria
Salsa. Medicamenta purgan-
tia, labores, Vigiliæ.

Ad sensum autem deperdi-
tum, vt in cibi Inappetentia.
Quemadmodum ex diuturna
vel magna fame perit aliquā-
do appetentia, vt in Bulimo.
Sic qui perpeffi sunt sitim, ijs
aliquando perit sitis ob ni-
miam siccitatem.

Forte & qui à cane rabio-
so demorfi sunt, auersantur
potum ob magnam intempe-
riem siccam. Si verò hi sitiāt,

c 6 deuo-

60 *Artis Medicae lib. 7.*

deuorare nequeunt potum,
aut quia gula affecta est, aut
quia Ventriculus abhorret.
Hi cogendi sunt.

Ad superfluam sitim ex for-
la intemperie, refrigerantia,
vel humectantia, vel vtraque.
Si ex humore falso, euacuan-
tia. Quos sitis infestat, cibos
Gal. die 31 & labores minuant, bibant
aquam cum vino quam frigi-
dissimam. Qui noctu bibere
5. Aph. 27 appetunt, ijs admodum sitien-
tibus, si superdormierint, bo-
num. Gal Si modice sitierint,
abstineant à potu, nam som-
nus sufficit. Si immodice ob-
feruorem, aquæ frigidaë po-
tio: Si ex defectu humidi, vi-
num. Archigenes ad sitim
post cibum, frigidam super
bibere, ne vratur cibus: Per-
fecta coctione, affatim biben-
dum, idest vinum, vt distri-
buatur cibus. Ad defectum
humidi, humectantia tantum.
Vinum dilutum, Malsa, Gly-
ciriza

De Morb. Ventr. 61

ciriza decocta in aqua. Si ex
toto corpore, Balneum aquæ
dulcis temperatum. Si ex Re-
nibus, aut Pulmone, potus lar-
gior. Ex Hepate, ventriculo
parcior. Si ex lingua, fauci- 8. Catat. 3
bus, Gula: Catapotia tenen-
da sub lingua: ex feminibus
communibus, Portulacæ, Tra-
gacantho, Gūmi, succo Gly-
cirizæ, Albumine oui. Saccha-
rum Candium violatum. Ad
feruorem refrigerantia solū,
Acetum, Omphacium, Puni- 5. Sym. 29
ca: Limonum succus. Si ex
toto corpore, Balneum frigi-
dum: ferreum, Si ex Pulmo- Sal. Di. 23
ne, aeris frigidi inspiratio. Si
ex labore, Quies, potus par-
cior. Ex ardore Ventriculi, 8. catat. 4.
aquæ frigidæ potus per inter-
ualla, Succus Malorum, Pyro-
rum, Punicæ. Exterius Folia
vitis viridia imponenda, Cu-
curbitæ ramēta. Si ex lingua,
faucibus: lapilli aqua refrige-
rati, Corallium, Achates, la-
pis

63 *Artis Medicae lib. 7.*

spis viridis super linguam tenendi. Iaspis etiam ad os Ventriculi suspensus Aet. Auic.

19. *Simpl.* defendit à morfu: Nuclei in ore detenti prunorum, Amarenarum. Frigida & humida

1. *Sip. 20.* in febre, æstu. Aqua cum aceto, Diamarenata. Aqua hordei,

4. *Acu. 71* Albumen oui conquassatum in aqua frigida. Hipp. Ad linguam aridam Mucillago,

3. *Mer.* Psyllij, Seminum Cotoneorū, Ramenta, Cucumeris, lactucæ: frequens ablutio.

Ad humorem falsum, vel acrem in distillationibus. Hydrope, Contemperantia ex decocto iuiubarum, aut Eclegmate. Enacuantia per serum lactis, Vrinam impuberis, Succum Ireos, Mecioacam. Siccantia. Trall. Cibis falsis, falsamentis, Capparibus, Aqua Tettucciij. Decoctio Salseparillæ.

De

De Cruditatē.

Cap. 10.

Coctio alimenti ad alte- *5. lo. af. 6.*
ratricem facultatē per-
tinet præcipue in fundo Vētri- *4. v. p. 9.*
culi: fit & quædam in Intesti-
nis, vnde & Clysteres nutriūt.
Coctioni subministrat reten-
trix. Finis est humidi termi-
natio Arist. Dulcedo, Crasis, *4. Mete 3.*
Hipp. idest temperatio: in
Chylum conuersio de genere
pituitæ. Vitia coctionis Cru-
ditas, Apepsia, cum cibi inal-
terati manent, actio abolita.
Tarda coctio Bradipepsia, dif-
ficilis mutatio in bonam qua-
litatem, actio diminuta. Pra-
uitas, Dispepsia, mutatio in
alienam qualitatem, actio de-
prauata: vocatur aliquando
Apepsia, idest Crudititas nomi-
ne communi. Inquit enim *3. Sy. c. 1.*
Gal. Apepsia alia priuatio
est, alia deprauatio: Hæc vel
immi-

64 *Artis Medicæ lib. 7.*

imminute, vel corrupte. Arist.

4. Met. 2. Coctioni opponitur Apepsia.
Elixationi Molyneſis, cum al-
teratur quidem, ſed imperfe-
cte ob frigiditatem. Cauſa
immediata Alteratricis fru-
ſtratio, vel ob affectum Ven-
triculi, vel ob externos erro-
res. Affectus Ventriculi, de-
fectus caloris innati, vel ob
3. Sy. c. 1. frigidam intemperiem, vel
calidam. Retentrix imbecil-
lis, vel ob humidam intempe-
riem, vel Siccitatem ſuper-
fluam, nam ob duritiem com-
plecti nequit cibum. Si vero
non complectitur, aut imbe-
cillius, aut breuius, coctio mi-
nuitur. Amplius vitia instru-
menti, Tumores, Vlcerca.

- Expultrix irritata ante co-
ctionis tempus à mordente
aliquo, aut grauante. Erro-
res externi ſunt, Somni dimi-
nutio, Ciborum quantitas,
1. lo. af. 3. aut qualitas, vt aciditas, duri-
ties: multus reſceſſus à dulci:

Ordo

De Morb. Ventr. 65

Ordo ciborum molliorum,
& duriorum. Tempus ante
prioris coctionem. Permixon-
tio excrementorum frigido-
rum, vel calidorum. Actionis
igitur abolitæ, aut diminutæ
causæ sunt. Intemperies frigi-
da magis minus. Retentrix
imbecillis, Expultrix irritata,
Somnus brevis, cibi multi, fri-
gidi, duri. Excrementa frigi-
da commixta. Depravatæ,
intemperies calida, Retentri-
cis diuturnitas, Expultricis
tarditas, in sicca intemperie,
sensu diminuto, obstructioni-
bus. Somnus longior, Cibi &
potus corruptioni obnoxij,
halituosi, fœtentes, putres.
Admixtio biliosi excrementi,
aut atri, falsi.

1. lo. af. 3.

Ordo depravatus ciborum,
si olera ex Oleo, & quæ ex la-
cte parantur, ultimo loco su-
mantur: duriora autem & a-
stringentia primo loco. Intem-
pestiuitas: si antequam prior
descen-

3. Sy. 6. 1.

66 *Artis Medica lib. 7.*

descendat, alter ingeratur: si ante exercitationem.

Conuersio in acidum ambigit. Nam Gal. Vult à frigore Trall. à calore, inter deprauatos. An vt Acetum partim à frigore, partim à calido? nam calor extraneus diminuit innatum. Symptomata Cruditas, Atrophia, Gracilitas, Obstructiones, Lienteria, Rugitus. Corruptelæ, prauus habitus, Morsus, Inflationes, putredines.

Signa cruditatis, ciborum ipsorum qualitates penè seruantur, siue ructare, siue vomere velint. Tardæ coctionis, immutatio aliqua, vt Aciditas. Corruptelæ, fumosus ructus, vel tanquam virus redolens, vel lutum, crudos pisces, indicibilem alienam qualitatem. Ex intemperie ventriculi frigida si cibi cōsueti & mediocres inalterati manēt, aut acelescunt etiam assumpto, mel
le,

De Morb. Ventr. 67

le, aut ijs, qui solent in nidorē
conuerti. Sine siti, cum fame. *1. lo. off. 4*

Ex intemperie calida, corrup-
tio non solum ciborum, qui
sua natura nidorosi sunt, vt
Oua, Mel; sed etiam Panis,
Halicæ: cum siti sine fame,
interdum febricula adest He-
ctica. Ob mixtionem humo-
ris, si in cauitate, patet in vo-
mitu, si in villis, singultus aut
Nausea. Ex toto corpore in-
prauo habitu. Ex Hepate fla-
ua bilis: ex Liene, atra obstu-
pefaciens dentes: ex Capite,
Pituita, Salsedo, noctu magis.

Ob retentricem non ample-
ctentem, aut debiliter, aut nō
ex toto: Clydones, idest Flu-
ctuationes cum sonitu ex po-
tu, aut humore aliunde trans-
lato. Post cibum assumptum *3. Sy. 64. 2*
singultus, aut displicentia, gra-
uitas, labor, ructus, debilem
amplexum significant cum
tremore. Flatus, seu inflatio-
nes aliquando ob debilem
ample-

Diff. Sy. 4. amplexum, aliquando insequuntur debilem coctionem, sæpe cum corruptela cibi.

Irritari expultricem ante tempus debitum significat exitus celer excrementorum: Deiectionis humiditas, Lienteria, Atrophia in cruditatibus magis contingit. Tarda excretio & sicca in corruptela magis, quia retinetur longiori tempore vel in Vētriculo, vel in Intestinis: nam contingit in inferiori ventre corrumpi cruditates. Ab externa causa fieri cognoscitur ex mutatione ciborum, ordinis, Tēporis, Somni. Prognostica.

1. lo. aff. 4. Quæcumque ab externo errore fiunt cruditates, facile curantur. Quæ ex humorum mixtione difficilius, pro mandatis affectus grauitate, vt ex distillatione. Nam calida distillatio in Vētriculum frigidum difficilis est, Frigida in calidum difficilior: ob repugnans-

2. Th. Sa.
10.

De Morb. Ventr. 69

gnantiam remediorum. Quæ
ex proprio vitio adhuc diffi-
ciliores sunt, origo ferme
omnium morborum.

Defectus calidi innati ob fri-
giditatem facilius restituitur,
nam calorifica profunt. Defe-

ctus autem ob caliditatem
dissipantem, difficilius: frigi-

da enim non restituant calidū
innatum, sed prohibent, ne

dissipetur, præsertim astringen-

tia. Quæ cum ultimo vir-

tutis collapsu fiunt, in Liente-

riam desinunt, aut Tympani-

am. In Lienteriam frustrata
coctione; in Tympaniam,

quia arteriæ non reperientes
materiam concoquendam in

sanguinem, suum spiritum
transfundunt in Ventrem.

Curatio Cruditatis.

Cap. II.

Cibi crudi si multi vel præ-
cui, aut corrupti, euacuan-
di

3. sy. ca. 1

8. Chas. 4

70 *Artis Medica lib. 7.*

di vomitu ex aqua tepida. Si
moderata cruditas, perficien-
da coctio quiete, somno lon-
giore, aut longiore decubitu.
Inedia, non Ira, non Curæ.
Potio Vini veteris calidi cum
Pipere: nam promouet in ve-
nas, vt coctio inibi perficiatur.

Ad intemperiem frigidam,
cibi pauci facilis coctionis:
Ptisana cum Pipere, aut Cin-

7. Met. 4. 7

namomo: Mel despumatum,
Salfamenta, Auiculæ monta-
næ, Diatrion pipereon: Dio-
spoliticum componitur à Gal.

4. 14. 14. 5

ex Cumino, Pipere, Ruta,
Nitro, æquis portionibus: pro
Nitro nos Tartarū sumimus,
quod prouocat ad deiectionē.
Zinziber conditum, Citri cor-
tices conditi, folia Cardui
sancti deuorata, Absynthium:
Coriandrum cochleari men-
su- ra ante reliquum cibum, &
Merum superbibat, confert ijs
qui acidum ructant. Piper in
cibis crassius contusum, ne

He-

De Morb. Ventr. 71

Hepar supercalefaciat, sic e- 4. m. sa. 7.
nim non permeat in Venas an- 6. 5.
guſtas: Extinguitur eius ca-
lor circa primas Venas, nec
in totum corpus fertur. Com-
modum, vbi humores crudi in
primis venis circa Hepar, &
Meſenterium. At humores crudi
non multum calefaciendi, ſed
incidendi ex Oxymelite, & vi-
ſtu extenuante. Extra, Oleum
Nardinum, Maſtichinum, Bal-
ſamum cum Lana, aut Purpu- 7. Met. 7. 9
ra. Fomenta ex Abſynthio,
Menta, Meliloto in Vino. Un-
guentum Marciaton, Puellus,
aut Catulus pinguis. Si hæc
non profecerint, rubifican-
tia ex Thapſia, Sinapi. At re- 7. Met. 4.
ſoluunt vires Ventriculi, vlti-
mo Balnea naturalia, niſi ob-
ſtet ſiccitas, in qua fugienda
quæ multum digerunt, & quæ
multum aſtringunt. Commo-
diſſimum eſt Balneum de Au-
nionne in Senenſi, valde calidum,
ſed ferreum. Irrigatio ad Ven-
tri-

72. *Artis Medica lib. 7.*

triculum efficacior est, seu ex
Oleis, seu ex Balneo.

8. Cat. 4.

Ad Corruptelam, Cibi cor-
rupti per vomitum educendi
ex aqua tepida; Caput obdu-
cere mollibus linteolis cali-
dis; Præcordia molliter frica-
re, fascia obducere: Quiescere
in lecto. Inedia in alterum

7. Met. 4.

diem, aut moderati cibi in-
teritium. Ad calidam intem-
periem, frigida potio aquæ
fontanæ, aut decoctæ, & refri-
geratæ in nix, puteo. Cibi re-
frigerati Prisana, Spuma La-
ctis, quam vocant Aphrogala,
nos Recocta in Melca, idest
Lac aceto præparatum, vt an-
tiqui Schistum parabant, non
per coagulum, sed coctione
Lactis cum pauxillo aceti. Fru-
ctus frigidi Cucumis, Mala,
Pyra. Alica, Panis ex aqua
frigida & aceto: Carnes du-
riores: non oua, non frixa vl-

Ant. Med.
62.

la: Vinum aquosum. Extra,
Oleum Melinum, Omphaci-
num

num, Rosaceum: Irrigatio
frigida infra septum propè
Umbilicum, ne offendatur se-
ptum. Balneum de aquis in 7. Met. 8.
Pisano. Tutius longiori tem-
pore mitioribus refrigerare:
nam quidam ex frigida potu
deglutire non potuit.

Ad lationem coctionis, ex
intemperie humida, vel sicca:
quia humiditas debilem com-
plexum facit, & celerem deie-
ctionem: siccitas debilem
complexum, & tardam deie-
ctionem. Ad humidam intem-
perie, Siccantia, Cibi assi, Po-
tus modicus Vini austeri. Dia-
citonium Mina, cū speciebus.
Aqua Tettucci. Balneum
ferreum de Aquis de Auinio-
ne. Ad siccam intemperiem,
humectantia ex Lacte, & Mel 7. Met. 6.
le. Cibi elixi. Nil austerum:
Vinum dulce. Olera cum
multo Oleo, Malua, Beta,
Oleum Amygdalarum dul-
cium, & Butyrum ante cibū.

d

Si

74 *Artis Medicæ lib. 7.*

Si in his tarda deiection, non
irritanda ex Aloe, neque ex
alijs siccantibus; Sed lubri-
cantia conueniunt, & lenien-
tia, ex Manna, aut Cassia cum
iure pingui ante cibum: Mer-
curialis cum oleo multo de-
cocta. Ad expultricem irri-
tatam ante debitum tempus
remedia dicenda in alui flu-
xu. Vitia organica explicata
sunt in inflammatione Ven-
triculi. Ad errores externos,
vt somnum, Cibi quantitatē,
qualitatem, ordinem, & tem-
pus non indicantur remedia,
sed ijs mutatis cauere oportet.
Sed mixtio excremento-
rum eget remedijs, seu genita
in Ventriculo ex prauo victu,
seu aliunde fluxerint. Si Pi-
tuita, quæ lenta est, inciden-
da ex Oxymelite, Origano,
Thymo, Serpillo. Euacuan-
da vomitu ex Oxymelite, &
Radicula purgatione, si ex ca-
pite descendat, ex Agarico,
Hic.

De Morb. Ventr. 75

Hiera, Colocynth. Pillulis
Cocchijs. In quibus adiun-
cta est Ventriculi intemperies
frigida, nulla adest repugnanti-
a. Vbi calida difficilior cu-
ratio, prius ad humorem de-
scendentem, postea ad intem-
periem calidam Ventriculi.

Si humores fuerint serosi,
vel Melancholici, adusti. Vo-
mitus ex cremore Ptisanæ
multæ. Postea exhibenda
multa incocto Absynthio. Pur-
gatio ex Hiera. f. Serum La- 7. Met. 11
ctis vaccini, & remedia dicta
in passione Hypochondriaca.
Ad biliosos humores, vom-
itus ex aqua tepida: Purgatio
ex Hiera drachmæ duæ cum 7. Met. 11
aqua tepida. Rhabarbarum.
Repellentia & astringentia
ad Ventericulum: Vinum Gra-
natorum. Vbi adiuncta est
intemperies calida, simul vtri-
que prospici potest: Vbi fri-
gida, prius purgandum, po-
stea intemperies frigida,
d 2 tollen-

tollenda. Vtrūque facit aqua
Tectuccij.

De Lumbricis. Cap. 12.

EX Cruditatibus in Inte-
stinis putrescentibus o-
riuntur vermes, qui Lumbrici, Græce Helminthes vocan-
tur. Arist. in inferiori Ventre
solum, vbi continetur excre-
mentum putrefactum, non in
superiori, vbi fit coctio, licet
ascendant sursum. Vidimus ta-
men in Lactentibus per vomitu-
m excerni globulos veluti
acicularum, quos ex inferioribus
ascendisse non est veri-
simile, adeo exiguos.

Oriuntur & in auribus ver-
mes. Aliquando intra cutem
in partibus musculosis Bra-
chij, Femoris, Tibiæ, Late-
rum: In India & supra Aegy-
ptum Draconculi, similes Lū-
bricis, Paul. Vidi in rene cu-
iusdam canis macilentii lon-

De Morb. Ventr. 77

gissimum Serpentis magnitudine conuolutum. Sæpe & in abscessibus purulentis non bene expurgato pure, vermes oriri videmus. Intra cuticulam aliud genus vermium oritur, quos pediculos vocamus.

Morbus est in numero toto *1. Catat. 3*
genere præter naturam: Aliquando causa, cum obstruendo lædunt. Nam per se lædunt morfu, putredine, absumptione alimenti. *Dif. Mor. 8*

Symptomata etiam sunt coctionis vitiatæ. Aliquando nulla læsio, accidentia dicuntur in sanis. Tria genera Lumbricorum ponit Gal. Helminthes, idest Lumbrici teretes, seu rotundi in Intestinis gracilibus magis, vnde in Ventriculum feruntur. *14. Met. 18*
Ascarides *3. Aph. 26*
tenuis Lumbrici in inferiori parte Intestini Crassi, & intra Musculum Sphincterem. Cæria sunt lati & longi Lumbrici longissimi sæpe per tota
d 3 Inte-

78 *Artis Medicae lib. 7.*

Intestina ex interna membra
na tenuium Intestinorum.

Paul. Aet. Auicenna quartum
genus esse Cucurbitinos, qui
parui, & lati instar seminis

1. lo. af. 5. Cucurbitæ. Gal. Hos esse in-
dicium lati vermis. An latus
coagmentatus est ex Cucur-
bitinis glutinante mucro?

Forte & Ascarides iidem cum
rotundis, sed non perueniunt
ad incrementum ceterorum
ob velocem exitum cum ex-
crementis: aut quia ex mate-
ria sicciore orti sunt, quæ non
patitur multum incrementum.

Auicenna rotundos visos esse
cubitali longitudine in Colo,
& Cæco. Causa materialis
est pituita putredini obnoxia,
non bilis flaua, nec atra. Paul.

Rotundorum in ipsis faci-
bus: Lati, quæ adhæret Inte-
stinis: imò fæces ipsæ, ut pu-
tet aliquando gigni extra pau-
lo post deiectionem: Cibi pra-
ui succi, frumentacei. Aet. Fru-

ctus

De Morb. Ventr. 79

Ætus æstiuus, Olera. Efficiens
Caliditas extranea: Coctio-
nis imbecillitas: Balnea post
prandium, Naturæ calidæ, &
humidæ. Pueruli post denti-
tionem obnoxij rotundis, &
Ascaridibus, vsque ad puber-
tatem. Lati grandioribus, 3. Aph. 26
sed raro visuntur, & post diu-
turnos morbos. Hipp. Gigni 4. Mor.
in infantibus in vtero ob diu-
turnam moram excremento-
rum, augescere in dies, vt to-
ta Intestina occupet: promi-
net aliquando ex podice infla-
tus ex itinere.

Signa Lumbricorum læden-
tium ob putredinem. Febris
maligna cum extremorum
frigidityate ter, aut quater die
ac nocte exacerbatur sine ra-
tione ex motu vermium. Pul-
sus inæqualis, Sopores, Deli-
ria, Taciturnitas: Genæ al-
ternatim rubent, & liuescunt
breui tempore: Oculi splen-
dentes: Fœtor oris proprius:

d 4 Alui

80 *Arcis Medica lib. 7.*

Alui deiection corrupta & foetens : Ventris inflatio . Ob morsum autem deficiente proprio alimento , quod contingit in febre . Auic. Dolores Ventris , aut Ventriculi acuti permutabiles : perturbatio in somno , tremitus , dentium stridor , anxietas , animi deliquium , sudores frigidi , nausea , vomitus , vix deglutiunt . Ob globum obstruentem nulla deiection , dolor Iliacus . Ascariides pruritus tantum faciunt in sede , & deijciendi cupiditatem . Lati aliquando cum febre , aliquando sine febre : noscuntur excrementis s. lo. af 5. similibus semini Cucurbitæ , & rasuræ Intestinatorū . Pariunt 4. Morb. continuum stomachi morsū , Appetentiam caninam . Sequitur cita excretio cibi : gracilitas , pulsus inæqualis . In ieiunio ascendit ad Hepar & dolorē inducit , & quandoque sputa multa : si fortiter irruat ,

De Morb. Ventr. 81

irruat, vocem intercipit, dein
de tormina in Ventriculo, aut
ad dorsum. Prognostica.
Lumbricos descendere cum
excrementis, morbo eunte in
iudicationem, bonum. Per vo
mitum, vel per nares egredi
malum: nam multi conuulsi
interierunt. Exisse aliquando
ex Inguinibus, testatur Paul.
Tanta est eorum vis perforan
di. Si exeant mortui, deterio
res sunt. Auic. Sed Aetius mor
tuos meliores esse tradit: An
si medicamentis mortui deij
ciantur, bonum est, non si vi
morbi? Lati difficiliores ob
magnitudinem, & quia vehe
menter adhærent, & ducunt
ad Atrophiam. Habentibus
Latum, in toto corpore nihil
admodum graue contingit:
sed vbi quis imbecillis factus
fuerit, vix reualescit, quia
semper absument partem ali
menti; si non curetur, sponte
non exit, mortem tamen non
d s indu-

2. Prog. 18

4. Mor.

82 *Artis Medicae lib. 7.*

inducit, sed consenescit. Non sanantur, nisi medicamento exeat conuolutus in globum: Nam si exeant ramenta recta seu duorum cubitorum longitudine, seu amplius: significat abruptum esse: quod autem remanet, augefcit. At videtur impossibilis insectorum auctio tam diuturna. An per sobolem propagatur ab eodẽ principio, vt in plantis quibusdam, & in genere Buccinis & Purpuris, exeunte muc-

3. *Ge. an.* cosa substantia? Eodem modo
10. Cucurbitini sunt fætus lati.

14. *Met. 18* Curatio Lumbricorum, vt morbum faciunt in numero, per ablationem: At educi nequeunt, nisi mortui aut stupidi; nam vigentes resistunt expulsiõni, inhærentes Intestinis.

Enecant vermes, quæcunque valenter exsiccant aduersa putredini, à qua pendet eorum generatio: vt Amara, acria,

De Morb. Ventr. 83

acria, falsa, valido odore: Et
quæ constant aerea substan-
tia, imputrescibili, vt Oleum.

Inquit enim Arist. Tactu O- 8. Hist. 27.
lei intereunt insecta omnia.

Ad rotundos igitur enecan-
dos, Amara Absynthium, Ab-
rotonum, Santonicum, Semen
sanctum, Aloes, Rhabarbarū,
Gentiana, Persici folia, Nu-
clei, Amygdalæ amaræ, Cha-
mæleon, Dictami albi radix,
Eupatorium. Mesues Lupinū,
Securidacæ semen, Brassicæ,
Nigella, Cardamomum, Co-
rallina: Cornu cerui vstum,
Vermes terreni, Graminis ra-
dix, Oleum Omphacinum,
Petroleum, Gutta vna Olei
Sulphuris, Vitrioli, in aqua
graminis. Argenti viui Gra-
num milij magnitudine per
se deuoratū. Quædam ex his
statim enecant, quæ efficacio-
ra sunt in potu: aut extrinse-
cus Epithematis ad Umbili-
cum, Ventericulum ex ijs quæ
d 6 ama-

84 *Artis Medica lib. 7.*

amariora sunt; vt ex Aloe Ab-
rotono, Farina Lupinorum,
Felle, Oleum Rhododaphne.
Paul. Petroleum: Oleum de
Scorpionibus compositum.
Mattheoli.

At in Febre vehementi, &
in puerulis periculosa sunt,
quæ vehementer calida. Mor-
tui cito educendi, ne corrup-
tos vapores transmittant: Glâ
de injecta, Oleo bibito: cata-
potijs ex Aloe, Hiera, Colo-
cynthide. Sed febricitanti-
bus optimum Rhabarbarum,
Polypodium. Ad putredinem
frigida, & sicca, Acetosus
Simp. Citri aciditas, Limo-
num, Vinum Granatorum.
Radix Tormentillæ, Grami-
nis, Terra sigillata, Meliten-
sis, Alicornum. Lapis Be-
zaar. Hæc Tutiora sunt vr-
gente febre, abstinendum à ca-
lidioribus. Paul. Ad morsum,
propellere deorsum, & fero-
ciam mitigare. Propelluntur
iniua.

De Morb. Ventr. 85

insuauibus per os assumptis,
Theriaca, etiam exterius illi-
ta naribus, palato, Ventricu-
lo: vel Aloe, Myrrha ex ace-
to & oleo.

Alliciuntur deorsum suauibus iniectis, Mulsa, Lacte. Mitigant ferociam cibi dulces, non inedia. Aetius Oleum, saepe exhibet.

Ptisana cum Oleo, Halica. Auic. Lacte, vel carne tosta, duobus diebus, postea admiscet medicamenta enecantia, vt decipiat: sal in ore detentum. Infantes mitioribus medicamentis tractandi, & in statu: potus decoctionis Sebesten vermes terreni cum Sapa delingendi. In febricitantibus igitur initio enecare ex Oleo Omphacino cochlearibus assumpto ante cibum, Ptisana, aut Halica, Panis ex iure adiecto semine Brassicae: Potus decoctionis Graminis, cum Vino Granatorum, vel succo

86 *Artis Medicae lib. 7.*

succo Limonum : si efficacius
oporteat, enecare guttis dua-
bus Olei Sulphuris in iure,
pingui ante cibum, non Oleū
Vitrioli, nec Argentum vi-
uum ; quia deleteria magis
sunt. Enecatos cito ducere
ex Rhabarbaro.

Ad Ascarides, Clysteres
acres, Calamenti succus, Ce-
dria, Colocynthis, Muria, A-
qua marina, Caro salita sup-
posita Peroleum cum Lanula
filo appensa. Postea astrin-
gentibus sananda vlcera ex
pruritu & morfu concitata :
Malicorium, Balaustium,
Alumen, Plantago. Rhus.

Ad Latos enecandos valen-
tiora necessaria sunt, acria,
Euphorbij drachma vna per
interualla, sed corrigatur e-
ius vehementia ex Ptisana,
aut Lacte. Centaurij succus,
Dictamum, Costum, Heleniū,
Anchusæ puluis cum decocto
Mentastri, Filicis radix, Cor-
tex

De Morb. Ventr. 87
tex Mori, Nitrum, Cardamomum, Piper, Vermes terreni, Sinapi, semen Nasturtij, Chamæmelum.

De Cholera. Cap. 13.

Circa os inferius Ventriculi, quod Pyloron vocatur, viget Expultrix, cuius gratia meatus fellis in duodenum Intestinum mittitur. Er- 5. v. s. p. 4. 4.
ror aut non agendo, aut deprauate: si deficiat in Expulsione, insequitur tardus descensus, & corruptio ciborum. Si deprauate ante tempus perfectæ coctionis, Lienteria: Si concitatus per inferiora, fit Diarrhœa, per superiora, Vomitus, Subuersio, Supinitas. 8. Cat. 3.
Cholera vtrinque: Est affectus acutus, ac grauis, qui per vomitum in Alui fluxum protinus ducit. li. Def.

Aut ex profluuiio Alui, & multa excretionem tormina,
&

88 *Artis Medicae lib. 7.*

& non multo post in febres malignas. Aliter. Est affectus acutus cum vomitibus biliosis multis, Aluiq. deiectionibus, surisque se contrahentibus, frigescentibus extremis, pulsibus minoribus,

3. *Met. 2.* obscuris. Nomen à causa putata. Trall. Non humore Cholerico, nam fit & ab alijs causis: sed ab Intestinis, quæ

4. *Acu. 103* Cholades antiquis. Est & Cholera arida Hipp. Cū nihil excernitur, sed dolor adest, & inflatio, quam Galenus putavit ab acri spiritu fieri: Nos ostendimus inter Voluulos.

3. *Sy. ca. 2* Causa: id quod contristat stimulans ad expulsionem; Cruditates Ventriculi, & corruptelæ. Pepones, Porcellorum,

2. *Ali. 2.* caro; Fungi. Lac Caprinū, cum pascuntur Elleborum, *Ci. 60. 6* Tithymalum; Frigidæ potus. *Ma. 4.*

7. *Met. 11* Trall. Excrementa totius corporis certis intervallis, aut in Crisi. Bilis, humor serosus medi-

De Morb. Ventr. 89

medicatus supinitates & vol- 8. *Cap. 3.*
uulosas subuersiones facit: To 3. *Sy. ca. 2.*
tius corporis humiditates, & 5. *lo. af. 6.*
colliquationes: Aliquando
sanguis ex Hepate, vel Liene,
vitia Ventriculi, quibus, vel
coctio frustratur, vel impedi-
tur alimenti distributio. In
Aestate, Iuuenibus ob bilem:
in declinanti aetate ob crudi- 3. *Aph. 2.*
tates. 30.
Locus affectus in vomitu os
superius relaxatum, in deie-
ctionibus os inferius. In Cho 3. *Sy. ca. 2.*
lera per totum: Humor in ca-
uitate vergit ad inferna, vel
quia eo inclinatur humor, vel
ob robur superioris. Ad su- 8. *Cap. 3.*
perna è conuerso. Aliquando
motus fit sursum ex Intestinis
concitatis: visum est enim ali-
quando Clysteres per vomitum
excerni. Signa Cholerae
patent ex essentia. Vomitus,
& Alui profluuium: tormina, 4. *Acre.*
& suffocatio: Pulsus parui, ob- 110.
scuri, seu languidi, ob Ventri-
culi

4. ca. pu. 23. culi morsum : Extremorum
 frigiditas, Surarum contra-
 ctio, febris. Aquosa deiectione
 cruditatem significat : aut vi-
 2. Prog. 20 tium Hepatis non deducentis
 alimentum ob frigiditatem.
 2. Aph. 20 aut obstructionem. Aut tran-
 smitti humiditates corporis,
 quod aliquando bonum. Sine
 2. Prog. 14 morsu excerni, significat Re-
 tentricis imbecillitatem: con-
 1. Cri. 11. tingit in Hydrope, Fluxu He-
 patico. Prognostica. Quæ fit
 à natura se exonerante, saluta-
 ris : cognoscitur ex facili tole-
 1. Aph. 2. rantia : nam confert, & leui-
 ter ferunt. Vomitus utilissi-
 ma, si pituita ac bile permix-
 ta quam maxime fit, si non
 2. Prog. 38 multa, non crassa. Deterior
 42. sincera, porracea, liuida, ni-
 gra, varia, Foetens quæcunque,
 liuida, & graueolens citissi-
 mam abolitionem significat:
 contingit in Voluulo Deie-
 2. Prog. 14 ctio humida ex usu est, si ne-
 que stridet, neque crebro, &
 pau-

paulatim excernitur, neque
vniuersim & sæpe. illud in-
somnia, hoc animi deliquiū
facit: Symptomaticæ sunt.

Corpulenta reddatur morbo
eunte in iudicationem: sub-
rufa, non admodum graueo-
lens, Lumbrici inferne: Ven-
ter mollis & plenus. Mala-
aquosa multum: candida, aut
valde crocea, spumans, exi-
gua glutinosa, læuis. Nigra,
Opima, Foetida, Versicolor
diuturnior est & exitalis: Strig-
mentosa cruenta, quod con-
tingit in dysenteria: Peruenit *2. Prog. 23*
ad quartam, vel septimam
diem. Si trāsmigret ad caput,
Deliria fiunt, & sopores, surdi *4. Aph. 28*
tas. Si ad renes, stillicidium, *2. 21. 24.*
ut ad Intestina dysenteria.
Morbis quibuslibet incipien-
tibus si atra bilis vel supra vel
infra exierit, lethale. Deiectiones
nigræ qualis sanguis ni-
ger, Gal. aliquando bonum,
si cum signis coctionis. At æ-
gro

gro iam debili, postridie moriuntur. Si parit dysenteriam, lethale.

*Curatio Cholerae**Cap. 14.*1. *Aph.* 20.

SI à natura bene agente fiat, finire, neque mouere, neque nouare aliquid. Sola victus ratio, primo inedia, postea ad sorbitiones transire. Si non integre, perficien-

2. *Aph.* 12.

da euacuatio, ne recidiuam faciat. Quiescere, Mulsam bibere, vomere. 4. *Acu.* 110.

3. *Aph.* 12.

Gal. non vomere, sed per inferiora ducere. An quo natura vergit? Ras. Aqua calida multoties tribuatur in potu, & si perseuerauerit vomitus, & alui deiectionis, iterum detur ad abluendum: Pro mulsam ad cō-

4. *Acu.*

110.

temperandam acredinem, Aqua Hordei. Gal. inquit, Valenter auxiliatur is, qui valenti

De Morb. Ventr. 93

lenti medicamento Cacoetri-
miam affatim purgat, inspe-
ctis viribus habitu, ætate, tem-
pore, constitutione. Hoc mo-
do fluxus fluxu curatur, & vo-
mitus vomitu, & tandem per
similia, vt tradit Hipp. Huic *de lo. in*
sententiæ videtur repugnare, *ho.*
quod scribit Gal. Si fuerit fe- *l. Gla. 14.*
bris cum profluvio Alui, non
opus est alia euacuatione, sed
hæc sola sufficit, quamuis non
sit pro multitudinis ratione,
alioqui in grauiora pericula
ducuntur. Oppositum tamen
videtur statuere, cum inquit: *9. Meth. 5*
Si non sufficiat, supplendum.
An in omni magno sympto-
mate abstinendum à magnis
& integris euacuationibus?
Sed prius Ventrem confirma-
re oportet, postea auferre:
aut venæ sectione, aut purga-
tione. Si moderate fluat, & *4. Ac. 116*
os Ventriculi non valde affli-
ctum, conuenit medicamentū
purgans, immo expetendum
cor-

94 *Artis Medicæ lib. 7.*

2. *Aph. 9.* corpus fluidum. Si totius plenitudo, etiam venæ sectio.

Contra, omnis euacuatio facta à natura in principio ante coctionem mala est, & Symp-

3. *Cri. 10.* tomatica, ergo compescenda.

An turget in Cholera? Nam

ex motu concitato periculum est, ne ruant humores ad partes principes.

In medicamentis autem talia educere,

oportet, qualia & sponte prodeuntia, utile. Quæ vero contrario modo prodeunt, cohi-

4. *Aph. 2*

bere oportet. Sed si sponte,

hæc fiant in principio morbi,

signum est prauæ disposition-

nis, irritantis ante coctionem:

si vero à medicamento fiat,

bonum est, quia euacuantur

4. *Aph. 21*

humores noxii. Si sola cru-

ditas Ventriculi, Hiera The-

misonis, quæ est simplex. Gal.

Sibilis aliunde allata, Rha-

barbarum, Mirabolani Citri-

ni. Si Serosa humiditas, Sy-

Rosatus solutius: Cassia

cum

De Morb. Ventr. 95

um speciebus Hieræ. Si labor
& nihil excernatur, quæ
holera arida vocatur, ne vo
nat, Venter subducatur Cly 4. Acm. 104
eri pingui: & reliqua facien
a, quæ in Voluulo dicta sunt.
Ad fluxum Symptomaticum,
d quæ non sequitur conferen
a, vel quia cibi incocti exeunt
Lienteria. Vel totius cor
oris colliquationes in feбри
us malignis; vel quia humo
es pravi ante coctionem in
Diarrhœa; vel sanguis, in flu
u Hepatico; In omnibus cõ
escere oportet. Ad Diar
hœam Hipp. Si liquidam al- 4. Acm. 38
um habenti Causus superue
erit, si purgatio idonea vi
eatur, eam non primis tri
us diebus adhibebis, sed
quarto; vt scilicet interim
liqua coctio habeatur. Cum
utem purgaueris, sorbitio
ibus quibusdam vtitor, ob
eruatis febrium accessioni
us, vt nunquam cum adsunt,
neque

neque cum futurae sunt, exhibeas; sed cum cessant, vel quicuerunt. Frigentibus autem pedibus neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis. Et paulo post inquit.

Quibus Aluus per febres perpetuo liquida est, custodito ne pedes frigidiores sint reliquo corpore: Calefaciens, & Ceromatis, ac fasciis integens. Potu quam minimo utendum, aqua frigida, vel mulsula. Gal. Variam conuenire curationem; Nam concoctio molienda leui nutrimento, Somno per Opiata, Balneo. Inter Opiata hodie in usu sunt Pillulae de Cynoglossa, scrupulus vnus vespere post coenam. Balneum commodissimum est ad fluxiones ad Ventrem, nam reuellit ad exteriora; at non in sanguinis fluxu.

Non obstat, quod scribit Hipp. Non sunt lauandi, qui
in

De Morb. Ventr. 97

in morbis Aluum plus iusto 3. *Actu. 19*
humidiorem habent, neque
quibus nimis astricta, neque
biliosa eructantibus; quia vt
Gal. in commento, non bonū
est reuellere in corpus humo-
res prauos, sed melius est per
inferna euacuari. At quando
post purgationem sistere o-
portet, non inutile est reuelle-
re; aut ad superiora vomitu
in Alui fluxu; aut ad inferio-
ra per Clysteres in vomitu:
aut ad habitum corporis in
vtroque. Deriuatio ad vrinā,
ex Asaro, Nardo, succo Cito-
niorum, Seminibus commu-
nibus, Cucurbitula magna
Vetri medio. Medicamen-
tum purgans per interualla, *Para. fas.*
& resectio ad vires instauran- *25.*
das, non astringentia intus
præter quam ad robur Ven-
triculi, & Hepatis. Ad colli-
quationem, extinctio feruo- *10. Mei. 10*
ris, potu frigida, & Balneo
frigido.

e

Ad

98 *Artis Medicæ lib. 7.*

Ad Choleram, lauacrum.

De pa. fa.
25.

frigidum, in quo diutius permaneat, si quadrato habitu sit. Si vero gracilis, ex balneo temperato modice ad frigidum ducendus. Cibi actus frigidi Ptisana, Halica, Lactuca. Fructus, Lac Schistum.

4. *Ach. 41*

Trall. Hipp. Quibus per febres Aluus liquida, & mens turbatur, & Venter contabescit, sorbitiones frigidiores & crassiores: potus vinosiores astringentes. Recentiores in diuturnis Alui fluxibus videntur lotionibus astringentibus ad crura, & brachia.

1. *Gla. 14.*

Reprehendit Galenus, quia astringentia externa repellunt ad Ventrem, & adaugent fluxum. An hæc conueniunt ad Retentricem imbecillem externarum partium in inueteratis fluxibus?

Ad Retentricem autem imbecillem internarum partium, astringentia intrinsecus conueniunt,

ueniunt, & extrinsecus ad Vē-
triculum, & totum Ventrem:
quod præcipue in Lienteria
opportunum est. Ad Liente-
riam sine morfu ex debilitate
caloris concoquentis: Cale-
facientia dicta in Cruditate.
cum astrictione: Miua Cito-
niorum cum speciebus, cibi
facilis coctionis. Ex debili au-
tem complexu ob inflamma-
tionem, Tumores, Vlcera,
Siccitatem, dicta sunt reme-
dia in dolore Ventriculi.

Ob humiditatem autem,
relaxantem, si ex distillatio-
ne, quod sæpius contingit: Ca-
piti prospicere oportet, pur-
gatione superiorum partium.
Hipp. Capite autem à pitui- *De aff.*
ta purgato; Ventrem quoque
Lacte cocto eluito. Deinde
reliqua cibis, & potibus cu-
rato, a quibus Venter, & to-
tum corpus resiccetur. Nos
Ventrem eluimus ex aqua
Tettuccij primum, deinde
c 2 aquis

100 *Artis Medicæ lib. 7.*

aquis astringentibus ferreis,
ut est Aqua Villensis, Ficon-
cellæ, Borræ in agro Florenti-
no: Aqua Calybeata, Vina
Austera: Cidonium, Rhus.
Sy. Rosatus ficcus, Myrthi-
nus, de Portulaca, cum aqua
Plantaginis, Rosarum. Gal.

8. Cat. 3. Ad Ventriculi dissolutionem
ob superfluam humiditatem,
exhibet succum Mali Punici
cum nucleis inspissatum, addi-
to succo Mēthæ: Aliud Coto-
nea, Mespila, Corna, Myrthil-
li, Pruna siluestria, Rhus.

Horum decoctio inspissata,
sumitur ante cibum. In febre
Ptisana cum granis Mali puni-
ci, semina Acetosæ, Plantagi-
nis, Portulacæ, Corallium.
Extrinfecus ad Ventriculum
relaxatū Cataplasma ex Ma-
lo Cotoneo cocto in vino au-
stero, Absynthio, Rosis, Myr-
thillis, Crusta panis.

Fomenta ex decocto eo-
rundem: Inunctio ex Oleo
Nar-

De Morb. Ventr. 101

Nardino, Mastichino, Absyn-
thij, Rosaceo, Melino. Ad
totum Ventrem, aut ad so-
lum Ventriculum in vomitu.

Ex irritata autem Expul-
trice ante tempus debitum,
vnde Lienteria cum morfu,
non multum astringere oportet,
sed euacuare, quod irri-
tat, abstergentibus sine mor-
fu, vt ex lacte cocto, aut sero
Calybeato. Repellere acres
humores aliunde fluentes.

Contemperare cibis morfu
carentibus, qui difficillime
corrumpuntur. Vt Omasum, *1. lo. af. 4.*
pedes, & fructus astringen-
tes. Si non sufficiat sensus ob-
stupefaciendus, præcipue in
quibus est nimium exquisi-
tus, Trocisci stellæ, Pillulæ de *12. Met. 8*
Cynoglossa vesperi.

Ad sanguinis excretionem
explicabuntur remedia in flu-
xu Hepatico.

De Dysenteria. Cap. 15.

Dysenteria, Intestinorum difficultas. Communiter est omnis cruenta excretio. *a. lo. af. 5.* Proprie est vlcus Intestinorū. *6. lo. af. 2.* Est Intestinorum exulceratio cum Phlegmone, & secretione cruentorum, ac strigmentorum faci similium, non sine morfu, & cruciatu Alui, & Intestinorum. *li. Def.* Alia in gracilibus alia in crassis. Quæ in recto Intestino Tenesmus vocatur: mordicatio recti Intestini ex biliosis, & acribus humoribus, cum crebra surrectione, & cupiditate egerendi, pauca tamen. *3. af. pa. 10.* Causæ sola bilis sincera, siue flaua, siue atra: prius abrasit, post erodit. Pituita falsa putrescens, vt Aphthæ in pueris. *3. A. h. 11. 12.* Gal. Medicamenta valde acria, vt Elaterium, Scamonium, Colocynthis. *3. Acu. 32.* Oxymel abrasit Intestina in sicci-

De Morb. Ventr. 103

ficcitatibus. Autumno. In æ- 3. Aph. 16
tate declinante: ob bilis acri- 22. 30.
moniam. Signa manifesta ab
essentia. Antecedit excretio
mordacium, vnde sequuntur
abrasiones, postea excernitur
paulum cruoris, crustula: Fe-
bris ex motu ob frequentiam
desidendi. Gal. An & ex Ulce-
re inflammato? Vigilia ob
continuum desidendi cupidi-
tatem, & dolorem. Discerni-
tur sanguinolenta excretio à
fluxu Hepatico, abrasionibus
& frequentia. Si in gracilibus 3. Aph. 30
Intestinis, mixtus valde san-
guis, aut rasura cum fæcibus,
dolor acrior. Si in crassis, pars
aliqua supernatat fæcibus,
præcipue sanguis: Pingue,
quoddam coniunctum, quod
sublinat totum Intestinum, si-
mile pinguedini. Post pun- 1. 10. af. 4.
ctionem statim subsequitur
excretio. Tenesmi signa. Ve-
hemens tensio, magna cupidi-
tas deijciendi, sed pauca ex-

c 4 cre-

cretio. Pondus in extremo Intestino, vnde vulgo Ponderi. Initio pituitosa, & pinguis, postea ramentosa per totum, morbi decursum impermixta. Aiunt lapidem aliquando

6. lo. af. 2. callosum excretum. Prognostica. Si incoeperit ab Atra bile,

4. Aph. 24 lethalis: nam fit veluti cancer exulceratus. Si succedat in Dysenteria nigra deiectionio, non lethalis. Aet. Discernitur Atra bilis ab humore nigro, colore splendente, & si in terram decidat, bullas attollit.

ibid. 23. Gal. Humor niger à sanguine nigro: quia humescit, non concrescit. Si à flaua bile, difficilis.

7. Aph. 23 Deterior si à Porracea, Sincera mala, idest non permixta cum aquosa humiditate. Gal. Si à pituita salsa, facilis, sed diuturna. In ieiuno

6. Aph. 4. Intestino difficilior, ob tenuitatem, ob vicinitatem Vesicae felleae, ob multitudinem vasorum. Ob haec vulnera lethalia.

De Morb. Ventr. 105

thalia. Idem de Ileo dicendū. In crassis facile sanatur. In recto facillime. Tenesmus periculum affert retentionis vrinæ ob compressionem colli Vesicæ. Hinc forte aliquando *5. Aph. 56* lapis Vesicæ excretus est erosio Vesicæ collo in rectum Intestinum. Si veluti carunculae exeant in Dysenteria, lethale. In longis dysenterijs *4. Aph. 26* indix ex fastidio malum. Cum febre peius, ob inflammationem effatu dignam. Si in longum protrahitur, quæ Caliacapassio vocatur, in Lienteriam, aut in Aquam intercutem transit, & moriuntur. Si *Ibid. 43.* quidem robusto adhuc corpore curetur, spes est fugæ. Si vero colliquato iam, & Ventre omnino exulcerato, nulla vitæ spes superest. A furore dysenteria bonum. Lienosis *7. Aph. 5.* difficultas Intestinorum, bonum. *6. Aph. 48.*

c 3 Cu-

*Curatio Dysenteria .**Cap. 16.*

IN curatione Dysenteria primū Vlceris causæ tollendæ sunt, postea vlcus ipsum cito siccandum, ne profundius corrodat: amplius sedanda Symptomata, dolor & febris. Ad causas humores abradentes euacuare, & contemperare. Abstergere eos, qui iam in hærent Intestinis. Euacuatio, si cum plenitudine sit, per venæ sectionem. At in fluxu Alui, prauī humores non trahendi in Venas. Trall. Venam secat, si inflammatio Intestinatorum vrgeat, & febris: præcipue in Tenesmo, vbi ex tumore Intestini comprimitur collum Vesicæ. Sed prius Clysteri abluendum Intestinum, & dolor mitigandus. Ex ijs quæ sine morfu abstergunt, optimum est ex Prisana cum
Oleo

Oleo Rosaceo, & pinguedine
Hircina in Oleo liquata: sine
sale, eius loco Saccharum: itē
oui Vitellus, aut etiam cum
Albumine, vt adhæreat Inte-
stino, & ab humoribus fluen-
tibus protegat. Purgatio pra-
uorum magis conuenit. Hipp.
inquit. Huius vbi purgaueris *de Aff.*
caput pharmaco in potu exhi-
bito, quod sursum pituitam
purgat, & Aluum Lacte cocto
elueris, reliquum corpus cu-
rato, & siquidem febre carue-
rit, pinguibus, & dulcibus, ac
liquidis semper ea quæ insunt
ex Aluo subducito: & multa
calida partes sub Vmbilico la-
uato, si dolor affuerit. Potus
autem & forbitiones ac cibos
exhibeto, vt scriptum est in
medicamentario libro: at li-
ber hic desideratur. Iubet au-
tem purgandum per superio-
ra, ne prauī humores trahan-
tur ad partem affectam. Sed
loco medicamenti purgantis,
e 6 quo

108 *Artis Medicæ lib. 7*

quo utebantur antiqui per superiora, nos simplici vomitorio utemur, ex aqua Hordei calida adiecto Oleo. Trall. duobus primis diebus inediã præcipit, & sanguinem mittit. Tertia die Lac exhibet coctum cyathis tribus, & post duas horas, totidem, aliquando, & tertia vice, ut integra Hemina absumatur. Altera die Hemina dimidium pro vice: Tertia Heminam integram: tribus horis post Lactis assumptionem pulticula exhibenda aut alius eibus. Hæc ratio curandi facit & ad abluenda Intestina, & ad acrimoniam contemperandam, præterquam quod Lac sanat omnia ulcera interna. Hodie utimur aquis metallicis ad abluenda Intestina, & ulcera siccanda, aqua Tertucci, vel Balneoli quæ mitior est, utræque salis, aut per Clysteres ubi affectio est in crasis Intestinis;
aut

aut in potu pōdere librarum
quinque, vt descendat vbi su-
periora Intestina laborant.
Mirum cum salæ sint, abster-
gere sine morfu, & dolorem
mitigare. In febre, & pueris,
& mulieribus, vtimur mitio-
ri, quæ Balneoli est. Si aquæ
huiusmodi non adsint, Sero
Vaccino vtendum, aut Capri-
no, aut Lacte Asinino, extin-
ctis calculis ignitis, aut Chaly-
be. Sed aquæ prædictæ citius
descendunt ad Intestina ob na-
turam Salis. Ad vlcus, si val-
de inflammatum, mitiganda
inflammatio repellentibus,
deinde digerentibus. Sed eli-
genda quæ illinendi vim ha-
bent, vt hæreant, & tectorij
modo partem tueantur ab hu-
morum transitu. Repellunt
Plantago, Rubus, Polygonū,
Portulaca, Solanum, Hyo-
scyami folia, Cucurbitæ, Suc-
ci vel decoctiones in Clysteri-
bus ad Intestina crassa, Aquæ
stil-

110 *Artis Medicae lib. 7.*

stillatitiæ in potu ad gracilia,
cum sy. de Endiuia, succo Ace-
tosæ, Violato, de Portulaca,
Ptisana cum aqua pluuiæ: fa-
ciunt & ad febrem. Oleum
Rosatum Omphacinum, Meli-
num, in potu, aut Clysteribus;
& extra ad totum ventrem.
Illinentia Anodyna, Albumen
oui, Vitellus, sepum Hirci-
num: Mucillago Psylli, Foeni-
græci, Altheæ, Cera Gummi.
Ex his quædam repellunt,
quædam digerunt. Cera, &
Sepum Oleo Rosaceo soluen-
da, vt liquida permeent. Ad
• *Meth. 7.* Vlcus simplex: siccantia, au-
stera, acerbæ, non quæ inimi-
cæ, sed familiariæ, tum cibi tū
potus. Medicamenta: Hypo-
cistis, Balauſtium, Cytini Pu-
nicorum, Galla, Malicorium,
Acacia, Rhus, Rosa, terra
Samia figillata: ex decocto
Mali Cotonei, foliorum Len-
tisci, Rubi, Vitis, Myrthorū
in Vino austero, vbi non adest
in-

De Morb. Ventr. 111

inflammatio, addenda glutinosa, vt hæreant, Gummi, Tragacantha. Ad Vlcus sordidum, quod dignoscitur pure cum fæcibus exeunte, abstergentia efficaciora, dein Sarcotica, & Epulotica. Abstergūt Mel crudum, Mel Rosaceum, sed efficacius ad Nomas Dioscor. Muria. Gal. generosum remedium tradit: Cæpa cum pane esitata, postridie infusa, Muria acerrima: at quosdam vi medicamenti cōuulsos interijssse, alios vna die fanatos. Mitius igitur, & tutius, infundātur Muria ex piscibus salitis vnciæ duæ, Ptisanæ ad mitigandum vnciæ sex: & augeatur in dies Muria, donec ferre possit. Postea exhibeatur Lac extinctis calculis, vel ferro: Addēda Sarcotica, Thus, Myrrha: & Cicatricem inducentia austera: aliquando Opiū ad dolorem mitigandum. Cōposita multa extāt apud Gal. in.

12. Met. 1

9. Cap. 5.

in.

112 *Artis Medicæ lib. 7.*

4. Met. 7.

inter cetera . Gallæ , Fructus
Ericæ , Opij , singulorū drach-
mæ quatuor , formentur pastil-
li ex aqua Dosis scrupulus
vnus ex aqua vel vino . Ad Te-
nesmum acriora , quæ alibi in-
tus prohibentur . Carta com-
busta , Alumen , Auripigmen-
tum , Sandaraca , Squama æ-
ris , Calx viua , Sulphur , Fæx
vini vsta , Cadmia , Gallæ v-
stæ , Suber vstus , Cerussa . Fiunt
ex ijs pastilli diuersi , qui inij-
ciuntur ex vino , aut succo Plā-
taginis , aut Ptisana , Decocto
feminis Lini , Fænogræci : in
pueris cyathus vnus , vel duo ,
in feminis tres , in viris qua-
tuor . Trallianus fomenta , &
suffitus ad sedem adhibet , ex
decocto anodynorum , aut di-
gerentium , & siccantium , vt
fumus excipiat in sella per-
forata : aut Pix brutia super
carbones . Alij Nuces pineas
imponunt : vt fumus excipia-
tur : postea inungatur ex Bu-
tyro

De Morb. Ventr. 113

tyro, aut Cerussa, aut Lithargy-
ro ex Oleo Rosaceo: Verbas-
cum cerato Rosaceo intromis-
sum. Vitia in sede mitioribus
tractanda ob sensum. Loci ca-
lidity, & humiditas requirit
frigida, & sicca sine morfu. Al-
uus seruanda humida, ne ob-
sacum siccitatem irritetur: ex
Damascenis coctis, Ferculis
ex Malua. Victus dum viget
inflammatio tenuissimus, in
Tenesimo plenior, Hipp. in-
quit Inedia auget tormina, cū *de Aff.*
cibi adsunt, minorem morda-
citatem Intestinis inferunt,
quæ præterfluunt. Ptisana ex
Hordeo torrefacto: Oriza, Lē-
ticula decorticata, Quinque
folii radix Celsi. & Diosc. po-
tus aquæ Calybeata, vel vini
austeri, vbi febris non adest.

De

De Hepatis constitutione, & affectibus. Cap. 17.

6. *Pla. 8.* **H**epar, Iecur, principium
de Alim. ponitur à Galeno ani-
 mæ vegetatiuæ concupiscibi-
 lis, ideo & sanguinis, & Vena
 4. *vs. pa. 12* rû Hip. Est Venarû radicatio:
 idest Cauæ, & Portæ. Caro val-
 de sanguinea, vnde iudicat
 Gal. oriri sanguinẽ, & venas.

In simis vena Portæ per
 Mesenterium, & Omentum,
 ramos multos fert in Ventri-
 culum, Intestina, & Lienem,
 comitantibus arteriis etiam
 1*bid. 13.* in Hepate. In Gibbis radices
 cauæ sine arteriis: Quia vena
 Portæ, quæ alimentum in He-
 par fert, eget multitudine ca-
 lidi innati, vt alimentum in
 venas trahatur, & conuer-
 tatur in sanguinem. Vena au-
 tem Caua paucioribus arte-
 riis eget, vt sanguis iam con-
 coctus distribuatur in singu-
 las

las partes. Fellis meatus inter utriusque venæ ramos excrementum biliosum in Vescicam fellis reponunt, ut inde feratur ad Intestinum Duodenum. Alterum vero sanguinis excrementum crassius, qui veluti sæx sanguinis est per rimum venæ portæ fertur in Lienem, ut inde per Intestina crassa expurgetur. Vult Gal. non coniungi ramos venæ cavæ cum ramis venæ portæ in Hepate, licet fines utrorūq. ob exilitatem non pateant sensui. Sed Arist. asserit continuas esse omnes venas cum ^{3. Part. 4.} ^{2. par. 8} corde, ut sanguis eius calore foueatur. Galeno satis fuit continuas esse cum Hepate: at quæ in Pulmonē ex corde feruntur, non coniunguntur cum Hepate. Tegitur Hepar extrinsecus membrana tenui ex Peritoneo, in quam nervulus exiguus inferitur. Plato Hepar tanquam pecus agreste

ste in quo sola cibi concupi-
 scentia adest, alligari oportuit
 nervo, ut obediret vsui ani-
 malis: Quasi nutritio in ani-
 mali non fiat sine aliquo sen-
 su. Hepatis opus est Chylum
 in sanguinem conuertere pro
 totius alimento, quod per se-
 cundam coctionem fit, dum
 alimentum per venas transit,
 non in communi Ventre. Id
 efficit calore insito, sed calore
 cordis ad actum redacto, quod
 est vitam participare. Situs
 in dextro Hypochondrio Ven-
 triculum amplectitur, & fo-
 uet. Hepatis vitia, quibus læ-
 ditur sanguificatio, & reliquæ
 facultates naturales, sunt in-
 temperies quæcumque, Tu-
 mores, obstructions. Ob prin-
 cipatum autem læsio commu-
 nicatur toti corpori ratione
 alimenti. Sanguificatio di-
 minuta aut abolita ex frigidi-
 tate, Atrophiam parit, aut Hy-
 dropem sanguine aquoso, &
 pitui

5. lo. af. 7
 8. Cat. 6.

pituitoso. Deprauata autem
ob caliditatem, sanguineum
biliosum, aut melancholicum
facit, unde Scabies, Lepra, & 3. Sy. ca. 1.
alia huiusmodi. Attractio im-
becillis Aluum liquidam fa-
cit, & totius nutritionem di-
minutam. Deprauata cum
attrahit etiam praua, Aluum
siccam reddit, & venas totius
prauis humoribus replet: vn-
de prauus habitus, aliquando
Ictericus. Retentio imbecil-
lis Alui fluxus, aliquando san-
guinis excretionem, quæ pas-
sio Hepatica vocatur. Depra-
uata, cum ampliori tempo-
re retinetur alimentum, san-
guis assatur, unde passiones
Hypochondricæ fiunt. Expul-
trix diminuta excrementorum
efficit, vt excrementa regur-
gitent in varias partes, aut pu-
trefacta febres varias excitent.
Deprauata, ex qua multa ex-
cretio aut per Aluum, aut per
vrinam: aliquando sanguinis
fit

118 *Artis Medicæ lib. 7.*

fit, irritata plus quam oportet facultate expultrice.

De Hepatis inflammatione.

Cap. 18.

Int. aff.

Tumores Hepatis cum febre, inflammationes sunt vel Erysipelata, aut ex solo sanguine, vel bile, aut cum ceteris excrementis. Hipp. morbum Hepaticum vocat, cuius tres species tradit. Primus ab atra bile fit, cum influxerit ad Hepar: accidit autem maxime in Autumno, in mutationibus anni: Æger hæc patitur, Dolor acutus ipsi in Hepar incidit, & sub ultimis costis, & ad humerum, & in claviculam, & sub mammam, & suffocatio fortis tenet, & aliquando liuidam bilem reuomit, & rigor, & febris primis diebus debilior habet, & dum tractatur, Hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, &

De Morb. Ventr. 119

& cibi quos prius comedebat, suffocant ipsum, & ingesti vrunr, ac torquent Ventrem: Morbo progrediente febres remittunt, & à paucis cibis repletur. in solo Hepate dolor restat aliquando fortis, aliquando quietus, aliquando adeo acutus, vt æger de repente animam efflauerit. Secundus morbus Hepaticus. Dolores eodem modo premunt in Hepar, & color differt à priore, nam Malicorii formã habet, maxime incidit in tempore æstatis: fit autem & à Bulæ carnis esu, & Vini potu nimio: Hæc enim omnia in æstate infestissima sunt Hepati, & bilem maxime ad Hepar adducunt. Vnde dolores acuti incidunt, & nō desinunt vlla hora, sed semper magis premunt. Aliquando vomit bilem pallidam, vnde melius sibi habere videtur. Si vero non vomuerit, bilis ad oculos

los peruenit, & fiunt valde pallidi, & pedes intumescunt.

Tertius Hepaticus morbus.

Reliqua quidem patitur æger, vt priores: Color autem niger est. At Hepatis fel pituita, & sanguine repletum, vt ratiocinamur, dirumpitur, & vbi diruptum fuerit, celerime insanit, & indignatur, & loquitur stulta, & latrat veluti canis: & vngues punicei fiunt, & oculis videre non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Signa ex dictis manifesta

9. 10. af. 7. sunt. Gal. Hæc tradit. Dolor grauis in dextro Hypochondrio, trahens tota præcordia, aliquando extenditur vsque ad iugulum tensa Vena Cava, aliquando ad costas nothas:

2. 10. af. 3. Archigenes dolorem Holcimon vocat, idest tractorium, Tussis exigua, sicca, vnde ambigit cum Pleuritide, Febris, Respiratio parua, & crebra.

ob

De Morb. Ventr. 121

ob compressionem septi trāſ-
uerſi. Pulsus frequens, durus, 4. *Ca. pu. 7*
veluti ferrinus, vibratus. Lin-
guæ color rubens, deinde ni-
ger. Cibi fastidium ingens,
ſitis inexhausta. Vomitus bi-
lis ſincerae, vitellinae, ærugino-
ſæ. Aluus ſicca. Sed Hepa-
te debilitato, liquida deie-
ctio, ſanguinolēta. Singultus: 5. *Aph. 58*
Gal. In maximis inflamma-
tionibus ob conſenſum, in
Gibba parte cognoscitur vi-
ſu, ſaltem tactu. Discernitur
ab affectis muſculis, quia Tu-
mor in Hepate circumscrip-
tus & coactus: in muſculis ſu-
ſus, ſecundum torum ductus.
Non poteſt deprehendi in Hy-
drope, aut intenſione muſcu-
lorum. Communicat magis
ſuperioribus ex vrinis. In Si-
ma parte non cognoscitur,
nec viſu, nec tactu, conſentit
magis cum interioribus, Ven-
triculo, Meſenterio. Deiectioni-
bus ſanioſis. Prognostica:
f est

112 *Artis Medicæ lib. 7.*

est inter acutos, si vires imbecillæ, omnino morietur. Si valentiores, difficile euadet. Vires succumbere indicium, Pulsus mutatio ad magnam imbecillitatem, Syncope, Sudores circa gulam & frontē: 12. Met. 3
4. Aph. 48 Extrema frigida, interna vri. Erysipelata magna ex parte in Tabem: Quædam in Scyrrum, Hydrope m, Atrophiam, Hepaticam passionem. Sanantur parvæ inflammationes, quæ non semper ab initio febrem coniunctam habent. Trall. Quæ in Sima parte, per Alui deiectionem, aut 7. Met. 13.
3. lo. af. 7. vomitum. Accedente coctione sanguis vitiosus, cœnosus, & putris deijcitur, quo distinguitur ab Hepatica passione. Quæ in parte Gibba, soluitur per vrinam: Aliquando redditur pessima colore, & odore, purgante se viscere; unde imperiti decepti putantes periculum subesse. Aliquando per

per abscessum in pudendum, 4. Act. 19
Testiculos, Crus. Quorum
Hepar suppuratum adurit, &
si pus purum fluxerit, & albū,
evadunt: quia in tunica pus
continetur, Si qualis amurca, 7. Aph. 49
pereunt. Scissio Hepatis le- 6. Aph. 12
thalis.

*Curatio inflammationis He-
patis. Cap. 19.*

AD inflammationis cau-
sas fluxionem & plenitu-
dinem secunda Vena cubiti
dextri interna, aut media, aut
externa, si aliæ non apparue-
rint, aut ex dextra manu: nō
puero, aut seni, neque viribus 13. Met. 11
imbecillis. Statim ante vsum 11. Met. 15
localium, Reuulsio per vincu-
la ad actus: Cucurbitulas in
Dorso, ad Nates. Hirudines
ad sedē loco sectionis Venæ:
& pro supplemento in valen-
tioribus. Purgatio non conue-
nit in principio, quia auget in-
flam-

124 *Artis Medicæ lib. 7.*

inflammationem. Clysteres cōceduntur ex sale, vel nitro cū aqua mulsa. Auic. ex decocto betæ, sale vel Saccharo rubeo.

24. Met. 3. Repellētia post sanguinis missionē cum facultate astringendi, duplici ratione: Vena ad robur particulæ ne recipiat fluxionem, & concoquat sanguinem pro toto corpore: Altera ad exprimendum id, quod illapsum est. Non actu frigida, neque crassarum partiū, quia in altum non descendunt, vt Oleum Myrthinum. Extrinsecus perfundere oleo Omphacino, Rosaceo, iniecto Absinthio Pontico. non alio ob nimiam amaritudinem: Melino, Mastichino, Lentiscino, Nardino cum Rosaceo. Cataplasma ex Cotonei carne cocta in Vino austero, vel aqua addito Cerato ex dictis, admixtis quibusdam acribus vel amaris ad penetrationem, vt radice Iridis. Vnguentum

San-

De Morb. Ventr. 125

Sandalinum. Mes. præcedant
fomenta ex decocto Rosarū,
Labruscæ, Absinthij, herbæ
sanctæ Mariæ. Intus non a-
stringentia, vt Malum Puni-
cum, quia coarctant meatum
bilis, & non sinunt saniem ex-
purgari ex inflammatione ge-
nitam: nocent magis, vbi in-
flammatio est in Simis: Con-
ueniunt attenuantia sine mor-
su, & detergentia non calida,
quia non repellunt, & inflam-
mationem augent: sed frigi-
da non actu: Oxymel cum
aqua Auic. aqua Endiuia, So-
latri, Hordei, Virgæ pastoris,
idest Polygoni, Plantaginis,
Alchechengi, Cucurbitæ, Cu-
cumeris, Cuscutæ, cum Ace-
toso s. in calidioribus: Miscet
calescentia & Aromatica
ad refractionem, & ad pene-
trationem: Absinthium, Ca-
lamum aromaticum. Ad hu-
mores impactos digerentia,
quæ euacuant insensibiliter

13. Mes.

14.

f 3 per

per transpirationem. Calida
 tenuium partium, relaxantia,
 quo nocent robori Hepatis,
 ob id miscenda astringentia,
 contra quam in ceteris par-
 tibus. Ex solis relaxantibus
 interijt Theagenes Philoso-
 phus abortis subito sudori-
 bus paruis, & lentis. Ad hu-
 morem saniosum ex inflam-
 matione resudantem, bilem,
 & cetera excrementa, digeren-
 tia magis, cum sunt in substan-
 tia: abstergentia, & obstru-
 ctiones auferentia cum sunt
 in vasis: quorum vsus est cū
 cessauerit fluxio, paulatim mi-
 nuendo astringentia, augen-
 do digerentia: vt in principio
 vincant astringentia, in fine
 vincant digerentia, & aperien-
 tia: numquam sincera, vt in
 ceteris. Digerentia extra:
 Oleum Nardinum, Absynthi-
 num ad perfundendum Cata-
 plasma ex Glande vnguenta-
 ria expresso prius Oleo, Ab-
 syn-

13. Met.

16.

11. Met.

16.

Synthio tuso, Iride, Schænan-
tho, Spica, Cypero, Vini fæ-
ce, Hyssopo ex Vino astringē-
te, in quo incocta Mala Cydo-
nia, aut Struthia, & Celtiana,
Lentiscus, Myrthus, Rubus,
Labrusca. Sublato Cataplas-
mate, super Viscus imponen-
da Cerata, & Epithemata ex
Oleo, in quo eadem iniecta
sint. Intus digerentia sine
morsu non dulcia, quia illis
intumescit, non Mulsæ, sed O-
xymel cum aqua, Ptisana: de-
coctio Acetosæ, Cicorei Ab-
synthii syrupperi in pauca quā-
titate ob dulcedinem: Post
principia: Trocisci ante po-
tionem dandi de Absynthio,
de Rhabarbaro, de Eupato-
rio: & quæ mouent vrinam. Si
in Gibbis læsio fuerit, Apii de-
coctum, & cum apparuerint
coctionis aliqua signa: Asarū
Nardus Celtica, Phu, Smyr- *13. Mo. 15*
nium, Meu. Nos syrupperum
acetosum de duabus radici-
bus.

f 4 bus.

bus. Si in finis & Mesenterio,
 quæ Alium movent: Cnicum,
 Vrtica, Mercurialis, Epithi-
 mum, Polypodium, Cortex
 Ellebori nigri cum Ptisana,
 vel aqua incoctus, vel insper-
 so puluere. Nos tutius uti-
 mur Rhabarbaro, aut sy. de
 Cicorea Niceoli. Clysteres
 primo leniores, postea ex Hys-
 sopo, Origano, Colocynthide,
 Centauro minori. Valēt præ-
 cipue, ubi relictus tumor scir-
 rosus.

Ad Erysipelas Hepatis A-
 uic. similem curationem con-
 uenire, ut in inflammatione.
 At in omni Erysipelate reme-
 dia ad feruorem magis requi-
 runtur, quam ad tumorem.

13. Met. 8. Prius extinguere postea dige-
 rere: differt & Euacuatione.

Non enim Venæ sectio, sed
 14. Met. 3 purgatio bilis conuenit. Ras.
 in dolore Hepatis ex bile, tan-
 tum refrigerat, & purgat. An
 in omnibus febribus putridis
 sal-

De Morb. Ventr. 129

saltem ad euentationem salu-
berrimum est Venam secare? *11. Me. 15*
& in febris ardentissimis
etiam vsque ad animi deli-
quium? Conuenit autem fer- *1. Aph. 23*
uente in Venis bile, non si ex-
tra tantum: Cognoscitur, si
vrina rubea, & crassa. Nam
simul cum feruore significa-
tur plenitudo in Venis. Si pra-
uus color in vultu, Raf. non
conuenit, quia significatur
paucitas sanguinis: sed eius
loco purgatio ex ijs, quæ non
trahunt à longinquo: in ini-
tio antequam figatur humor,
quia turget: Ex decocto Pru-
norum, Tamarindorum, singu-
lorum vnciis tribus. Sy. Rosa-
tus solutius cum aqua Endi-
uiæ: Lac asininum coctum,
Clysteres ex Cassia: Cucurbi-
tulæ ad reuellendum in Dor-
so. Facta euacuatione, ad hu-
mores relictos extinctio fer-
uoris etiam ante purgationē
ex aquæ frigida potu quam-

f s pri-

130 *Artis Medicae lib. 7.*

primum, si fuerit simplex Erysipelas, non aliter sanaueris: Si cum Phlegmone, expectanda coctionis nothæ. Potestate frigida aqua Cicorii, Endiuizæ, Sonchri, Acetosæ, Hordei, cum sy. Violato, Extra Epithemata actu frigida etiam in Niue refrigerata Auic. nisi cū Phlegmone fuerit. Ex aqua, Rosacea, Acetosæ, Lactucæ, Violarum cum modico Aceto, Agresta, Speciebus frigidis Epithematis Hepatis: Imponantur lintea madida, & cum tepere incæperint, renouentur. Ras. Cataplasma ex Semperuino, Solano, Portulaca, Umbilico Veneris, Psyllio, Lenticula palustri: Cerata infrigidans Gal. Rosatum, Sandalinum, ex aqua frigida. Post extinctionem digerentia, ut in inflammatione: Chamæmelum, Absynthium. Intus mouentia urinam, sed frigidiora. Semina communia, Ca-

34. Met. 3

De Morb. Ventr. 131

Capillus veneris. Trocisci de
Berberis cum Acetoso. s. Mo-
uentia Aluum ex Rhabarba-
ro. Victus tenuissimus magis
quam in ceteris partibus, ne
Phlegmone augeatur, & ne ali *11. Me. 17*
mentum præ ceteris corrup-
patur tenuium partium, si-
ne lentore, vt per angustos
meatus transeat, & abstergat.
Non Halica, sed Ptisana aut
Auenæ cremor. Trall. Mica
panis cocta, vel lota non co-
piofa. Amygdalarum succus
non Oua, quia crassi succi, &
flatuosa. In Erysipelate Intu-
bus, Cicorium, Troximus, Son-
chus, tenera Beta, Pisces cum
iure decocti: non dulcia, non
vinum. Rasis concedit vinum
Granatorum ad repellendum
quod Gal. & Trall. damnant
propter astrictionem. An mo-
dica astrictio non incommo-
da, sed iuuat vt in Absynthio? *5. Sim. 12.*
Succus Limonum magis exte-
nuat, & minus astringit: Ace-
tum

132 *Artis Medicae lib. 7.*

tum multa aqua dilutum ne
mordeat. Cibus, & potus a-
ctu frigidus in Erysipelate.
Int. aff. In declinatione vinum album
tenue. Paulo diuersa est Cu-
ratio apud Hippocratem, sed
efficacior. Prius dolores mi-
tigat per fomenta tepesacto-
ria, vt in Pleuritide. Sedato
dolore multa aqua calida la-
uat, idest perfusionibus, vt do-
cuit in Peripneumonia: &
Mulsam præbet in potu, aut
Vinum seu dulce, seu austerū
vtrum profuerit: & sorbitio-
nes qualis in Pleuritide. Po-
tione præterea vtitur ad dolo-
rem sedandum ex ouo cocto
Gallinaceo, à quo trito succū
exprimit, cui addit Succi So-
lani vncias quatuor, aquæ
mulse, vncias duas, detur in
potu quotidie donec dolor
conquiescat. hoc remedium
refrigerat, & redellit. Aliud
degerens recipit Sylphij suc-
cum erui magnitudine, & Q.

riga

De Morb. Ventr. 133

riganum tritum in Vino albo,
ieiuno Ventriculo. Purgat au-
tem aut Scamonio in ea quæ
fit à flaua bile, aut Clysteri:
aut solo Lacte, quod omnibus
confert. Nam singulis diebus
mane exhibet Lac Asininum,
aut Caprinum coctum, aut
Bubulam crudum, admixtū
cum melle, aut aqua mulsa,
singulis diebus, & abstineat à
cibis donec morbus iudice-
tur. Si interim adueniat suffo-
catio, vomitum prouocat, ex
melle, aqua, aceto, & sale
tepefactis cum ramulo Origa-
ni, quo in potu dato, agrum
stragulis operit, vt sudet, &
cum vomitus prorumpit, ad-
iuuandus cum penna: & no-
ua portione Mulse tepidæ: Si
bilis, & pituita eruperit, iterū
post quatuor horas repeten-
da portio eadē est, vt perficia-
tur vomitio. Post morbi iudi-
cationem vtatur cibis puris,
& modicis, nec curandum.

738

vt

134 *Artis Medicae lib. 7.*

vt reuertatur morbus. Alio-
qui grauis est, & diuturnus.
Si ex his non sedetur dolor,
Vena dextri cubiti secanda:
& sorbitionibus, vt in Pleuri-
tide: Postquam vero ex usu
Lactis crassifactus fuerit, &
Hepar in magnum humorem
elatus, inurere oportet per bu-
xeos fusos feruenti Oleo tin-
ctos, aut fungis: octo crustis.
hoc enim modo sanus fiet:
quod si hæc non profint, om-
nino morietur.

*De Tumore Hepatis sine fe-
bre. Cap. 20.*

Tumores Hepatis sine fe-
bre, alij ratione Vasorum
sunt, alij ratione substantiæ.
In vasis obstructions sunt a
crassis, & viscosis humoribus,
quibus impactis necesse est va-
sa dilatari. Causæ sunt Cibi
crassi, vt legumina, Caro Bu-
bala, Vina dulcia, nigra. E-
xer.

De Morb. Ventr. 135

xercitatio violenta post cibū,
nam distribuit cruda: Potus
aquæ frigida ex niue, nam po-
ros constringit, & indurat. a-
quæ palustres, Australes, sal-
sæ, metallicæ. In substantia, *de ac. aq.*
tumores molles, vel duri. Oe-
demata, Scirri, Inflationes.
ob impeditam distributionē
alimenti collectis humoribus
aut pituitosis in Oedemate,
aut Melancholicis in Scirrho,
aut flatu in inflatione. pro-
pter obstructions, aut Hepa-
tis imbecillitatem. Ad surro-
sam dispositionem, vt pluri-
mum perueniunt ex inflam-
matione & Erysipelate refri-
gerato, ob Iecinoris substan-
tiam veluti lutosam, præcipue
si interim cibus crassus, & vi- *13. Mat.*
scosis vtantur. *16.* Ad Oedemato-
sam ex aquoso sanguine, potu
multo, ad Flatuosam ex cibus
flatuosis. Signa: Grauitas in
dextro Hypochondrio in om-
nibus. Sed Flatuosi, & Ob- *5. lo. af. 7.*
stru-

136 *Artis Medicae lib. 7.*

structionis etiam tēſionis ſenſus. Si in Gibba, tumor tactu cognoscitur durus, vel mollis, Tensio. Anhelatio cum ad accliuem locum ascendit, aut in cursu ob ſepti tranſuerſi cōpreſſionem. In Sima affligit magis aſſumpto cibo, quia Ventrículum comprimit. Aliquando vomitus bilis cōpreſſa veſica fellis: Comprimitur & Aorta, vnde pulſatio ſentitur ſub Ventrículo. Prognostica. Scirri confirmati incurabiles, reliqui tumores difficile curantur. Diuturnitate tranſeunt in Hydropē Fluxū Hepaticum. Obſtructio meatus fellis parit morbum Regium. Curatio obſtructionis ex craſſis, & viſcoſis humoribus. Incidere, abſtergere per acria, amara non ſine aſtrictione. Decoctio Hyſſopi, Origani, Calamenti, Thymi, Serpilli, Iridis, Polii, Marrubii, Eupatorii, Abſinthii, ex Mulſa.

De Morb. Ventr. 137

sa, Oxymelite, sy. de duabus
radicibus, de quinque radi-
cibus cum aceto. Aromati-
zetur cum Spica. Aetius Pe-
lecini semen cochleari men-
su- ra cum Vino, aut aqua multa,
Capni succus, quæ Chelido-
nia appellatur, circa sepes ad-
densatus in pastillos, semel
exhibitus dolorē aufert, ter,
liberat in totum ab obstru-
ctione. Trocisci de Absinthio
de Eupatorio, de Rhabarba-
ro. Euacuatio per interualla
ex Rhabarbaro, Agarico, A-
loe, Colocynthide. Extrinse-
cus fomenta ex Absinthio, Me-
liloto, cortice Citri, Spica, Ce-
rata ex oleo Nardino, & Cin-
namomo. Ad Flatus: Semina
Dauci, Anisi, Apij, Ameos,
Piper Zinziber. Cardamomū,
Amomum, Cinnamomum, ,
intus in cibis, extra in Cera-
tis, & Epithematis. Guttae
tres Olei ex Aniso distillati
cum Vino, aut Mulsā in potu.

Ad

Ad Oedema, calida, & sicca
 eadem quæ ad obstructions.
 Aqua Tettucci, Ferreæ, scilicet
 Villensis, Ficoncellæ: Scor-
 ria ferri, vel Scobes aceto præ-
 parata in Vino: sufficiunt vn-
 ciæ quatuor in Vini flauī li-
 bris quinque, infundantur per
 dies tres: Assumat mane vn-
 cias duas præsumpto Diarho-
 don, aut cortice Citri condi-
 to: postea exerceatur per duas
 horas. Cum prope fundum
 fuerit, abiiciatur. Ad tumore
 scirrosū prius emollire, po-
 stea dissecare, & dissoluere al-
 ternatim sæpius. Non valde
 calida nec sicca, nam indurāt
 magis & incurabilem reddūt.
 Quæ ob nimiam siccitatem
 emolliri nequeunt, vt lapidea
 substantia: egent iis quæ dis-
 secant, & frangant. Reperti
 sunt Calculi in vesica fellis.
 dicentur remedia in Calculis
 Renum, & Vesicæ. Intus dis-
 secantia validiora absque mul-
 ta

14. Met. 5

5. Sim. 7.

De Morb. Ventr. 139

ta caliditate : Capparis ex *13. Mo. 17*
Oxymelite : Oxymel compo-
situm : Sy. Bisantinus : Poliū,
Marrubium, Chauæ Pitis, Ru-
bia, Anisum, Amygdalæ ama- *6. M. f. 3.*
re, Pistacea, Grana Pini Auic.
Trocisci de Lacca, Raf. Alter-
nare ex Oleo Amygdalarum
dulcium Terebynthia. Vinū
album tenue, non dulce. Non *5. M. f. 2.*
Lac, non balnea post cibum,
neque exercitatio. Clysteres
ex decocto Hyssopi, Origani
Colocyntidis, Centaurii. Ex- *13. Mo. 15*
tra emollire calidis, & humi-
dis. Altheæ radix cum seuo,
Maluæ syl. folia: Pinguedines *5. Simpl. 8*
Medullæ : Cucumeris syl. ra-
dix. Hammoniacum, Galba- *7. Catag. 2*
num, Bdelium, Styrax cum
aceto. Pyrites, aut lapis mo-
laris in aceto extinctus, vt va-
por excipiatur, & puluis Em-
plastro additus. Omnibus ad-
denda astringentia aromati-
ca. Emplastrum de Meliloto.

De

De Hepatica passione.

Cap. 21.

3. lo. af. 7.

6. Catat. 6

Appellatur Hepatica passio Hepatis imbecillitas ob solam in temperiem, ex qua deiciuntur sanguinolenta. Trall. Dysenteriam Hepaticam vocat: vulgo fluxus Hepaticus. Alius est morbus Hepaticus apud Hipp. Et Celsum, idest Hepatis inflammatio. Quæcunque Hepatis intemperies aut cum humore, aut sine, imbecilles facultates reddit, aut omnes, aut quasdam, si diuturna fuerit, aut magna: qualis est venenosa in pestilentia, aut ex morfu Hæmorri serpentis, in quo omnes Venæ sanguinem fundunt. Quamvis autem omnes imbecillitates sub Hepatica passione intelligantur, præcipue tamen dicitur, cum læditur coctio sanguinis, unde

De Morb. Ventr. 141

De cruenta fit excretio, quod
otius vitium Venarum est,
quam sanguinis. Initio egre-
ditur veluti lotura carnis,
quod imperfectam coctionē
significat ex frigiditate: aut
ob parvam moram, quod vi-
tium est Retentricis ex humi-
ditate, aut Expultricis ob ca-
liditatem magis. Postea suc-
cedit niger, affato sanguine &
corrupto ob caliditatem cum
febre: aliquando tamen ob
rigiditatem fit sanguis ni-
ger, aut veluti sanguis: vt Gal. 4. Aph. 21
estatur. Auic. Vtrunque,
dest sanguinem tenuem, &
rassum & à calido, & à frigi-
do fieri, tendere etiam ad vri-
am. An excretio sanguinis
prius fit per Diapedesim te-
niori parte transcolante, po-
tea per Anastomosim, aut
corrosionem, vnde sanguis
rassior?

Omnis autem excretio san-
guinis siue per Diapedesim
siue

142 *Artis Medica lib. 7.*

siue per Anastomosim, siue
per erosionem sequitur calo-
rem rarefacientem, aperien-
tem, aut corrodentem.

Omnino autem irritatē, &
magis humiditatem relaxan-
tem. Sine cruenta autem ex-
cretionē ob Attractricem im-
becillem ex frigiditate, deie-
ctiones chylosæ proueniunt
coctæ iam in Ventriculo, &
Intestinis. Colliquationes au-
tem ex calida intemperie pri-
mo humorum, deinde Hepa-
tis substantiæ. Vnde per Al-
uum bilis crassa, graueolens,
abunde colorata, vt in pesti-
lentibus contingit. Humida
autem intemperies Retentri-
cem imbecillem facit, & pu-
tredinem. Sicca auctam At-
tractricem, vnde Alius sicca:
& prauus habitus totius.

Signa Caliditatis. Color
ad flauum vergens. Auic. An-
& rubedo in facie Erysipela-
tosa? Deiectiones frequen-
tiores

3. Catat. 6

De Morb. Ventr. 143

iores foetida, Colliquata.
Frigiditatis, Color albus, De-
iectiones biliosa, vomitus bi-
lis, Deiectionis appetentia, sitis,
non assidua, neque multae: sed
diuturnae, minus foetentes pi-
uitam aut Melancholiam refe-
runt, veluti limus. fames.

Humiditatis, excrementa hu-
midiora, oculi tumidi.

Siccitatis, excrementa sic-
ciora, Macies, Prognostica.

Difficilis curatu, quia in-
temperies confirmata. Dete-
rior, in qua sanguis transmu-
tatur in peregrinam qualita-
tem: Mitior, in qua diminu-
ta fit coctio.

Curatio per alterantia ad
quancunque intemperiem. 8. Cap. 7.

Ad calidam ex Asclepiade:
Succi Cicorij, aut Endiviae,
aut Picridis, idest Chondril-
lae vnciae duae cum aqua cali-
da, Melle, Mulsae, Vino; si non
adfit febris: Oxymelite. Se-
necionis decoctum, Trifolij
aceto-

acetosi ex Archigene. Chamæpitys cū Cichorij radice, refrigerant cum abstersione, attenuatione, & astrictione.

Extrinfecus Vnguentum Rosatum, Sandalinum Epithemate. Si cum humore, Purgatio ex Tamarindis, Diaprunis. Sy. Rosato solutiuo, Rhabbaro. Ad calidam & humidam Pentaphyllon tum folia tum radices, Agrimonia, Lichen in petris nascens, idest Hepatica: pulueris drachma una ex aceto mulso: in victu Ptisana, non Halica, non oua. Trall. Pisces saxatiles. Auic. Ad frigidam intemperiem ex Andromacho: plures compositiones ex Aromatibus: Cyphoides constat ex moderate astringentibus & resiccantibus & discutientibus vitiosos humores, serosos: aduersus putredinem, & malitiam humorum, Casia, Nardus, Iuncus odoratus, Calamus, Myr-

Myrrha, Aspalathus, Crocus,
astringentis, quid possident.
Concoquunt vna passa ob fa-
miliaritatem, & vim conco-
ctricem: Vinum, Mel ad ab-
stergendum: Bdellium & Te-
rebinthina ad emolliendum.
Quidam addunt Opium, Hyo-
scyamus ad sedandam irrita-
tionem fluxus. Sic Philonium
vnica vice sedauit Hepaticam
passionem. Hepar Lupinum
siccum drachma vna cum Pi-
pere & Myrrha in Passo, pro-
prietatem habet à tota sub-
stantia in omni intemperie
tum calida, tum frigida: aut
solum Hepar cum aqua, aut
vino. Pharmacum ex Co-
chleis, Asclepiadis. Recipit
trium Cochlearum carnem
valde tritam, dissolue in vini
nigri cyathis tribus, & calefa-
ctum bibat: Si febricitent, ex
aqua Cicorei. Oleum ex Ele-
ctro guttæ duæ cum succo Ci-
corei. Extra Oleum Nardi-
g num:

146 *Artis Medice lib. 9.*
num: Balsamum.

Sed calorifica, vt iuuant
ad frigidam intemperiem He-
patis, sic nocent effusioni
sanguinis. Vrgente igitur hoc
Symptomate, comprimendus
est prius sanguis, seu excerna-
tur per vomitum, seu per se-
dem.

Reuulsio secta vena inter-
na in brachio, si vires valent:
Cucurbitulæ medio Ventri.
Dentur in potu Trocisci de
Charabe, de Spodio, de terra
figillata: Hæmatites cum a-
qua Plantaginis, Palygoni,
vel succo, Acacia, Hypoci-
stis.

8. Cat. 5 Exterius Cataplasma: Re-
cipe Oenanthe, idest Labru-
scæ floris, vnciam vnam, Cro-
ci drachmas duas, Rosarum,
Meliloti, Mastiches, Succini.
sing. Drachmas quatuor. Da-
ctylorum vncias tres. Arida
cribrata excipiantur Vino
Myrthino. Postea adde car-
nem

De Morb. Ventr. 147

nem Dactylorū, vltimo cera-
tum Rosaceum quantum suf-
ficit. Alterum. Recipe semi-
na Hyoscyami, Apij, vtriuf-
que vnciam semis, Rosarum,
Anisorum, Hypocistidis, Myr-
rhæ. sing. drach. duas, Cro-
ci, Opij, vtriufque drach. v-
nam, fiant pastilli ex vino
Myrthino, qui triti ex melle
imponantur. Succus Bursæ
pastoris cum aceto imposi-
tus, vel per se haustus. Vi-
ctus refrigerans, vt in sputo
sanguinis. Sedato sanguino-
lento fluxu, remedia ad Hepa-
tis imbecillitatem.

De Morbo Regio.

Cap. 22.

MOrbus regius, Arqua-
tus, Icterus, Icteron,
Icteritia, Cels. Aurigo ab Au-
Origobolo appellato, vulgo
sperso il fiele Hipp. inquit, fit,
cum bilis commota sub cutē

g

2

con-

*li. Def.**4. Aph. 62*

conuertitur Commouetur autem aut inuolenta exercitatione, aut sponte in Crisi, aut impedita expurgatione. Est bilis refusio in cutem, unde superficies tingitur luteaque fit. Symptoma in qualitate mutata: cuius causa Expulsio in Crisi, aut a causa procatarica in cursu Commotio Symptomatica est, quia non per loca conferētia impedito trāfitu ad Duodenum, unde regurgitat in venas. Impeditur autem transitus naturalis in Tumoribus Hepatis præcipue in inflammationibus ob cōpressionem: in obstructionibus aut meatus ferentis ad Duodenum, aut aliorum, qui sanguinem expurgant in vesicam felle, utroque enim modo bilis in venā Cauam transfluit. Aliquando imbecillitas vesicæ felle causa est, ut neque expellat interius cum nimium repleta est, neque attrahat
ab

De Morb. Ventr. 149

ab Hepate, unde bilis non se
paratur à sanguine, Contin-
git autem id ob copiam bilis,
cum sanguinis fit cōuersio in
bilem, in febribus ardentibus
& venenis quibusdam. Lædit
autem nutritionem ob prau-
tatem: unde sequitur imbecil-
litas, aliquando febris super-
uenit. Celsus inquit ex Diocle:
Si post febrem oritur, prodes-
se, si post hunc febris, occide-
re. Signa. Incipit color sublu-
teus in albo oculorum: sitis,
dolor capitis, frequens sin-
gultus, difficultas respirandi
in cursu, & ascensione, quæ
compressionem septi transuer-
si: & membrorum resolutio.
In progressu totum corpus cū
pallore quodam inalbescit.
Cels. Ex causa procatartica,
habetur ex relatu. Ex Crisi, si
in febre. Ex Tumore Hepatis,
tensio, duries, & grauitas
in dextro Hypochondrio. Ex
obstructione Vesicæ fellis: Ex

5. lo. aff.
ult.

g 3 cre-

crementa Alui alba sunt, vt
Canum stercora: quia non
fertur bilis tingens.

Contra autem vrina red-
ditur lutea, & crassa, vt ali-
quando tingat colore Cro-
ceo, quod signum bilem trās-
fusam esse in venam cauam.

Ex imbecillitate attractricis:
aut conuersione sanguinis in
bilem, vt nequeat ob copiam
vniuersa transire ad Intesti-
na: omnia apparent lutea,

tam excrementa, quam vri-
na, & totum corpus. Hipp.

inquit: Quā dā lutea est, quā-
dam ex luteo & nigro, venis
quibusdam pallidis, quibus-
dam nigris, ex quibus incisus

sanguis exit vel pallidus, vel
niger. Quādam etiam tradit
albam ex Pituita, videtur Leu-
cem significare. Et libro. 2.

de Morbis Ictericum quendam
esse nigrum, cuius color ni-
ger circa faciem, & maxime
circa partes occultatas: Ocu-
li

Int. aff.

li

De Morb. Ventr. 151

si autem cum virore pallidi,
itemque lingua inferne, & ve-
næ sub lingua crassæ & nigræ,
sine febre, urinam mingit cras-
sam, biliosam. Alterum sub-
iungit luteum. Alius est mor-
bus niger, de quo agit in fine,
incipit cum vomitu nigro, si-
gnificat Hypochondriacam
passionem. Et 3. de Morbis
describit quendam acutum,
qui cito occidit. Color totius
ut Malicorium videatur, &
cum virore pallidus, ut lacer-
ti. In vrina subsidet veluti
Eruum fuluum, febris & hor-
ror debilis, halet, vestimenta
ferre nequit, nam mordetur,
& roditur.

Mane ante cibum viscera
plerunque lancinantur, non
patitur alloqui. In 14. diebus
plerunque moritur; si effuge-
rit, sanus euadit. De Icteria *s. lo. af. 7.*
nigra meminit Gal. Fieri ex
imbecillitate lienis non ex-
purgantis atram bilem à san-
guine.

guine. Porro eadem causæ,
quæ impediunt expurgatio-
nem fellis in Duodenum, pro-
hibent ne per venam tenden-
tem ad Lienem fiat separatio
Atræ bilis; immo simul vtrun-
que meatum impediri osten-
dunt excrementa alba. vt enim
bilis colore croceo tingit, sic
atra colore nigro, & vrinam
crassities cum colore ad ni-
grum tendentem simul cum
pallore, idem ostendunt.

3. Aph. vl. Auic. inquit aliquando cum
dolore colico esse. At Hipp.
inquit: IctERICI nō admodum
flatuosi sunt ob naturam bi-
lis, vt Gal. Prognostica. In
4. Aph. 12
64. febribus si ante septimam ad-
ueniant, malum; Si 7. vel 9. vel
11. vel 14. bonum, nisi dextra
Hypochondria obduruerint.
Curatio ad Ictericitiam ex Cri-
si relictam, aut ex causa pro-
catartica non existente vitio
in viscere.

Sola digestio bilis sub cu-
te.

De Morb. Ventr. 153

te. Balnea aquarum dulciū, 9. *Cap. 1.*

& Olea discussoria affricata,

Chamæmelinum, Anethinum

Vnguentum Gleucinum, Cro-

cinum, Irinum, Amaracinū.

Alia remedia conueniunt ad

Ictericos ex vitio Hepatis,

quæ dicta sunt ad obstructio-

nes, Tumores, & imbecillita-

tes. Gal. Quibus citra febrem *s. lo. af. 7*

morbus regius accidit cum *in fi.*

grauitatis sensu in dextro Hy-

pochondrio: ijs omnibus ape-

ries obstructionem, & cibis,

& potibus, & medicamentis

extenuantibus; deinde medi-

camentum bilem educense ex-

hibitum vna die sanauit. Qui

liberari non potuerunt, ijs

rursus validiore ad aperien-

dum data potione, medica-

mentum, quod vehementius

purgaret, exhibitum, sub fine

purgationis visa est carulea

potius quam flauabilis cum

acri mordacitate excreta:

Quod signum ob diuturnita-

tem

tem retentionis bilem huiusmodi genitam fuisse. Hipp.
2o. in bo. inquit: Cum susceperis curandum, nutrito & humectato balneis & pinguefacientibus, & cibis, & potibus per tres, aut quatuor dies. Postquam humectatum fuerit corpus, purgato, & resiccato, & repente pinguedinem exhausto unde quaque medicamentis digerentibus. Ad caput purgatorio debili utitor, & urinam cientia ante cibos propina: postea abstineat à potu. Cum attenuatum fuerit, etiam balneis purgato, lauato ex aqua, in qua radix Cucumeris. Syl. Contusa sit. Eo tempore abstineat à medicamentis bilem ducentibus, & ijs, quæ urinam cient. Sed nutrito, & Vinum vinosum bibat, ut rubicundior fiat. Quod si viridis, ac lutens sit, rursus exhausto, nequaquam vero resiccato, ne is color stabilis

De Morb. Ventr. 159

bilis reddatur. Gal. Si bilis
sub cute crassior est reddita, *5. lo. af. 7.*
quod cognoscitur strigili in
sudoribus tenuibus crassitiē
non excipiente: vtendum vi-
ctu humectante, & balneo na-
tura calido. Quando à reple-
tione & ebrietate fit, Hipp.
Venam secatur in Cubito, si fe-
bricitent, sorbitiones dat ex *Inq. Aff.*
Ptisana, & Mulsam. Cum Ve-
næ sub lingua crassæ fuerint,
secandæ sunt. At Gal. in mor- *2. Morb.*
bo regio sanguinem mittere
est in extremam perniciem,
ducere. An ad bilem euacuan- *de pur. af.*
dam non confert Venæ sectio, 2.
nam sanguis bilem contem-
perat? Sed aliquando confert
ad plenitudinem, vel crassi-
tiem. Celsus ex Asclepiade,
non per vrinam, sed per Aluū
ducendos esse humores, ali-
quando ex aqua falsa. Hodie
ex Aqua Tettucci. Victus va-
rius nunc extenuans, ad ob-
structiones, nunc validiori-

§ 6 bus

156 *Artis Medicae lib. 7.*

bus cibis ad reficiendum. Per
omne tempus exercitatio, fri-
ctio, Balneum. In conclau-
viti ludis, lasciuia, per quæ ex-
hilaretur: vnde putat dictum
morbum Regium.

De Hydrope.
Cap. 23.

HYdrops, Hydropifis,
Aqua intercutem, In-
tercus. Cels. Vult Gal. Esse He-
patis refrigerati affectionem,
cum non potest in sanguinem
cibum conuertere, sed in hu-
morem aquosum. Oriri & ex
alijs partibus affectis, Pulmo-
ne, Liene, leiuno, Colo, Mese-
terio, Renibus, Vtero, nullo
tumore existente in Hepate,
sed tantum refrigerato per
consensum: vt in fluxu immo-
dico sanguinis per Hæmor-
rhoidas, aut Menses: aut prop-
ter retentionem. Aut ex potu
aquæ frigida. Tres Hydropis
species

De Morb. Ventr. 157

Species esse: Vnam quæ ex Pituita in omnes venas Anasarca, & Leucophlegmatia vocatur.

Alterā ex Aqua inter Peritonæum, & Intestina, quæ Ascites dicitur. Tertiam ex flatu, quæ Tympanites, ex minori frigiditate, quia flatus generatio aliquam caliditatem requirit. Hipp. Aliter statuit. Nam Leucophlegmatia, idest Pituita alba non inter Hydropis species ponitur, sed quæ facile in Hydropem transit, nisi curetur, nec est lethalis. Corporis color albidior est, & intumescit albo colore alius in alia parte, magis & minus, cum pituita ad carnes conuersa fuerit ex febribus diuturnis non purgata, sanguis enim aquosior fit, à copia pituitæ. Si curatus fuerit inchoante morbo, sanus fit: Sin minus in Hydropem transit: & hominem corrumpit.

de Aff.

Int. Aff.

de Aff. 111 rumpit. Hydropis autem,
 duas species tradit: quarum Hy-
 posarcidiosis inuitabilis est,
 idest incurabilis: Significat
 Ascitem, non Leucophlegma-
 tiam, ut putauit. Gal. Miratus
 dereliquisse Ascitem. Alter
 flatuosus egens multa & bo-
 na fortuna, ut curetur: quæ
 Tympanites dicitur, alibi Hy-
 drope sicca. Circa causas
 præterea magna est differen-
 tia. Non enim à frigiditate
 aquam fieri putat Hippocra-
 tes, sed à calore colliquante.
 Inquit enim. Fit plerumque
 cum quis ex longo morbo im-
 purgatus multo tempore per-
 manet. Corruptuntur enim
 carnes & liquantur, & fit a-
 qua. Fit etiam à Splene, cum
 ægrotauerit, & ab Hepate &
 à Pituita alba, & Dysenteria,
 & Lienteria. A pituita alba
 maxime in Hydropē fit tran-
 situs: nam pinguedo collique-
 scit, & à calore, qui in Pitui-
 ta

de Aff.

181. ff.

ta est, fit aqua. Item bibenti- *de Ac. ag.*
bus aquas palustres, Splenes
magni fiunt, & facies attenua-
ta, quia carnes in Splenem
colliquantur, & Hydropes le-
thalissimi, idest Ascites. Ven-
tres eorum calidissimi, tum
infernus, tum supernus, siticulo-
si: colliquationes.

De ortu autem Tympanitis
inquit: Pituita in Hepate ca- *Int. aff.*
lesata flatum inducit, & in
progressu aqua impletur am-
pliori caliditate colliquante.

Alio modo in doloribus Lum- *4. Aph. 11*
borum.

Dolores diuturni Lumbo-
rum & circa Umbilicum in
Hydropem siccam terminan-
tur: quia ad locum dolentem
spiritus feruntur, relaxatis
autem ex diuturnitate arte-
rijs, effunduntur in cavitatē,
& replent, quod aliquando
repente fit in venenis quibus-
dam, & paulo ante obitum.

Alexander Trall. Hydropem
cum

cum febre, & qui succedit ad morbos acutos concedit non sine inflammatione esse & ex colliquatione nasci auctorem citat Galenum, sed Hippocrates est. Mirum inquit, aquam non extinguere febrē, neque febrem aquam absumere. Quamuis autem in febre à colliquatione fiat, frigidus tamen affectus dici potest, quia materia frigida est cum vestigio tamen caliditatis: frigiditatem quoque Hepatis adesse, quia calor innatus diminutus est non tamen ab intemperie frigida, sed à caliditate præter naturam.

Causæ & signa Hydropis.

Cap. 24.

De Aff.

CAUSA Leucophlegmatix, Materia Pituita ad carnes conuersa; Efficiens febres diurnæ: in pituitosis non purgatis redditur sanguis aquo.

quosior. Cum incipit Cachexia vocatur. Paul. & Aet. idest prauus habitus. Hipp. Pituitam vulgarem appellat, cum recentissima est. *Int. aff.*

Pituitam albam, cum antiquior. Nos vulgo *Bolſo*. Oritur & in Tabe, quia sanguis non tendit in nutrimentum, sed in excrementum aquosum. In largo sanguinis fluxu sanguis aquosior redditur ob defectum calidi innati. Ideo affectus frigidi & humidi omnium venarum & Hepatis.

Causæ externæ, victus ratio pituitosa, somnus, Balnea, pigritia. Ascitis causæ: materia, Aqua intra peritonæum transcolans ex Hepate, frequentius ex Liene, nam Lien fons aquæ est: Ex Renibus, Mesenterio, Abscessu aquoso Hipp. Non per venas, vt in *4. Mor.* passione Hepatica: esset enim *Int. aff.* aqua sanguinolenta, non subflaua, qualis est Hydropicorum

2. Mer.

rum aqua. Aliquando ex

Id. in bo.

Pulmone, in Hydrope Pulmo-

nis: Aliquando ex Capite in

Hydrocephalo. Hippocrates

inquit: Ex capite per dorsum

defluit in Ventrem, & Hydro-

pem facit. Efficiens potus mu-

tus, aut aqua frigida, unde

refrigeratio fiat sanguinis &

Hepatis, vt Gal. vult: aut

1. Id. af. 7.

aqua palustris, quæ viscera

indurat, & obstructions pa-

rit: unde caliditas colliquans.

Febres colliquantes. At cali-

Id. Id. 29.

ditas debuisset potius bilem

gignere, quam aquam. An-

quæ vehementius calefaciunt,

Ichorem, seu saniem sepa-

rant: vt verè diuretica sua

caliditate ex sanguine urinam

exprimunt, & pustulæ aquosæ

ex combustionē excitantur.

Int. aff.

Causa Tympanitis, mate-

ria, flatus intra peritonæum:

aut ex Pituita genitus modi-

ce calefacta: aut ex arterijs

transusus, Efficiens, Dolores

In-

De Morb. Ventr. 163

Intestinorum, Venena. Signa
Leucophlegmatix: Color al-
bidior corporis: videtur mor-
tuo simile. Paul. Aet. Intume- 2. Mor.
fcit totum corpus albo tumo-
re, ex cuius compressione re-
linquitur fouea: Venter cras-
sus, pedes, & femora tument,
Tibiae, & Scrotum. Acerua-
tim respirat, facies rubicun-
da, os siccum, post cibum spi-
ritus frequens, sitis: forte ob
tumorem Hepatis. Eadem
die modo melius, modo peius
habet. Pituita vulgaris, quæ 1st. aff.
recentissima est: Pituita alba
antiquior grauat hominem,
magis, & speciem habet pal-
lidiores, totum corpus laxo
tumore intumescit, & facies
ruber. Paul. & Aet. Cachexia
dicitur, cum corpus in aquo-
sitate conuertitur, reddi-
tur laxum & emollescit, ex
quibus significatur Pituita
vulgaris. Alteram vero, idest
Leucophlegmatiam vocant
Hypo-

Hyposarca & Sarcitem.

Int. aff. Ascitis signa: Cum quat-
tur, fluctuat vt in vtre aqua
intra Peritonæū. Trall. Hipp
Inquit. Cum tota pinguedo
in pectine absumpta est, pro-
minet vmbilicus, implet ali-
quando Scrotum, femora &
pedes, Cutis pellucida, gra-
cilescunt partes superiores.
Si ex Thorace, tussis sicca,
fauces exasperari videntur,
rigor & febris, Orthopnea.
Corpus intumescit & pedes.
Vngues contrahuntur, quam-
diu aqua in Ventre superiori
est, dolor acutus cum descen-
derit ad inferiorem, melius
habere videtur.

lo. in ho.

Quandoque ad latus intu-
mescit, & indicat locum se-
ctionis. Ex Capite. Fluxione
tendente ad vertebrae & in
carnes, Hydrops fit. Siccae an-
teriores partes, Caput, Na-
res, Oculi, Oculorum habe-
tudo, color pallidus cum
reli-

De Morb. Ventr. 165

aliquo corpore : nihil ex-
uit, quia fluxus auertitur ad
posteriora, vnde meatus ad
Ventrem fiunt laxiores astri-
tis anterioribus. Ex Hepate
aut Liene, tumor earum par-
ium, & dolor: Alius sicca.
Ex Mesenterio, fluxus, Intesti-
norum Rosio. Trall. Quibus
ex parte inani, & lumbis prin-
cipia Hydropis fiunt, ijs pe-
des intumescunt, & Alui fluor
liutinus fit: qui neque exol-
uit dolorem, neque mollit
Ventrem. Quibus à Iecore,
qua intercutem incœpit, tus-
sire quidem cupiditas est, sed
nihil excreant commentatio-
ne dignum, pedesque intume-
scunt, ac Venter non deijcit,
nisi dura, ac pro necessitate:
etque etiam circa Ventrem,
pedemata fiunt, partim in
dextra, partim in sinistra con-
sistentia desinentiaque. Tym-
panitis signa. Tensio resonās,
flatu replente totum Ventrē,
descen-

2. Pro. 2. 3

descendit aliquando ad femora, & pedes. Aet. si prematur, resilit, non relinquit foueam: In processu succedit aqua: Si ex conuersione pituitæ in flatum, paulatim: Si ex arterijs spiritum transmittentibus, cito: aliquando repente in venenis.

9. *Prog. 1.*

Prognostica. Hydrops id est Ascites, si ex morbo acuto mala est, quia non sedat febre, sed dolorem admodum infert ac mortem, fereq. incipit ex parte inani ac Lumbis, & Iecore. Si ex Pulmone, periculum imminet suffocationis. Qui ex praua victus ratione, facilius curantur, nisi scirrus ortus fuerit. Nam expresso tenui humore, viscera coagulantur in scirrum. Periculosior ex Hepate, quam Liene. Ascites confirmatus incurabilis est, id est ob scirrum Hepatis. Anasarca facilius curatur, ante quam transeat in

De Morb. Ventr. 167

Ascitem, magis contingit
pueris. Act. ob voracitatē.
Tympanites medio modo se
habet. Auic. Aetius Tympani-
tem deterrimum esse, idest
si ex dolore, aut venenis.
Ascitem facillimum, qui a pū-
sione aqua extrahi potest. At
Hipp. Ascitem, quem Hypo-
tymidion vocat, incurabilem
esse, qui scilicet ex vitio visce-
rum. Tympanitem egere mul-
tis & bona fortuna. Omnes hi
morbi nisi cito curentur, lon-
gi sunt, & enecant.

Curatio Hydropi.

Cap. 25.

[N] curatione cuiusque spe-
ciei Hydropis duo indicā-
tur: Euacuatio materiae tumo-
rem facientis: & vitia partiū
generantium corrigere. Gal. 1. Gl. 7.
tres intentiones ponit. Eua-
cuare, Emollire, & urinam
mouere, quod spectat ad eua-
cu-

cuationem. Ad Leucophleg-
matiam, si ex plenitudine
fiat, vt ex retentione men-
struorum: aut Hæmorrhoida-
rum, venæ sectio Gal. licet

4. Ac. 11

morbis frigidus sit, ob copiā.
Paul. & Aet. Iteranda in tri-
bus diebus, præcipue in Ca-
chexia. Hipp. Ex dorso per

Int. aff.

Cucurbitulas: & Venæ sectio
in Scroto. Purgatio Pituitæ in
Pituita recenti solo vomitu
post cibum, per duos dies,
aut tres. Præparatio ad vom-
tum lauare, edere cibos ex
Oleo, & Melle, olera acria, pin-
guia, & dulcia, & acida per-
mixta: sæpe bibat inter eden-
dum: in fine placentam insu-
per edat, & Mel, & Ficus. Post
quam cœnauerit, pocula lar-
ge exhauriat, & vbi large re-
pletus fuerit, parum dormiat.

Experrectus vomat, magno
Vini poculo epoto cum tepi-
da aqua temperato, donec Fi-
cus euomuerit, qui vltimi pro-
deunt.

De Morb. Ventr. 169

deunt. Hoc remedium magis
trahit pituitam, & humores
ex carnibus, & corpus magis
reficcat auferendo alimentū:
Si pituita in Ventre fuerit,
Clysteri euacuetur. Ad Pitui-
tam inueteratam si sua spon-
te Venter turbatus fuerit, sa-
natur cito. Sin, purgare oportet
ex Cneoro, Hippophesto,
Grano gnidio, lapide Magne-
te: Postea cibus siccantibus
vtatur, Vino nigro austero,
allijs coctis: Deambulationes
multæ, augendo pro au-
ctione cibi. Satureiam, & Ori-
ganum multum edat, & inde
Vinum vinolum ante deam-
bulationes. Nos vtimur Ca-
lybe scobe, aut Scoria fer-
ri præparata in vino: vt postea
deambulet. Paul. purgat ex El-
leboro, Trall. ex Hiera sæ-
pius. Succus corticis secun-
di Sambuci expressus, Lathy-
ris, Squama æris. Recipe fo-
liorum Chamaleæ drach. v.
h nam

2. Morb.

nam, Squamæ æris, Anisi, v-
triusque drach. quinque. Do-
sis drach. vnâ vsque ad duas
cum aqua. Interim aperien-
tia singulis diebus.

Confectio ex Amygdalis
amaris. Recipe, Anisi, semi-
nis Apij, Amygd. amar. Ab-
sinthij, Gummi, singulorum
drach. quatuor: pastilli fiant
ex aqua. Digerentia per fri-
ctiones, Balnea sulphurea,
aluminosa, nitrosa, & vario
exercitationis genere, in sole
velato capite. Punctiones plu-
res supra talos, ad femora
Scrotum: supra Carpum, vt
diutius emanent. Aet. Defen-
denda crura, ne recipiant, fa-
scia expressiua ab imo sur-
sum ducta.

Aff.

Curatio Ascitis Hipp. A
principio antequam super ex-
crescat, Pharmaca bibenda
dato, à quibus aqua & Pitui-
ta purgetur: Bilem ne moue-
to. An significat ex Leuco-
phle-

De Morb. Ventr. 171

phlegmatia fieri, ideo Hypo-
farcidios cognominatur ab
eodē? Bilem ne moueto, quia
non peccat. Humiditas enim
non siccitas lædit. Cibos &
potus assumat, & labores, &
deambulationes, à quibus
gracilis & ficcus euadat, &
carnes quam robustissimæ
fiant. Celsus cibos glutinosos
conuenire, ne sanguis in a-
quam transeat. Si non succe-
dat, sectione facta emittito,
vel iuxta Umbilicum, vel re-
tro iuxta Lumbos, sed pauci
effugiunt. An quia non suffi-
cit aquæ extractio, nisi gene-
rationis causa tollatur, quæ
in Scirro fieri nequit? Item
inquit Hipp. Siccandus Ven-
ter victu, & deambulationi-
bus. Panis furfuracius, caro *Int. aff.*
Leporina assa, galli, Ouicu-
læ, & Suis, omnes assæ. Poly-
pi in Vino nigro & austero co-
cti. Vinum modicum bibat ni-
grum austerum quam crassif-

h 2 si-

172 *Artis Medicæ lib. 7.*

simum & acerbissimum: iuscula ne attingat. Pisces sine sale elixos, sed refrigeratos. An sal inimicum, quia facile humescit? Ex oleribus Raphanum, Apium, Lenticulam torrefactam ex aceto. Deambulet quotidie mane, & post cœnam. Vesperi dormiat, mane exurgat. Si hæc non sufficiant, purgandus ex Cneoro, Hippophesto, Grano gnidio bis in die, donec vacuus sit. Si tumor in Scroto, femoribus, & tibijs, acuto scalpello multa, & frequentia vlcuscula incutito. Si in Thorace, tertiam costam ab inferiori perforato, ut inde paulatim aqua educatur. Interim exhibenda siccantia ex Aristolochia, Laserpitio, Eruo, & Lente formatis pastillis. Si ab Hepate tumefacto, in principio Origanum & Laserpitium cum Vino, & Lac Caprinum cum Malsa coctum: Abstineat per pri-

De Morb. Ventr. 173

primos dies à cibis, forbitio-
nibus vtatur Ptisanæ, & Vino
albo. Post decem dies tran-
seat ad victum siccantem. Si
morbus non quiescit, inurito
crustis octo fungis, cum val-
de intumuerit. Idem ad Lie-
nem tumefactum, capita eius
intercipiendo fungis, aut fer-
ramento cum multa cautio-
ne transuras. Hæc à princi-
pio fiant post euacuationes,
& vsum Lactis Asinini cum
Mulsa. Si vero æger extenua-
tus fuerit, præhumectare
oportet per fomenta, nam
præparant ad purgationes.
Eadem fere tradit Hipp. alibi. *Lo. in ho.*
In potu medicamenta aquam
ducentia, & edulia quam pi-
tuitosissima: Si non leuetur,
inurenda superficies lenissi-
me, quo aquam continere pos-
sis, circa Umbilicum, & intra
Umbilicum, & singulis die-
bus emittere. Cum enim mor-
bus sit periculosissimus, in-

h 3 his

his periclitari oportet, si enim
 successerit, sanum facies, alio-
 qui omnino perituum. Cete-
 rum in puero, partes tumida
 aqua plenæ scalpello aperien-
 dæ, & frequenter & parū edu-
 cendum est, & locum apertū
 cum eduxeris, calfactorio me-

Lo. in ho. dicamento illines. Si ex capi-
 te oriatur, intercipiendus est
 fluxus vltione in collo, vt ci-
 catrice inducta, astringatur
 locus: ad partes autem ante-
 riores auertēda est fluxio. Ad
 colliquationem autem, quæ
4. Acn. Hydropem facit, Hipp. re-
112. 113. media affert, in hunc modū.
 Qui Ventrem inferiorem ca-
 lidum habent, subeūtq. acres
 deiectiones, & inæquales, hi
 à colliquatione id patiuntur.
 Qui si valentes fuerint, reuel-
 les Elleboro albo: si non: Cre-
 morem tritici frumentei cras-
 sum frigidumq. dabis, & quod
 ex Lente conficitur: panemq.
 subcineritium: & pisces fe-
 brien-

febrientibus quidem elixos, nō
febrientibus autem assos. Vi-
num præterea haudquaquam
febrientibus nigrum dabis,
alijs verò aquam, aut à Me-
spilis, aut Myrthis, aut Malis,
aut Sorbis, aut palmulis, aut
vitium Oenanthe. Si vero fe-
bris non fuerit, vexentq. tor-
mina: primum quidem La-
ctis Asinini pauxillum, deinde
sensim paulatimq. plus bibat:
& Lini semen, & triticeam po-
lentam mixta Hordeacea,
& sparsa: Faba Aegyptia adē-
pto amaro, vel oua semico-
cta edat assa, & Similam, & Mi-
lium, & Chondrum ex Lacte
coctum: Cocta hæc, & refri-
gerata edat, atque his similia
tum pocula, tum edulia inge-
rat. Gal. colliquationem, 10. Me. II
curat in febribus colliquan-
tibus aquæ frigida potu, & ci-
bis actu frigidis. At in Hydro-
pe nō aqua, neque cibi tenues
& humectantes, sed crassi, &

h 4 siccan

ficcantes conueniunt: & qui
 multum nutriant, vt sufficere
 possint ad arduas inambula-
 4. *Acu. 11* tiones. Hodie alia genera me-
 dicamentorum habemus ad
 aquas ducendas: mitissimum
 quidem Brassicam syl. quæ
 vulgo Soldanella dicitur, da-
 tur succus, aut puluis: Me-
 cioacan ex Vino. Vehemen-
 tiora Elaterium, Euphorbiū:
 extant pillulæ vtriusque. Va-
 ria digerentia exterius appli-
 canda recensentur à Gal. Fo-
 5. *Cat. 5.* mentum ex furfure sicco: a-
 rena maris. Experientia com-
 probatum Thaliætri folia cū
 farina tritici, aut ouo fricta,
 mane assumpta, nam viscera
 emolliunt, & vrinam mouent.
 Celsus Hydropicorum Ven-
 trem mensurat cingulo, &
 potus quantitatem, vtrum-
 cum Vrina conueniat. Ad
 Tympanitem curandam vi-
 dentur ea referri, quæ Hipp.
 4. *Acu. 111* dicit. Curatur tolerantia, fo-
 tu

tu, & temperantia : Edat sic-
ca, & acria, ita enim maxime
tum minget, tum valebit. Sed
Galenus recte communem
esse omnium curationem: To-
lerantiã scilicet laborum, fo-
mentis digerentibus, & tem-
perantiã in victu præcipere,
potu modico: concedit autẽ
carnem Suillam in aceto co-
ctam, idest, quam vulgo *Ge-
latinam* vocamus, vt resiste-
re possit aduersus arduas de-
ambulationes. Conuenire
aliquando Venæ sectionem, si
difficulter spirauerit, annuen-
tibus viribus. Quod Gal. ne-
gat in Ascite & Tympanite.
An ad flatuosos affectus ma-
xime facit Venæ sectio, vt in
Palpitatione, & in Priapismo?
Nam ex Arterijs flatus com-
municantur. Post Venæ se-
ctionem exhibet panes cali-
dos ex Vino nigro Oleo tin-
ctos, ad vires reficiendas. Pau-
lus ad Tympanitem exhibet

5.10. af. a.

h 5 etiam

etiam medicamenta aquam
ducentia, quia flatus non si-
ne aqua: postea extenuantia,
& discutientia flatus tum in-
tus, tum extra. Recentiores
experimento inuenerunt ma-
xime conuenire Balneum de
aquis, in agro Pisano, naturæ
ferreæ, quod refrigerat, & a-
stringit. Ipse testari possum
sanasse mulierem in æstate,
lanacro frigido in flumine, &
victu refrigerante, qua ratio-
ne Galenus curauit inflatio-
nes linguæ, & pudendi. repellēti-
bus solis. Sic in Tympanite ar-
teriæ relaxatæ egēt astrictione
& refrigerantibus. Prohibēt quo-
que frigida generationē flatus
De Lienis affectibus. Cap. 26.

14. Met. 8.

8. Ana. ad
5. 10.

Lien in sinistra parte situs
est sub costis mendosis,
porrigitur deorsum. connexa
parte exterius spectante, con-
caua interius è regione Hepa-
tis, vnde Omentum exoritur.
Substantia limosa, & fungosa
ad

ad faciem sanguinis expurgā-
dam, quam trahit per ramum
Venæ portæ sub Ventriculo
transeuntem, & partim ad os
Ventriculi transmittit ad ap-
petentiam excitandā, partim
excernit ad Intestina crassā.
Facit etiam ad concoctionem
sanguinis, Arist. vt Hepar in-
dextris. Affectus iidem fer-
me, qui in Hepate: Obstru-
ctio, Inflammatio, Scirrus. Sed
magis intumescit, quam He-
par, ob substantiam fungo-
sam, quæ auide bibit humidi-
tatem corporis, vnde fons a-
quæ dicitur 4. de Morbis. Qui-
bus corpus floret, ijs Lien mi-
nuitur: Quibus magnus, & tu-
mens, ijs corpus minuitur, &
cacochymū redditur. Splene-
tici vocantur, & Lienosi, qui-
bus Lien intumuit & indu-
ruit; facile autem indurescit
ob succum melancholicum,
quo nutritur, & qui difficile
expurgatur obstructionem fa-
ciens.

6. lo. af. 1.

9. Cat. 2.

ciens. patitur etiam intemperies solas, à quibus omnibus læduntur facultates naturales. Imbecillis attractio causa est, ut tumor Melancholicus non separetur à sanguine ut decet. Cum igitur regurgitat in venam cauam, totum corpus nigro colore inficitur morbos melancholicos patitur. Si regurgitet ad Ventriculū vomitus nigros & vexationes Hypochondriacas inducit, & famem caninam. Si ad Intestina crassa, fluxus Hæmorrhoidarum, qui liberant à multis morbis, sed si retineantur, graues morbos inducunt: mærores, Hydropes, Tumores. Redditur autem Lien imbecillis ad attractionem ex intemperie frigida, aut ex obstructione, aut tumore. Intumescit autem, & obstruitur præcipue ab aquis palustribus & canosis. Hepar autem magis à frigidis & crudis. Signa

Ac. aq.

De Morb. Ventr. 181

gna inflammationis, dolor
acutus, & febris, Alius sup-
pressa, inappetentia: in pro-
gressu color pallidus, aut ni-
ger: Ulcera in Tibijs: Gingi-
uæ à dentibus abscedunt, ma-
leolent. Tumor nunc minui-
tur, nunc augetur, in pro-
gressu durus fit vt lapis: Mor- *de Aff.*
bus diuturnus, non lethalis. *Int. aff.*
Sine febre ex humoribus fri-
gidis: ex potu aquæ intempe-
stiuæ aut palustris. Item à fru-
ctibus multis comestis, Ficu-
bus, Vua, Musto. Intumescit
aliquādo in Crisi, exoneran-
te se natura. Impletur ali-
quando à bile, vnde vehemēs
caliditas sentitur. Aliquando *Int. aff.*
à sanguine in Vere, vnde do-
lores acuti in Splenem, & in
Mammam, & Clauiculam, &
humerū pertingūt, & sub sca-
pulam. Vēter durus, & Splen
veluti lapis fit. Hic morbus
magis lethalis est quam cete-
ri. A Liene autem maxime Hy *lo. in ho.*
drops

drops fit in hunc modum. Cū
 Splen in febre magnus factus
 fuerit: & Omētum simul cum
 corpore fuerit attenuatum,
 pinguitudo Omenti collique-
 scit: vbi vero vasa pinguitu-
 dine vacua facta fuerint, & à
 Splene florente ac augescen-
 te in Omentum defluerit,
 vtpote vicinum maxime exi-
 stens, & vt vasa habens, eaq.
 vacua, excipit, & vbi morbus
 semel in corpore factus fue-
 rit, ad id quod est morbosum
 vertitur, nisi quis probè di-
 sponat, ac curet. Sed videbi-
 tur alicui mirum pinguedi-
 nem colliquatam in Aquam
 conuerti, non in substantiam
 oleosam. Hydropis enim hu-
 mor aqueus est non vinctuo-
 sus. Dicendum est omnem
 pinguedinem humiditatem
 continere aeream, quæ facile
 in ignem transire potest, sed
 antequam in ignem transeat,
 si refrigeretur in aquam con-
 uer-

ueri, vt sales, & quæcumque
vehementer passa sunt à cali-
do & sicco. Simili modo pin-
guedines per colliuationē
extenuatæ in substantiam va-
porosam, si non comburan-
tur, adepto refrigerationis
principio, in aquam transeunt.
Principiū refrigerationis ac-
cipiunt ex cibis & potibus,
præcipue ex aquæ frigida po-
tu: & vbi incoeperit conuerti,
non cessat, donec tota pingue-
do in aquam cōuertatur: pau-
latim colliquata, extenuata
& in aquam conuersa. Hinc
etiam patet aliquando Tym-
panitem fieri, & post Tympa-
nitem aqua impleri, vt Hip- *Int. aff.*
pocrates tradit. Materia
enim pinguedinis, scilicet san-
guinis halituosa substantia in
vasis continetur, præcipue in
Arterijs, est enim alimentum
optime coctum, extra vasa
autem coagulatur iuxta mē-
branas à frigore. Effluit igi-
tur

tur aliquādo ex Arterijs substantia hæc spiritiosa, quæ Flatu implet: antequam in aquam conuertatur. Omentum autē ex multis Arterijs constat, ideo inflatio & Hydrops. In Omento maxime incipit: cui Liē coniunctus est.

Curatio Lienis tumidi. C. 27.

CVM tumor à sanguine fit, seu à ceteris humoribus sanguini admixtis, Venæ sectio conuenit ex interna brachij sinistri quæ Vena Splenitis appellatur: quia morbus oritur à sinistra Vena, id est, quæ Vena portæ appellatur: non enim aliunde Lien venas recipit. At si Brachij Venæ ex Vena caua producantur, quæ communio est cum Vena portæ? An ratione Arteriarum per Anastomosim fit communio? Paul. ex manu sinistra magis reuellit, & minus debilitat. Biliosis conducit, vt per victum humectan-
tem

*Int. Aff.**Aff.*

De Morb. Ventr. 185

tem Aluum & Vesicam subdu-
camus, & de vena Splenitide *Aff.*
frequenter sanguinem mit-
tant: & medicamētis vrinam
cientibus vtantur, quæ Sple-
nem mollire scripta sunt, &
pro anni tempore bilem pur-
gent. Pituitosis, si impurga-
ti sint, Caput, & reliquum
corpus purgare. Si purgatio-
ne non egent, Victus ratio
constituenda, vt corpus ex-
siccemus & attenuemus: Ci-
bis, & potibus, & vomitibus,
& exercitijs plurimis, & deā-
bulationibus. Et in vere sur-
sum per Elleborum purgen-
tur. Tandem, si cetera non
profint, inurendus est: Cum
ex inflammatione suppuratus
fuerit, inustio sanat. Inuren-
dus & cum valde intumuit,
quod ex usu Lactis fit, opor-
tet enim ante inustionē prius
Lacte crassescere. Aliquādo
in principio vrere oportet, cū
timetur, ne materia regurgi-
tet

Int. aff.

tet in Pulmonem, quod contingere solet, cum statim in principio morbi dolor acutus irruit, nempe ex Vena portæ. Si quidem medicus non intellexerit, priusquam incubuerit, resilit in Pulmonem. Huic per fungos, crustas octo inurito, capita Lienis quam celerrime intercipiēs. Et ubicunque alius dolor incubuerit, vrito: sic enim statim sanus erit. Si vero non fuerit vltus, sanus autem sponte fiat, plerumque post duodecim annos morbus rursus reuertitur, & si Splenem occupauerit, multis aquam intercutem inducit.

Int. aff.

Victus Hipp. Si febris non adest, Panis furfuraceus, Caro Canina, Caprina, Ouina. Salsamentum Gaditanum, idest quas vulgo Haringas vocamus, aut Saperdam, & acida & salsa omnia assumat, & acerba: Bibat vinum Coum sub-

De Morb. Ventr. 187

subastringens, quam nigrimum: Abstineat à dulcibus, pinguibus, & nidorosis. Non caro Porcina, nec Mugil, nec Anguilla: Nullum olus nisi aceto coctum. An abstinendum à Vinis tenacibus, & cibis, à quibus intumescit Liē? Si adeo validus fuerit, per 30. dies ad ligna secanda cogatur. Luctetur summis humeris, interdiu deambulet, Vespere dormiat, mane exurgat, & quæ relata sunt, edat.

Galenus: Lien eget attenuantibus citra manifestam caliditatem, ne vehementius incrassascit succus crassus in ipso obturatus. Admiscendum aliquid ex austeris ad actiones naturales conseruandas, quibus per accidens totum corpus conseruatur. Conueniunt valde amara cum quibusdam austeris ex aceto. Intus ex Hipp. medicamenta Splenem attenuantia, Asphodeli

188 *Artis Medice lib. 7.*

Int. Aff.

deli semen, Visci folia, Fæ-
nogræcum, semen Viticis, Ru-
ta, Mentæ radix, in Vino au-
stero trita. dato singulis die-
bus ieiuno. Galenus ex aceto
hæc tribuit Myrobalani ca-
ro, Hemionitis, Asplenum,
Capparis, radicis cortex, Co-
stum, Chamædrys, Polium,
Coryledonis radix, Hederæ
corymbi, Ammoniacum, se-
men Hyperici, Galbanum,
Periclimeni semen & radix,
Nasturtium, Scyllæ succus,
Chamæpitrys, Aristolochia,
Rubia, Panax, Myricæ fru-
ctus, folia, lignum. Variæ
compositiones extant Andro-
machi, & Asclepiadæ. Paul.
aquam extinctionis ferri pro-
pinat in febricitantibus per
se: in infrebricitantibus ex ace-
to, & Vino. An ferri Scobes,
& Scoria ex Aceto præpara-
ta, cum vires validæ sunt ad
deambulationes, vel eum
Hieræ speciebus in catapo-
sijis:

De Morb. Ventr. 189

sijs: vel in Vino infusæ? Lienis obstructions auferunt, ieiuno Ventriculo ante inambulationes. Extrinsecus Cataplasmata & inunctiones & Epithemata. Ex Cera, Resina, Pice, Bitumine, Galbano Ammoniaco, Sambuci folia tenerima ad inflammationem. Aloes ex Aceto. Marrubium nigrum, Viscum Quercinum, Calx viua, Auripigmentum, Alumen, ex Aceto & Oleo eliquantur. Sed sæpius auferenda, ne vrant. interim fouere spōgijs calidis ex Aceto. Arabes Vnguentum de Artanita ad Umbilicum, ex Cyclamino, Brionia, nam mouet Alium & vrinas.

Hodie quidam Lienem induratum confundunt Securi supposita lana imponūt emollientia: sic enim facilius remedijs cedit: contusus & veluti confractus.

R.

*Renum constitutio, Affectus:
de Calculo. Cap. 28.*

Renes duo figura Fascoli
Lûbis affixi ad serosum
excrementum excernendum
è toto corpore, vt transmi-
tant in Vesicam per vasa vri-
naria. Substantia carnosâ, den-
sa, fibrosa: In mediam caui-
tatem venulæ & arteriæ desi-
nunt urinam transcolatâ fun-
dentes, vnde exitus in vasa
vrinaria tendentia in Vesi-
cam. Ingrediuntur in Renes,
quâ incurui sunt, Venæ emul-
gentes amplæ ex Vena caua,
& Aorta: inde in dorsum, idest
eorum gibbum vasa minuta
sparguntur, quæ reuertuntur
in incuruum ad cauitatem,
veluti lacunam. Nerui admo-
dum exigui, vnde in carne
stupidus sensus, in membra-
nis & vasis acutus fit. Patiun-
tur affectus secundum mor-
borum

de Re. af.

4.

3. f. p. 4. 5.

9.

borum differentias, intemperie
quamcumque, Inflammationem,
Obstructionem, Calculum, Ulcera: Secundum
symptomata: Dolores, Urinae
stillecidium, quæ Stranguria
dicitur: Retentio, quæ
Iscuria; Mictio cum dolore,
quæ Disuria, Sanguinis mictio
Sanici, Pilonum, Arenularum,
seu Sabuli. Humorum,
quorum multi communes sunt
cum Vesicæ morbis, aut vasorum.

Calculus Renum aut vasorum
Nephritis vocatur, Vesicæ lapis
Lithiasis. Morbus est in numero,
toto genere, præter naturam. Est
& causa Obstructionis, aut Attritionis:
Symptoma autem intemperiei.
Causa materialis, humores crassi
aut glutinosi, aut utroque modo
vitiati. Cibi & potus, Lac, Caseus,
Pisces ex lutosi, Anguilla, Voracitas,
Aquæ stagnantes, & quæ

Re. af. 2.

Ac. 29.

quæ ex magnis fluminibus. Efficiens sola caliditas etiam naturalis Gal. licet extra quidam à frigore congelentur.

4. Met. 7.

An lapides illiquabiles ab utroque fiunt? Arist. Iudicium. Omnis vrina in matulis derelicta crustam lapideam gignit, ut aquæ Thermales. Quod enim assatum est, in vrina refrigerescens concrevit, ut Calx soluta in aqua. Quod pueris contingit in vesica, quia membranosa, frigida, & ampla capacitate constat: non in Renibus ob velocem exitum. In adultis autem prius concrevit in Renibus, quia materia crassa in illis magis retinetur, & exusta magis est quam in pueris. Hipp. in Coacis inquit. Nephritis non fit ante pubertatem, sed ab anno 14. usque ad 42. omne genus morbi contingit. Post hanc ætatem nec strumæ, nec Calculus in Vesica, nisi prius affue-

affuerint. Incipit quibusdam
concrefcere in Vefica Feilis.
Feruor enim caufa eft reten-
tionis Hipp. Oppofitum vi- *Ac. aq.*
detur sentire Hipp. vbi in- *2. Nat. hui*
quit, & Calculi pueris pro- *11.*
pter Veficæ caliditatem, & to-
tius corporis fiunt. Viris au-
tem Calculi non generantur
propter corporis frigiditatē:
Quod Gal. inquit verum effe
in fenibus. An frigiditas fa- *3. Aph. 26*
ciens ad lapidum illiquabi-
lium concretionem, non eft
euidens, vt quando glaciei
concretio fit? Non enim Cry-
ftallus inter Gemmas à vehe-
menti frigiditate fit, fed fatis
eft poft exuftionem, & folu-
tionem modica frigiditas, fe-
parans ab aqua craffitiam.
Hæc autem frigiditas in con-
cretione efficit, vt aliqua hu-
miditas glutinans fccas par-
tes, retineatur, quæ alteri hu-
miditati prohibet ingreffum,
quo fit vt ab humido & frigi-
do

do non soluantur, neque à calido & sicco, quia affatio coagulauit. Ideo secundum sensum tam in Renibus, quam in Vesica sola caliditas lapidem gignit: quæ in pueris maior est quam in viris, & in iuuenibus maior quam in senibus: quamuis caliditas aduenticia aliquando aliter se habeat. Locus igitur exustionis materiæ lapidescentis est in Venis, in Abscessibus: nam & pus lapidescit. Concretionis autem locus minus calidus, vt Vesica, Renum lacuna, vasa in quibus materia retinetur. Vesica pueri magis retinet, quam virorum, & in masculis magis quam in feminis ob meatus angustiam. Qui in renibus coagulantur, quidam numerosi milij magnitudine spectantur, alij parua vicia, alij instar Piseoli omnes læues, quia in vasis angustis fiunt, sed in progressu maiores

De Morb. Ventr. 195

maiores spectantur dilatatis va-
lis. At qui in lacuna Renum
concreſcunt, hiſpidi ſunt, &
inaequales, ad lapillum prius
genitum inaequaliter agglom-
nerata noua materia, non a
continente coercita: & qui
deſcendunt in veſicam, ſi non
expurgentur, ſimili modo cre-
ſcunt ſecundum cruſtas.

Signa Nephritis. Dolor ſi-
milis Colico, aliquando ſi-
mul vtraq; pars afficitur, ob
conſenſum. Fit repente impa-
cto lapide in cauitate Reni,
vel Vretere, ideo acutus. Re-
num dolor repentinus cum
vrinae ſuppreſſione, Hipp. in
Coacis. Calculorum aut vri-
narum craſſarum mictionem
ſignificat. Comunicatur enim
affectio veſicae. Grauis in ſub-
ſtantia Renum, nullus cum
exigui & laues. Fixus in Ne-
phritide communicans cum
Vreteribus. Vagus in Colico
maior nauſea & vomitus. Vri-

6. lo. af. 3.

i 2 na

*Re. af. 3.**Ac. aq.**4. Aph. 79**Int. aff.
4. Mor.*

nã fabulosa certum iudiciũ :
 At in initio aquosa. Calculo-
 si Vrinam splendidissimam
 ad similitudinem Seri, quia
 crassissimum, & biliosissimum
 manet. Quibus in Vrinis are-
 nosa subsistunt, ijs Vesica cal-
 culo laborat. Gal. non solum
 Vesicæ, sed & Renum signum
 esse. Libro de Internis aff. non
 Vesicæ, sed Renum. Gal. in-
 quit. Arenulæ prodeunt, dũ
 fiunt lapides, cum facti sunt,
 nō possunt eijci, nisi à natura,
 aut medicamētis atterantur.
 Pro diuersitate colorum, di-
 uersa materia significatur :
 subalbidi, rufi, pallidi, nigri,
 aliquando sanguinolenti, cō-
 mixto sanguine. Stupor in
 crure eiusdem lateris, reple-
 ta Vena, vnde & nerui com-
 pressio. Testis contractus cō-
 municata affectione semina-
 libus, aliquando genitali spi-
 ritu ex Arterijs tendente. Si-
 gna lapidis in Vesica, Frica-
 tio

De Morb. Ventr. 197

io pudendi, non in feminis.
Stillicidium. Mutata positio-
ne facilius mingunt. Calcu-
losi ita figurati, ut lapis ad v-
rinarium meatum non illaba-
tur, facile mingunt, quod non
contingit in Tuberculo. Vri-
na sanguinolenta: dolor in-
mingendo. In Pueris tactu di-
gnosci potest, intromisso per
sedem digito medio. In adul-
tis intromissa candela in pu-
dendum, aut Siringa, sed ex-
asperatio periculosa. Progno-
stica. Insanabiles magni, &
præduri. Qui in Renibus ma-
gis atteri possunt. Pericula
imminent ex inflammatione:
Ulcere, Suppressionis Urinæ,
ob dolorem ingentem coangu-
statis meatibus.

Curatio calculi.

Cap. 29.

Curatio præseruatiua cal-
culi, ne gignatur, ne au-
gea-

Re. as. 1.

i 3

gea-

geatur. Vistus extenuans in
 crassioribus naturis, medio-
 cris in gracilibus: non valde
 calidus: Aquam bibere ante
 cibum, Trall. Fugare satieta-
 tem, cruditates, & motus ve-
 hementes. Abstinere à cibis
 duris, & multum nutrienti-
 bus, inflantibus, viscosis: Vi-
 nis nigris, & dulcibus, Aquis
 palustribus, & magnorum flu-
 minum. Si cruditas orta sit
 in Ventriculo, corrigere som-
 no longiore, & calefacienti-
 bus. Si humores abundaue-
 rint, euacuatio per Venæ se-
 ctionem, & medicamenta pur-
 gantia in vere. Renes & Ve-
 sicam expurgare post to-
 tius euacuationem non ijs,
 quæ vehementer Vrinam im-
 pellunt, quia cogunt in lapi-
 dem, sed quæ obstructions
 aperiunt, manifeste calida a-
 mara: & quæ ducunt Vrinas
 crassissimas, viscosas, & foetē-
 tes: Cardui decoctum, Erin-
 gij

10. Cap. I.

De Morb. Ventr. 199

gij radix, Asparagus, Betonica, Rubia: Cetrach, Quinquifolij radix, Trall. Ad Calculum iam genitum, eductio, si fieri potest; sin, transpositio ex angusto in latam cavitatē. Melius in substantia renum, quam in cavitare. Et in lata cavitare Renum, quam in Vretere: & in Vesica, quam in Collo.

Vrgente dolore prius mitigantia, ne inflammatio oriatur, vnde augetur meatuum astrictio. Si dolor subito inuadat, existente cibo in Ventriculo, vomat statim, deinde fæces educantur clysteri. Postea plenitudo euacuetur, si adsit, mediocriter, vt sufficere possit, Venæ sectio in brachio ad reuellendum. Aliquādo in Poplite, aut Malleolo, ad deriuandum à partibus propinquis, sed in virtute imbecilli materiæ alliciuntur ad partem affectam, ideo satius

Re. af. 4. 8

i 4 in

200 *Artis Medicæ lib. 7.*

in superioribus , ex manu,
Act. Medicamenta purgan-
tia ad humores peccâtes post
Venæ sectionem interiectis
diebus quibusdam ad vires
instaurandas. Therebinthinæ
uncia semis saccharo candio
fiat bolus , & superbibâtur o-
lei Amygdalarum dulcium
uncia quatuor , aut Cassiæ
nuper extractæ uncia .vna.,
Diaphiniconis uncia semis,
fiat bolus cum pulvere liqui-
ritiæ . Deinde ad Lumbos, &
Ilia Anodyna relaxantia hu-
mectantia , per fomenta , In-
fessiones , & Cataplasmata :
ex Fœnogræco, sem. Lini, Al-
thea, Anetho, Gummi, inco-
ctis in aqua, & Oleo dulci .
Adipe Gallinaceo recenti,
Phasiani, Butyro recenti. Fa-
rina tritici Hordei, sem. Li-
ni, Fœnogræci, radice Altheæ
trita, & cribrata, Terebin-
thina adiecta Cataplasmati.
Addenda ad flatu femina

Ane-

De Morb. Ventr. 201

Anethi, Apij, Fœniculi, Ligu-
stici in decocto. Clysteres ex
ijsdē. Ne Cataplasma refrige-
retur, fouere oportet ex de-
cocto, & sæpius renouare.
Sacculi etiam ex farinis ma-
didi, Cataplasma optimum
ex Lupini farina decocta cū
musto, adiecto Peucedano,
Chamæmelo. Item panis cū
musto incoctus. Balnea aquæ
dulcis non diuturna, quia vi-
res resoluunt. Ex Balneo fo-
menta applicentur, & Cata-
plasmata. In dolore vehemen-
tissimo si cetera non profint,
obstupefacientia. Hipp. cura-
tio prius purgat per scam-
onium fomento ad totum cor-
pus adhibito: postera die sub-
purgat duobus congiis succi
Ciceris albi, sale iniecto, vt
bibatur, facit enim ad detra-
hendum lapidem: quemad-
modum hodie aquæ therma-
les quædam faciunt: Postea
cibis, potibus, & balneis cu-

Int. aff.

i s rat

rat, vt in stillicidio. Cum dolor presserit, multa calida lauato, & tepefactoria, quae parte maxime dolet, adhibe-
to. Cum intumuerit, tãquam suppuratum secat, & extra-
cto pure, arenam per Vrinã cientia sanat. Si sectus fuit, sanum fieri spes est, alioqui com moritur. Ad lapidem de-
trudendum ex Renibus, Aet. Cucurbitulae faciunt à Reni-
bus deorsum attractae ad in-
guina, dum in balneo, aut in-
fessionibus, & fomentis loca
relaxata fuerint. In calidio-
ribus naturis, & siti immodi-
ca, post totius euacuationem
aqua frigida saepe, & copio-
sius hausta lapidem detrudit,
si æger assuetus frigidae, &
nulla in visceribus fuerit in-
flammatio. Eadem habentur
ex Philagrio. In ceteris autẽ
conueniunt aquae thermales
potae, quae nitrosae aut ferreae
sunt, vt aqua Regii, Villensis,

Fi-

Ficoncellæ. Si nimium impa-
ctus, vt nequeat descendere :
conterendus est in arenulas
paulatim. Lapidem paulatim
conterunt infidentia tepida,
admixtis tamen quibusdam
diureticis ad Ventericulum.
nam calida Vrinam mouëtia
indurant. Videmus succos
acidos vt Limonum, Marga-
ritas tabefacere : Salem in fi-
ctilibus contentum, crustas
demere. Explicantur à Gale-
no Danaconium, Petroseli- *Re. af. 4.*
num, Polytricon, ex Oxy- *6. lo. af. 4.*
melite, & ipsum Oxymel, A-
cetum scilliticum, Saccharū.
Lapis spongiæ, Iudaicus, qui
Syriacus mas, & femina: ad Ve-
sicæ lapidem femina, ad Re-
num, mas.

Sed concedit quidem Gal.
ad lapidem renum multum, *9. Simpl.*
posse, ad Vesicæ lapidem nul-
lum se reperisse. Sanguis Hir-
cinus, præparatus, Vitrum
combustum, lapis Cappadox,

256 *Artis Medicae lib. 7.*

ideſt Spongiæ. Paliuri ſemen,
Graminis radix, Aſparagorū
regalium radix, ideſt Aſpho-
deli. Semen Altheæ, Milium
ſolis, ideſt Lithoſpermon. Be-
tonica, Saxifragia, Pulegium,
Capparidis radix, Ficuum do-
meſticorum ſemina, Bdelliū
Arabicum, ſuccus Limonum,
Nitrum, Sal, Oleum vitrioli,
Sulphuris, cum aqua Capilli
veneris, vel Iure. Extant va-
ria cōpoſitiones. Electuariū
Lithontripton, de Cineribus.
Actius extollit auem Troglo-
dytem: paſſerculus eſt mini-
mus, vt Regulus: totus cum
pennis combuſtus vt teri poſ-
ſit. Inter prædicta remedia,
quædam emolliunt, quædam
frangunt emollientia alterna-
tim intermiſcenda, vt Paliuri
ſemen, quæ Iuiuba à noſtris
dicitur, ſemen Altheæ, Bdel-
lium Arabicum, ideſt Gum-
mi Arabicum, Gummi Cera-
ſorum. Fiat paſtillus ex pul-

pa

10. Cat. 1.

De Morb. Ventr. 205

pa Iuiubarum, & Gummi Arabico, & semine Altheæ, cū modico Olei Vitrioli, aut Sulphuris. Dissoluatur in potu, cum aqua Capilli veneris.

Victus quamdiu dolores vr gent, tenuissimus, Ptisana, emulsio seminum communiū, Amygdalarum, potus aquæ decoctionis Iuiubarum, Liquiritiæ, Capillorum veneris, cum saccharo. Mitigato dolore, carnes volatiliū elixæ, Vinum album, potus largior, nisi affuerit vrinæ retentio. Si lapides conteri nequeant, vt qui in Vesica ob duritiem, & longinquitatem: & qui in Renibus vetustiores fuerint, non mouendi, nec agitandi, ne atterant vicinas partes, & inflamment: atque exulcerent. Extrahuntur lapides Vesicæ incisione in collo Vesicæ, & qui impacti in pudendo: incisione superius, ne vrinæ meatus tangatur, fieret. n. fistula.

Ren. af. 3.

De

*De Renum inflammatione
Vlceribus, & mictu
sanguinis.**Cap. 30.*

Renes inflammantur con-
citata fluxione, aut ob
dolorem, aut ob caliditatem,
aut propter imbecillitatem.
Dolor ex calculo, aut percus-
sione, obstructione. Caliditas
ex motu, aut humoribus cali-
dis. Imbecillitas ex qualibet
intemperie. Hipp. recenset
quatuor species. Prima ex
calculo. Secunda ex labore,
cum rupta Venula in renibus
sanguinem fuderint, deinde
pus. Tertia ex atra bile mor-
dente, & exulcerante. Quarta
ex bile, & pituita maxime in
aestate, aliquando ex Venere.

6. lo. af. 3 Signa. Dolor cum horrore in-
terpellato, varioq. ad quem
febres quaedam inordinatae.

Int. aff. Ex venae disruptione, sangui-
nis

*Int. aff.**6. lo. af. 3**Int. aff.*

nis mictio, deinde puris. Quicumque sponte sanguinem, 4. Aph. 72 mingunt, iis à renibus venulam ruptam significatur. Rumpitur, aut ex motu vehementi, ut in saltu, casu ex alto, aut ob plenitudinem. Contingit & ex Vesica. Si sanguinem, aut pus mingant, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat, Exulceratio aut à lapide fit atterenti, aut ab humoribus mordentibus. Aliquando sanguis egreditur per anastomosim, quod paulatim incipit, non repente. Gal. Dignoscitur pars affecta ex dolore, & ijs quæ cum vrina excernuntur. Vult Galenus etiã ex permixtione sanguinis cū vrina magis, & minus: at liquida cito permiscentur, etiã si ex loco propinquo exeant. Ex atra bile, vrina ostendit veluti ex carnibus bubulis affatis: dolores in Lumbis, & in vesica, & inter anum & puden-

dendum, & in ipso rene ad tempus modicum, deinde remittit dolor, & rursus acutus fit breui tempore.

Ex bile, & pituita, dolores in lateris mollitudine, & Lumbos, & Lumborum musculos. Non potest in sanam partem decumbere, nam valde dolet, & pendere quædam videntur ex mollitudine: Si pronus decumbat, non dolet. Pedes, & Tibiæ semper frigent. Urina vix prodit, crassa cum subsidentia farinæ modo, & si bilis prævaluerit, subfulva, si pituita, alba, & crassa. Si morbus diutius perseverat, cum dolore maiore suppuratur. Gal. Cum pendere videatur ex Rene dolente quidpiam, abscessum concretum significat.

6. 10. af. 3.

Prognostica. Inflammatio ex lapide periculiosior, quia astrictio augetur, & dolores, unde urinae retentio fit. Suppurat.

ratio si extra intumuerit, spes
salutis per incisionem. Ex san-
guinis mictu periculum ne-
grumus meatum claudat,
& vrina cohibeatur. Tenuis 6. lo. af. n.
sanguis, & sine dolore non pe-
riculosus.

Curatio inflammationis,
ad fluxionem reuulsio per ve-
næ sectionem in cubitu: Me-
dicamenta purgantia non in
principio, quia offendunt par-
tes inflammatas, præcipue
Renes, & Vesicam. Trall. ma-
gis Clysteres molles. Præpa-
randi humores humectanti-
bus cibis, & potibus, Ptisana,
Pisces saxatiles, Intubus, Mul-
sa aquosa, decoctio Liquiri-
tiæ, Iuiubarum: sy. Violatus,
de Ibisco, de Capillo veneris,
Si humor crassus, admiscen-
dum aliquid oxymelitis, &
aliqua extenuantia, semen
Apij, succus Limonũ, sed par-
cius, ne mordeant, & ne ferāt
humores ad partem affectā.

Si

210 *Artis Medica lib. 7.*

Si humores acres magis molestāt, aqua tepida copiosior. Extrinsecus refrigerantia inter initia, & ubi feruor, etiam in statu. Ceratum rosaceum cum modico aceti, aut succo Polygoni, Portulacæ. In progressu addendum Chamæmelum, adipēs recentes: Diachylon. Tandem sola relaxantia, & digerentia: ex decocto Chamæmeli, Meliloti, Absinthij, Althææ, Fænogræci, sem. Lini: Non diutius, ne in pus cōuertatur: Balnea, ubi totum corpus fuerit euacuatum. Celsus inquit: Oportet quiescere cubare molliter, soluere aluum: sæpe desiderare in aqua calida, neque cibum, neque potum frigidum assumere. Abstinerē ab omnibus salsis, acribus, acidis. Bibere liberaliter. Adijcere modo potioni, modo cibo, Piper, Porrum, Ferulam, Papauer albū: inde quæ maxime vrinam mouere

De Morb. Ventr. 211

uere consueuerunt. Ad suppu-
ratos renes, si extra tumor ap-
pareat, secandus quamprimū
iuxta renem. Si pus non erupe *Int. aff.*
rit, vergit inferius, aut ad Inte-
stinum, quod melius est, aut
superius, vnde tabidi fiunt,
& pereunt. Si pus exeat per
vrinam, id aut a Renibus ve-
nit, aut à superioribus, aut à
Vesica. discernitur commix-
tione cum vrina magis, & mi-
nus. Abstergendum ex potu *6. io. aff. 4.*
aquæ mulsæ aquosæ, Ptiſana,
Melle rosaceo, aqua Hordei,
Capillorum veneris: Semen
Cucumeris, Vesicariæ, serum
& Lac, quæ Hipp. exhibet ad *Int. aff.*
atram bilem in renibus.

Ad mictum sanguinis: Si
magna effusio, venæ sectio re-
uellens in cubitu iterata. Aet.
statim in principio: & vbi per
interualla ex consuetudine,
anticipare paulo ante. Si ab
exercitatione, non tutum est
cohibere: nam alij morbi cō-
tin-

212 *Artis Medica lib. 7.*

tingunt, vt ex retētis Hæmor-
rhoidibus, iuuat excretio.

Sed in processu debilitantur,
quibus multus prorumpit.

Cohibetur refrigerantibus &
astringentibus. Ad renes Po-

sca in spongijs applicata: Un-
guentum rosatum cum ace-

to, Rubi folia, Glandes, Myr-
thi, & Quercus folia Mulico-

rium. Intus succus Polygoni
Symphiti decoctum, Traga-

cantha in Vino nigro, stratio-
tes aquaticus, lisimachia suc-

cus, Salicis folia. Hæmatites.
Pæonia semina fulua 12. in

Vino: Cornu Cerui vstum. .
Aquaæ aluminosa, qualis est

Brandula. Potus aquaæ frigi-
da extincto ferreo: Cauere ni-

miam astrictionem, ne gru-
mi retineantur dissoluendi

Oxymelite, Posca, & Lixi-
uio.

6.10.2f.3. Vlcera contingunt in Re-
nibus & Vesica, aut ex lapi-
de atterente, aut ex suppu-
ratione

ratione, aut humoribus erodentibus: aut medicamentis, ut Cantharidibus. Dignoscuntur ex vrina conturbata ac si farina esset inspersa, quæ residet in fundo. Aliquando exiguum pus crassum, quod non soluitur in vrina: aliquando ramentum particulæ, ut Caruncula ex Renibus, veluti squama ex Vesica, aliquando sanguis ob erosionem. Dolor creberrime sentitur, Si ex lapide, arenulæ & reliqua signa lapidis. Si ex abscessu, quæ præcesserunt: & copia sedimentorum, in quibus & humorum vestigia ostenduntur. Curantur siccantibus & abstergentibus sine morfu. Dioscorides laudat ad omnia vlcera interna, & rosiones Renum & Vesicæ Lac præcipue Asininū. Trall. vitandum vbi multitudo acrimium humorum, quia simul corrumpitur. Suspectum etiam

214 *Artis Medicae lib. 7.*

tiam in Calculo. Tamen Ac-
tius ex Philagrio exhibet in
extenuatis calculosis, at non
aliud genus Lactis, quam Asi-
ninum. Qui timent Lactis
crassitiem, exhibeant serum
per Lactis decoctionem ex-
tractum, non per coagulum:
idest Lac aqua pluuiæ tempe-
raturum & decoctum, postea
refrigeratum & colatum, Sic-
cantia, Bolus Armenus, Equi-
setum, Gramen, semina Al-
theæ, sem. Lini, Vrticæ, Pa-
liuri. Pastilli ex his varij com-
ponuntur, dantur cum deco-
cto Eringij, aut Graminis,
aut Atractylidis herbæ, aut
Chrysattico, idest Protropo,
10. *Cap. 1.* Vino dulci. Ex Andromacho.
Recipe sem. communia, sem.
Papaueris albi, sem. Cucu-
meris, Tragacanthæ, singu-
lorum drach. duas, Anisi
drach. quatuor, cum aqua,
fiant Pastilli. Alij etiam ob-
stupefacientes componuntur

ex

De Morb. Ventr. 215

expasso. Mastiche, aut Ter-
rebinthina lota in ouo sorbili
sumpta. Trall. Oua recentia
cruda ad sorbendum præstan-
tissima. Portulacæ succus ad-
densatus in pastillos drach.
vna cum aqua Calida Act.
Aquæ thermæ ferreæ, vt
Villensis, Ficoncellæ.

De Capillitio, & Stillicidio.
Cap. 31.

Pili in vrina, morbus Pi- 6. lo. af. 3.
laris, Capillitium, cu- 4. Aph. 76
ius facit mentionem Hipp.
Quibus in vrina crassa existē-
te carūculæ parua, aut veluti
capilli vna exeunt, ijs à re-
nibus excernitur. Gal. fieri
à crassis humoribus & visco-
sis non in Vesica, sed in Re-
ne. Longitudo aliquando ad
dimidium cubitum: ex co-
mestione Orobi, Fabæ, Casei
teneri, & duri, & aliis cibis
crassioribus. Putat in venis
cam

eam longitudinem procreari:
quod mirum in trāfitu per an-
gustas venas integritatē ser-
uari.

An collecta in renibus ma-
teria sequaci veluti Viscum,
dum fertur per vretes, pro-
ducitur in eam longitudinē,
vt stamina serica ex simili ma-
teria in ventre sui vermis col-
lecta? Contingunt sanis, à qui-
bus periculum imminet ob-
structionis, aut lapidis. Cu-
ratur per incidentia, & exte-
nuantia, quibus omnes peri-
cula euaserunt.

Strāguria græce ab expres-
sione dicta, Latine stillicidiū.
Est vrinæ paulatim & gutta-
tim emissio cum assidua min-
gendi irritatione. Aet. Disu-
ria, idest, vrinæ difficultas,
qualis in Intestinis dysente-
ria, est emissio vrinæ cum do-
lore, vel cū difficultate, Gal.
Hipp. senibus contingere.

7. Aph. 48 Stranguriam & Disuriam.

Stran-

De Morb. Ventr. 217

Stranguria est veluti Tenesmus, assidua mingendi cupiditas cum expressione paucae urinae. Si contingat cum dolore, Disuria dicitur: vterque affectus simul esse possunt. Symptomata sunt Vesicae, aut propter eius affectum, ut ulcera, inflammatio, imbecillitas: aut ob urinam mordentem ex superioribus, ut Pure, humoribus acerbis. Hipp. 2. 6. lo. aff. de Morbis inquit: Quum repletum fuerit caput, & praecolidum factum, torpor caput tenet, & frequenter mingit, & alia patitur, quae in urinae stillicidio. Post novem dies, si per Nares aut Aures aqua & muccus erumpat, à morbo liberatur, & urinae stillicidium sedatur, mingitque citra dolorem urinam multam, & albam. Item Stillicidij multi modi sunt & omnigeni. Fit à pituita: & cum Vesica siccata fuerit, aut perfrigerata, k aut

218 *Artis Medicæ lib. 7.*

aut euacuata, dolorem exhibet. Quum vero humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus. Senioribus fit diuturnior, iunioribus breuior: neutris lethalis. Per consensum,

3. *Aph.* 58 vicinarum partium: ex inflammatione Intestini recti, aut Vteri, & Renibus purulentis stillicidium aduenit, vt Hepate inflammato singultus.

Signa: Fieri ex materia descendente à Capite, Capitis læsio: Ex Renibus, quæ excernuntur cum vrina, pus, humores, ramenta. Ex Vesicæ affectu dolor ex lapide, aut

4. *Aph.* 80 vlcere: Exeuntia: Ex imbecillitate, cum vel à parua quantitate grauatur, ob siccitatem: vidimus quendam, ob Calculū Vesicæ, Vesicā in angustū habere contractā, vt modicam vrinam contineret, hic continuo stillicidio laborabat. Ob frigiditatem in senibus per ætatem coangusta-

ta

ta Vesica. In Aquilone, in
Autūno, Vrinæ albæ. Progno- 3 *Aph.* 16
stica. Sanantur quæ ex descen- 22.
su materiæ irritantis: si par-
tes mittentes sanabiles sunt.
Idem si fiat per consensum.
Imbecillitates Vesicæ in seni-
bus non curantur. Periculum
ex stillicidio ob insomnium,
ex frequenti irritatione: & ne
transcat in suppressionem
Vrinæ. Si ex stillicidio Ileos 6. *Aph.* 44
superuenit, in septem diebus
pereunt, nisi febre superue-
niente satis Vrina fluxerit.

Similis affectus est Vrinæ
incontinentia, cum præter
voluntatem emittitur, vel ob
vitiū musculi claudentis cer-
uicem, vel nervi in Paralyfi.
Et qui in somno permingunt, 6. *lo. af.* 4.
quæ affectio pueris maxime
contingit. Act. musculo ob
somnum non fungente suo
munere, Vesica autem expel-
lente.

Curatio Stillicidij: Con- 7. *Aph.* 48
ducit *Aff.*

k 2

ducit

220 *Artis Medicae lib. 7.*

ducit forinsecus corpus Bal-
neis calidis mollire, intrinse-
cus humectare, Aluum per ci-
bos fluidam reddere: Vesi-
cam per potus quamplurimum
diffundere copia Urinae. Dan-
da & Urina in cienteia, quae
dolorem sedant. Aet ad acce-
dinem irritantem, contem-
perantia & euacuatio: quam-
primum humores noxios eua-
cuare: Sy. rosato solutio,
Cassia Tamarindis, Sero Vac-
cino cum sy. rosato per plu-
res dies. Abstineat ab omni-
bus acris & falsis. Bibat
aquam calidam dulcem plu-
rimam: Amylum cum Lacte
decoctum, Palmarum deco-
ctum, Vinum dulcius, Lac
calidum potatum, & per co-
lem infusum, Trocisci Alche-
chengi in potu: Continuis fo-
mentis utatur ex Malua, Pa-
rietaria, Violis, Melitoto,
Chamæmelo incoctis in Hy-
dreleo. Ad frigiditatem, fo-
uere

uere pectinem ex oleo Ruta-
ceo: Insidere in decocto Sāp-
ci, Rutæ, imum Ventrem,
contegere & calfacere. In se-
dem eadem infundantur. In
cibis Vrinam cientia: Ani-
sum, Foeniculum, Cinnamo-
mum: & in potu. Theriaca
cum passo, aut Vino mulso.
Hipp. Vrinæ stillicidium, & 7. Aph. 49
mingendi difficultatem, Vini
potio, & Venæ sectio soluit.
Incidere autē interiores. Sed
Gāl. reijcit hunc Aphorismū,
cauillans secare interiores.
An prius ad reuellendum, in-
teriores malleoli, vt in dolo-
re Coxendicis exteriores? Vi-
m̄ autem potus, ad vrinam,
promouendam. Ad alia vitia
Vesicæ, ad vlcera, & lapidem:
& ad partes consentientes. di-
cta sunt remedia. Ad vrinæ
incontinentiam, musculum
relaxatum fouere ex oleo Ru-
taceo ad Perineum: ex Eu-
phorbio & Castorio. Ad per-
min-

222 *Artis Medicæ lib. 7.*

mingentes in somno, Aet. varia remedia affert ex animalibus. Si mordaciores Urinæ, Contemperantia: semen Lactucæ in potu, & in ferculis. Pudendum illinire ex Cimolia cum succo Parietariæ in somno. Potus paucus, si fiant, dormiant. Ad Vesicæ imbecillitatem ex nimia humiditate, siccantia: à proprietate, Myrrha, & Calamintha cum Vino ante cœnam. Rutæ syl. semen torrefactum, Castorium: Pulmo hœdi assatus comestus large sine pane in cibo.

De suppressione Urinæ, & Diabete. Cap. 32.

2. lo. af. 1. **I** Scuria Græce est Urinæ
6. lo. af. 4. suppressio. Contingit,
aut quia Urina nō perveniat
ad Vesicam obstructis Reni-
bus, Vreterijs à lapide, humo-
ribus crassis, Pure, Sanguini-
nis

nis grumis. Vel astrictis ab inflammatione tuberculo. Vel præ siccitate in febris malignis, humoribus ad superiora vergentibus. In his omnibus Urina non fertur ad Vesicam. Aut Vesica plena non reddit Urinam obstructo vel astricto meatu ab iisdem causis, amplius ex carne supercrescente in collo Vesicæ ex ulcere eius loci. Aliquando nulla existente noxa in meatu, Urina non redditur, quia Vesica comprimi nequit ad expulsionem naturalem, cum nimirum repleta est in diuturna retentione ob negocia; aut ob nervi læsionē ex ictu spina. Quamvis Galenus non putet facultatem naturalem egere nervis ad suos motus. Sed ex ictu spinæ retineri Urinam, & Alui excrementa, quia ijs communicetur inflammatio: at hæc non statim fit, sed in progressu. Signa Vesicæ

k 4 ple.

3. Art. 51.

33.

4. lo. af. 6.

Con.

plena: tactu dignoscitur, tensione, & duritie supra pectinem. Non excerni ob vitia in meatu: ex lapide obstruente, cognoscitur, mutata figura corporis, qua melius mingit. & intromissa Siringa aut candela tangitur carnositas aut lapis. Si vitio Renum non transmittentium, nullus tumor nec grauitas in imo Ventre. Renum vitia explicata sunt quibus dignoscantur. At læso vno Rene, non tollitur Vrinæ descensus per alterum: nisi inflammatio vtrunque occupet. Si absque Renum læsione non descendat Vrina, alio vergere necesse est, vt in febribus malignis. Prognostica. Si non succurratur, breui occidit: aut Vesica inflammata, aut Vrina in venas regurgitante specie Hydropis. Curatio Iscuriæ aduersus causas, vt in stillicidio. Ad Vesicam plenam abstinere à potu:

De Morb. Ventr. 225

potu: Fomenta & infensiones
relaxantes. Si obturata fistu-
la à lapide, resupinato cor-
pore concutere, vt lapis à
meatu dimoueat, elatis
cruribus. Si non succedat, re- 1. lo. af. 1.
petendum efficacius. Sin, in-
tromisso cathetere retruditur
lapis, & Vrina per eius fistu-
lam egreditur. Idem in Cru-
mo & carnositate faciendum:
at non vbi inflāmatio adest.
Si fistula non est obturata, suf-
ficit abdominis compressio
manu, sed prius sedata in-
flammatione, si adsit, per ve-
næ sectionem & relaxantia.
Ad obtusum sensum, irri-
tantia vt in Paralyfi. Alli-
ciunt Vrinam, Nitrum, Ci-
mices trita illita ad fistulam.
Aet. Si ob Renum vitia, re-
media explicata sunt. Ad Vri-
nam impellendam efficacissi-
mum remedium recentiori-
bus, Oleum Vitrioli guttæ
duæ vel tres in iure hausta,

k s nisi

nisi febris prohibeat. Antiqui
Cantharidas propinabant.

6. lo. af. 3.

Diabete est Vrinæ proflu-
uium, rarissimus affectus:
Dipsacos etiam vocatur, ob
sitim vehementem: nam mul-
tum bibunt, & multum min-
gunt non alteratum à sua,
qualitate ob celeritatem, vt
in Lienteria. Causam putat
Gal. Renum imbecillitatem,
vt pondus retinere nequeāt.
At obstat vehemens attractio.
Respondet, non absurdum
esse vt in fame Canina. An
in Renibus non est tanta ca-
uitas, quæ continere multam
Vrinam possit, sed successi-
ue labi in Vesicā necesse est?
Attractio humidi in siti ob
calorem, vel siccitatem, vel
vtrunque. Aet. ex Arateo. Vi-
scera ipsis vri videntur, anxij,
& non longe post moriuntur.
Si quando parumper Vrinam
retineant, intumescunt Lum-
bi & Coxæ: Si adhuc amplius
mor-

De Morb. Ventr. 227

mordens calor augeatur in
visceribus, superior Venter
corrugatur, & Venæ eleuan-
tur. Vniuersum habitum gra-
cilem habent, & tabes acci-
dit. Humores vitiosi in Re-
num corpore imbibiti eam
inducunt, falsi. Curatio. Mo-
tum auertere in habitum cor-
poris. Humores contempe-
rare, Abstergere à Renibus,
Refrigerare & humectare.
Celsus auertit in corpus exer-
citatione, frictionibus, ma-
ximeq; ad solē, vel ad ignem.
Aræteus sudatorium parat ex
vapore in dolio, vt interim
aer frigidus inspiretur. Aetius
addit vomitum post potum.
Archigenes Venę sectione uti-
tur in initio moderata, non
in progressu. Contemperatio
per victum. Ptisanæ succus
frigidus, Olera, refrigeran-
tia non diuretica, Oua sorbi-
lia, Halica, Caro Porcina
sine pingui, elixa, Caseus re-

k 6 cens

cens non salitus, Potus frigidus Vini rubri austeri cum aqua frigida amplius diluti. Celsus. Cibus comprimens, Vinum austerum meracum, æstate frigidum, hyeme calidum quam minime. Lac extincto ferro, vt totum Serum absumatur. Euacuatio prauorum per Aluum medicamentis lenientibus vel Lacte Cels. per vrinam Archig. mediocriter vrinam cientibus, vt Renes à prauis expurgentur. At non tutum in inueteratis. Emulsio seminum communium. Refrigeratio Renum exterius ex Lactuca, Umbilico Veneris, Lenticula palustri, Vnguentum rosaceum, adiectis aliquando obstupefacientibus, Mandragora, Papaueri.

Libri Septimi finis.

A N-

ANDREAE

CÆSALPINI

ARTIS MEDICAE

LIBER OCTAVVS

DE GENITALIVM
MORBIS.*Praefatio. Cap. 1.*

Vnquam satis
mirari licet,
quantum Na-
tura gestiat in
ijs partibus,
quæ ad speciẽ
propagandam datæ sunt, fa-
bricandis & exornãdis, Nam
in Plantis quid pulchrius spe-
ctari potest, quam apparatus
ad seminis productionem, ?
Quam iucunda est florum ve-
nustas

nustas fructus præmonstrantium, in quibus semen naturæ thesaurus conditur? Nulla enim res adeo intuituum oculos oblectat, quam colorum pulchritudo, & texturæ artificium, quibus natura perunq; in ijs condendis ludit. At illud maxime mirandum in animalibus, quod genitalia tam in maribus, quam in feminis tanquam turpia, & obscœna abscondit, quasi pudeat ostendere. Nam in brutis, quorum ingressus pronus est, sub cauda & inter coxas latitantia collocavit. In hominibus autem, quibus ob rectam staturam id minus fieri poterat, inditum est, ut arte has partes velent: nec turpe videtur reliquum corpus nudum ferre, modo hæ solæ tegantur. Quin & nominibus proprijs eas proferre pudet. Quæ enim apud vulgus recepta sunt vocabula, recun-

De Morb. Genit. 231

recundius loquentibus, ne
consuetudine quidem placēt,
sed foediora videntur. Ideo si
quando necesse sit aut in sciē
tijs, aut Medicinæ gratia eas
partes meminisse, Latini Græ
cis nominibus vtuntur, vt
Cornelius Celsus testatur.
Quod si morbi in ijs sedibus
contingant, ægrī ob verecun
diam non audent patefacere.
Idque sæpe in causa est, vt re
medijs destituti magis ingra
uescant, & hominem perdāt.
Quod præcipue mulieribus
accidit, sunt enim verecun
diores, vt Hippocrates testa
tur. Num putandum est na
turam eas partes, quibus of
ficium generationis delega
uit, tamquam turpes despe
xisse? At nequaquam rationi
consentaneum est, eas despi
ci, in quibus maximum eius
artificium spectatur, diuinæ
mentis sapientiam ostēdens.
Creantur enim in Vtero tan
quam

235 *Artis Medice lib. 8.*

quam in officina omnes animalis partes: quanquam prope exitum excrementorum, quia materia generationis excrementum quoddam est, in quo calor animalis comprehenditur, proportionem respondens elemento stellarum, & cum eo diuina mens in homine, ut tradit Aristoteles. Nihil igitur turpe, nihil obscenum in Natura, sed ubique etiam in rebus vilissimis diuinum quid continetur. Genitalium porro actionem non paruipendi, sed summopere expeti à Natura, argumento est voluptas eximia indita rei venereæ, nulli alij ex corporeis voluptatibus comparanda. Gliscit enim ex ea vniuersum corpus, ut penè langueat præ dulcedine: qua ratione ad prolem gignendum auidius excitantur animalia. Plantæ igitur suam hilaritatem ostendunt in floribus, & fru-

fructibus vario modo ornat-
tis. Quoniam verò animalia
præter partes genitales, alias
pulchriores habent, quæ sen-
sibus & motibus inserviunt,
iure has ostentant pulcherri-
mo artificio fabrefactas, præ-
cipue Caput, & Faciem, geni-
talibus obscuriori loco lati-
tantibus. Neque immerito
obscœna appellantur. Cum
enim homini vita præstantis-
sima sit ex intellectu: quem-
admodum turpe est brutorū
animalium more duci à sen-
su, sic turpius quoque est mo-
re plantarum venereis illece-
bris detineri. Vt enim quo-
dam tempore mas & femina
iunguntur prolis gratia, sic
Plantæ maris & femina vires
habent coniunctas, ut assidue
quodammodo coire videan-
tur, teste Aristotele. Sed hæc
iam egrediuntur institutum
nostrum. Proposuimus enim
partium Genitalium morbos
per-

persequi, præcipue mulierum.
Nam hæ longe pluribus, &
gravius laborant, quam viri.
Futura est autem hæc tracta-
tio Medicis maxime necessa-
ria. Difficilis profectò, quia
à Galeno & recentioribus mi-
nus exulta reperitur, raro
aut nunquam in scholis exagi-
tata nisi per transennam. Ne-
que ipse hanc provinciam su-
scipissem, nisi Hippocratem
auctorem haberem, qui dili-
gentissime hanc partem exco-
luit. vnde eruere licet omnia,
quæ necessaria sunt ad præ-
notationem & curationem Mu-
liebrium morborum. Inter po-
steriores auctoritate dignos,
in hac parte habemus Aetiū,
& Auicennam, qui admodum
diligenter de ijs tractarunt.
Quamuis autem libri, qui no-
mine Hippocratis de his cir-
cumferuntur, non omnes le-
gitimi videantur, interserun-
tur enim aliquando quædam
sen.

De Morb. Genit. 235

sententiæ, quæ Doctrinæ Hippocraticæ non consentiunt: auctores tamen graues esse ostendit antiquitas, & accurata absque vlllo fucō eorum explicatio, quæ ratione & experimēto comperta sunt. Multa de his habentur in Aphorismis. Extat præterea liber copiosissimus de Natura mulierum: cui tanquam præmium videtur præponendus libellus de Virginum morbis: quod enim in illo proponit ante morborum explicatiōnem, prius singulorum naturas cognoscendas esse: exequitur in libro de Natura mulierum: & incipit ab ea sententia: Si quid Diuinum inest in morbis, quæ facta fuit in libello de Virginum morbis. Non esse autem hunc eiusdem auctoris, qui scripsit de Morbo sacro, vt multi putant, quia in eo proponat primum de Morbo sacro agendum:

*s. Aph. 2
28. vsque
ad 63.
4. Aph. 1.*

supr

dum : patet, quia sententia
 dissentiunt. Sedes enim men-
 tis in hoc libello ponitur in
 Corde, Cor enim fatuum fie-
 ri scribit. Oppositum in li-
 bro de Morbo sacro, non in
 Corde sed in Cerebro. Extant
 etiā duo libri de Morbis Mu-
 lierum primus & secundus, &
 liber de Sterilibus, & alter de
 Superfoetatione, in quibus ij-
 dem fermē morbi saepius re-
 petuntur, ut videantur aut
 ab eodem auctore in diuersis
 temporibus conscripti, aut
 ab alijs transcribentibus col-
 lecti.

Sed inter hos liber primus
 de Morb. Mul. & de Sterilibus
 ostendit alium esse auctorem
 ab Hippocrate, quia in con-
 stituendis quatuor humori-
 bus, ex quibus corpus con-
 stat, ponunt Sanguinem, Pi-
 tuitam, Bilem, & Aquam: ali-
 ter quam Hipp. qui in libro
 de Natura humana: loca

aquæ

De Morb. Genit. 237

aquæ atram Bilem numerat. *4. Ge. an. 8*
Præterea Mulierem calidior-
em esse viro, sic & eius san-
guinem: Quam sententiam
refellit Arist. Sunt autem qua
libri, qui ab eodem au-
tore scripti videtur, liber de
Genitura, quem sequitur li-
ber de Natura Pueri, liber de
sterilibus, & liber primus de
Morbis mulierum, & liber
quartus de Morbis. Qui sunt
Alcmeonis Crotoniata, ut
colligitur ex sententia quæ
habetur in libro de Natura
Pueri, Pullum in ovo nasci
ex luteo, augeri ex Albumi-
ne: quam Aristoteles tribuit *3. Ge. an. 2.*
Alcmeoni.

Quatuor etiam libri de
Principijs, De Diætâ, De In-
omnijs, De Glandulis, De
Morbo sacro eiusdē auctoris
videntur à Democrito sci-
licet cōscripti, quia quasdam
sententias Aristoteles Demo-
crito ascribit, scilicet puerum
in

2. *Ge. an.* in vtero labijs sugere : ani-
 5. mam esse ipsum calidum, &
 1. *An. 20.* inspiratione aeris hauriri
 prudentiam.

*Vteri constitutio, & Affe-
 ctus. Cap. 2.*

De Resp.
 10.

AD speciem propagan-
 dam membra genitalia
 sunt, distinguunt marem à
 femina. Mari quidem promi-
 nentia extra Testiculi & Ge-
 nitale : Feminae autem vtraq;
 intus condita. Vterus propor-
 tione respondens Genitali, &
 Testiculi Testiculis. Exterius
 autem solæ Mammæ promi-
 nent, vt lacte infantem nu-
 triant: quæ & in maribus no-
 thæ tantum gratia reperiun-
 tur. Vterus ad recipiendam
 maris Genituram, & conci-
 piendum Fundo cōstat & cer-
 uice, instar vesicæ. Os vteri
 est ingressus seminis in fundū,
 prominet glādis modo in cer-
 uicem :

De Morb. Genit. 239

icem: cum genituram acce-
perit, sursum contrahitur. Os
ceruicis pudendum vocatur
Hipp. Desinit in caruncu-
las veluti colliculos promi-
nentes, quas Nymphas vocat:
reguntur labijs cutaneis in-
ter præputij, Gal. Substantia
est membranosa, crassa, exte-
rior nervosior: interior veno-
sa magis ex venis, & arterijs.
Situm paulo infra Renes: cras-
sus & maior & amplior redditur, au-
gmento crescente fœtu. Ceruicis cau-
itas rugosa, unde laceratio
quædam in coitu virginibus
lymenæi appellati. In fundo
venarum & arteriarum oscu-
latur, unde menstrua erumpunt:
in nixis Cotyledones apparēt
in Polypis. Testes utrinque
in vasis feminalibus ubi Cor-
na uteri traduntur, nam in
uteris uteris bifidus est velu-
t desinens in cornua, quasi
duo uteri videantur, unde nu-
mero plurali uteri dicuntur:

at

1. *Mormo.*

Val. diff.
2.5.6.8.

at in Mulieribus id non contingit : est enim vnica fundi vnica cauitas. Positus est vterus inter Intestinum rectum & Vesicam, quibus nectitur. Vesicæ collum desinit paulo intra pudendum superiori parte. Membrana vtrique ad ossa Ilij & os sacrū firmatur, vnde venas suscipit. Ea laxa est, vt moueri vterus possit, In dita appetentia coitus & voluptas eximia & in propria seminis emissionē, & in virilis receptione. At non in purgatione menstrui. Vtrū vtriūque semina concurrāt ad focum concipiendum dissentiūt

14. vs. pa. 11. Galenus & Aristoteles. Negat enim Arist. Affirmat Gal. ex libro de Natura pueri. Sed obstat seminis mulieris emissio extra: & vasa deferentia semen ex Testibus ad ceruicem tendentia non ad fundum, cū tamen prius ad cornua inferantur: quod antiquiores non vidis

1. Ge. an. 19. 1. Sem. 4. 2. Sem. 1. 5.

vidisse asserit. Mulieris temperamentum frigidum & humidum; eadem mollior, & animi deiectioni. Ambiguae virgines, & viri effeminati, Hermaphroditæ.

Morbi Mulierum plerumque; 2. Mor. acuti & magni fiunt, ac periculosi, intellectu difficiles, quia mulieres verentur narrare præ pudore, nisi cogantur ob vim morbi; quando incurabiles sunt: & medici negligentiores in perquirendis causis: multum enim differt muliebrium morborum, ac virorum curatio. Patitur autem Vterus morbos in intemperie quacunque, Tumores, Ulcera, Occlusionem, Hiatum, Procidentiam, Distortionem. Vnde varia Symptomata aut ipsius Vteri, aut totius, aut partium, per se aut per consensum. Vteri Symptomata in excretis & retentis menstruum defectus, aut superfluitas

242 *Artis Medicæ lib. 8.*

fluus fluxus. Circa facultatem concipiendi, Sterilitas, Prauus conceptus, vt Mola, aut Monstruosus. Circa gestationem, Abortus, Pariendi difficultas: & quæ partum sequuntur purgationes vitiosæ aut imperfectæ. Præterea dolores, conuulsiones, Vteri strangulatio. *6. lo. af. 5.* Errores vteri vocantur. nam Plato Vterum tanquam belluam inuadere ait: quod & Hipp. fateri videtur, inquit enim: Vterus ex loco motus alio alius allabitur, vbi dolores ingentes parit: ad Caput, Cor, Hepar, Pedes. Sed hoc esse per consensum afficere, idem testatur, vbi inquit. *3. Artic. 100.* Fratrationses seu Fraternitates, idest communitates & consensus multa habent cognita valde digna, circa contractiones, muscutorum figuras, Intestina, vniuersum Ventrem, Vteri errores, & contractiones. Incipiamus autem

De Morb. Genit. 243

autem à defectu menstruorū.
hec enim causa est multorum
morborū . Inquit enim Hipp. *s. Aph. 57*
Si menstrua plura fiant, ac-
cidunt morbi, & si non fiant,
ex Vtero morbi contingunt.

De retentione Menstruorum.

Cap. 3.

Incipiunt menstrua secun-
dum naturam in puber-
tate, quando aptitudo conci-
piendi adest, quod plerumq;
circa annum duodecimum
contingit, quamuis aliquan-
do tardius . Desinunt autem,
cum facultas concipiendi de-
sinat circa septimam anno-
rum septimanam, idest anno
49. Nam sine eo sanguine,
qui multitudine grauens sti-
mulat singulis mensibus ad
expellendum, non fit conce-
ptus . Non stimulat autem
postquam conceperint, dum
Vtero ferunt, neque post par-

1 2 tum

244 *Artis Medicæ lib.8.*

tum quamdiu lactant, quoniam sanguis ille tendit in alimentum foetus & pueri. Quod si menstrua illis temporibus adueniant, foetum aut infantem lædunt. Si præter hæc tempora deficient menstrua, præter naturam est, & morbos prænuntiant, aut sterilitatem. Secundum naturam singulis mensibus exeunt desinente mense, idest ante nouilunium ob frigiditatem.

1. Mor. Mu

2. Ge. an. 4

Aristot. Exit autem sanguis apertione osculorum in fundo ad Cotyledones veluti à victima, duarum heminarum mensura ad duos vel tres dies. Longius aut breuius tempus morbosum aut sterile. Morbosæ quibus ultra quatuor dies, & copiosiora exeunt, nam hæc attenuantur. Steriles, quæ intra tres dies, & exigua exeunt. hæc crassæ bene coloratæ, viriles. At mensura prædicta hodie ob corporis par-

1. Mor. mu

paruitatem non respondet. Retentionis causa est aut totius corporis natura, aut vitium seu totius, seu alicuius partis: aut tandem Vteri vitium. Aet. Natura corporis calida & sicca, virilis seu abortu, seu per labores comparata caret menstruis, quia totum sanguinem absumit. Item quæ abundant multa pinguedine, pauci sanguinis sunt, quia tendit in pinguedinem. Et quæ graciles ac valde extenuatæ sunt ex morbo, non habent sanguinem superfluum pro menstruis: siue id contingat vitio totius, siue alicuius partis. Vteri autem vitia impediencia menstruam purgationem, sunt: Os vteri occlusum aut distortum, aut aliqua pars pudendi contracta: Obnoxia, quibus os angustum, aut quæ cervicem habent à pudendo remotam: item quæ coitu non vtun-

246 *Artis Medicae lib. 8.*

tur & virgines . Mulier enim
quæ non peperit , grauius &
citius è Mensibus ægrotat ,
quam quæ peperit , quia coi-
tus , & partus omnia aperit .
Ex retentione si in tertio men-
se non prodierint , iam suffo-
catio aduenit , febris & hor-
ror , Lumborum dolor . Sup-
purantur enim cum à febre
fuerint exusti . Si exeat suppu-
ratio ad pudendum , aut ad
Inguen , aut supra , melius ha-
bet , sed sterilis fit . Si in
quarto mense adhuc retinean-
tur , dictæ affectiones augen-
tur , maxime in tempore Men-
sium , deinde minus , vt sæpe
à dolore libera videatur . Uri-
na crassa , Venter durus ma-
gis quam prius , Dentium fre-
mitus , Cibi auersatio , Vigi-
liæ . Si curetur , euadet : In
quinto mense , si non multi
descenderint , dolor fortior
accidit . In Sexto iam incur-
abilis est , & iuxta priora ma-
gis

De Morb. Genit. 247

gis dolebit . Amplius anxia
alias atque alias iactabit seip
sam, animi deliquium, Vomi
tus pituitæ, sitis fortis, quia
exuritur Vēter præ copia san
guinis. Dolor ad tactum, ma
xime ad pectinem, Febris,
Vteri murmuratio . Neque
Vrina, neque excrementa de
scendunt. Dolor spinæ, dorsi.
tandem ducit ad mortem ex
Vteri inflammatione, aut ma
teria translata ad partes prin
cipes . Aliquando perdurat
ad octo menses . Eadem con
tingunt, si pauciores pro
deant sed tardius apparent
morbi: Signa . Si lac in mam
mis habet, quæ neque præ
gnans est, neque peperit, men
strua defecerunt. Itē podagra 6. Aph. 29
laboret. Gal. hæc signa affert. 6. lo. af. 5.
Grauitas totius, fastidium,
inappetentia, horror inæ
qualis, os Vteri clausum, cū
duritie, inclinatio, commu
nicatio doloris ad Coxam.

1 4 Cum

Cum longiori tempore, tumores in Ilibus, suppurationes, dolor Lumborum, colli, sincipitis, ad radices oculorum, Febres ardentes, Urinae nigricantes cum rubra sanie instar aquae loturae carnis cum fuligine: aliquando stillicidium, suppressio: Oriri ex toto corpore aut vitio aliarum partium, signa partim patent ex dictis, partim sumenda ex

1. Mo. Mu. earum morbis. Ex vitio autem Vteri: Si menses occultentur, aut vix exire possint cum dolore, significat os Vteri occlusum aut distortum, aut aliquod huiusmodi: quae etiam tactu dignosci possunt. Prognostica. Mēstruis deficientibus, sanguis è naribus bonū.

1. Aph. 33

Curatio retentionis Menstruorum. Cap. 4.

2. Mo. mu.

SI totum corpus in causa sit, prius illi prospiciendum,

dum, quacumque purgatione egeat: Postea ad Vterum. Si solus Vterus, statim eius cura auspicanda est. Viragines non tangendæ: neq; quibus Vterus cicatricem magnā contraxerit, aut scirrum, aut alias incurabiles affectiones: His conueniunt deriuationes ad alias partes. Huius gratia in libro de Superfoetatione inquit. Mulier, quæ facile concipiebat, si prægnans esse desijt: bis per annum à manibus & cruribus Venam secari finat, scilicet ne recurrat in partes principes, sed effugiat morbos. In extenuatis prius reficiendæ, & quæ inanitæ sunt, prius replendæ. Si menstrua in alias partes recurrant, vt per sanguinis fluxum è naribus, vomitu, Hæmorrhoidibus, Suppurationibus, Alui fluxu, sudoribus: cū cesserit fluxus resectis viribus: si non succedant Menstrua.

l 3 Cu-

- Cucurbitulā retro ad mol-
litudinem affigite, & sangui-
nem plurimum detrahe pro
De Steril. viribus. In initio autē si vires
robustæ, & nihil prohibeat,
Vena secanda est: nam reme-
Vig.m. dium ad plenitudinem totius,
ne recurrat in partem prin-
cipem, libro de Sterilibus ex
San. mi. utroque brachio. Aet. ex cu-
18. bito & talo. Gal. In crure
non in cubito, quia in cubi-
to comprimit menstruas pur-
gationes, retrahens ad supe-
riores partes. An in plenitu-
dine totius non tutum est de-
ruiare ad partes vicinas, ne
humores crassi impingāt ma-
San. mi. gis? Bene Paul. Cum præte-
19. rierit tempus purgationis per
decem dies, Venam secare &
sanguinem extrahere, idest in
cubito: Iterum extrahere ex
talo, cum in tempore purga-
tionis nihil momentaneum
exierit. Gal. anteuertit tri-
bus quatuorve diebus ante
cir-

De Morb. Genit. 251

circuitum incisa Vena cruris,
aut scarificatis talis in vno
pede paulum extrahendo, po-
stero die idem repetit in alte-
ro, vt menses promoueantur.
Vt tamen istis diebus & ante
eos quatuor aut quinque ex-
tenuantem victum procures,
& potiones prouocantes adhi-
beas ex Nepita, Pulegio, in
Melicrato coctis, aut in te-
nuissimum Pollinem insper-
sis. Tempus commodissimum
a balneo statim. Valentiora
etiam exhibenda. Sabina Di-
ctamum: Crithmum in Vino
Thedaceo Hipp. eodem tem-
pore conuenit purgatio ex
Hiera. Paul. pro Venæ sectio-
ne purgat vehementius ex
Hiera cum Colocyntide, nisi
febris adsit. Deinde reficit ci-
bis liquidis, Oleribus, Pesci-
bus saxatilibus, Auiculis, La-
cte. Postea exercitationes in-
feriorum partium imperat.
Vinum Absinthite per totum

252 *Artis Medicae lib. 8.*

morbi decursum. Si Menses non prodeant, iterum purgat post septem dies. Postea rubificatorium adhibet inferiori Ventri, Lumbis, & Feminibus ex sinapi cum pane cocto, aut Caricis, & mollientibus. Sed melius Hipp. Pessis mollitorijs, & attractorijs, & suffitibus utitur, ut ad Vterum intra alliciatur sanguis, non auertatur. Sed hæc remedia commodius inferius explicabuntur in morbis Vteri. Hic solum proponuntur, quæ sanguinem ad Vterum alliciunt. Victus sit non admodum extenuans, ne diffletur, nec valde crassus, ne obstruat, & excretionem impediat. Paulus inquit: Lavandum est circa statum menstruale tempus, ac præsumatur potui Sesamum, aut Capitatum Porrum cum Pipere & Ruta simul incocta. Potio autem ex Passlo Cretico erit
hemi-

hemina mensura, hæc enim
deambulationibus menstrua
dimouet. Cibus sit Lolligi-
nes, Sepiæ, Polypodes, & quæ
eius sunt generis, & eorum
iura: nam sanguinem proprie
commouent, & testacea: In-
fernæ partes vinculis con-
stringantur tribus aut qua-
tuor diebus. Cum vero instat
purgationis tempus, tollatur
deligatura, & bibat Myrrhæ
fabæ magnitudine, aut Ca-
storium ex Passo. Intempe-
stium igitur est cum non
instant menstrua, prouoca-
re, aut potionibus, aut sangui-
nis missione ex propinquis.
Neque nocet Venam brachij
secare cum tempus mēstruo-
rum distat. Quod si necesse sit
ob vim morbi Venam secare,
instantibus purgationibus,
vinculo adhibito ad crura,
secare licet in brachio, vt po-
stea soluto vinculo scarificen-
tur tali.

De

De Sterilitate. Cap. 5.

6. Ep. 8.

Sterilitas est, priuatio potentia concipiendi in quibus & quando est aptitudo secundum naturam. Non ante pubertatem, nec in senectute, non in ijs quæ viragines sunt, vt inter viros Eunuchi. Traduntur enim ab Hipp. duæ mulieres: quæ cum antea fecundæ essent, postea viragines factæ sunt, mensuris deficientibus, quibus nulla ratione, Menses reuocari potuerunt, vnde non post multum tempus interierunt. In quibus igitur inest concipiendi potentia, non tamen concipiunt, causa quærenda est: hac enim ablata, foecunda erit mulier. Vna ex causis est, Non recipere genituram viri: Altera, non continere: Tertia illam corrumpere. Quarta defectus materia. Non recipit vel quia occlu-

De Ster.

De Morb. Genit. 255

occlusum sit os Vteri, aut
Ceruix, vel compressum, ut
contingit in valde pinguibus,
comprimitur enim os Vteri *s. Aph. 46*
ab Omēto. Non recipit etiā,
cui os vteri distortum est
aut auersum à pudendo. Auer-
titur autem longius à puden-
do Aet. cum mulier non con-
cupiscit, nec amat virum. .
Cum enim valde concupiscit,
os Vteri occurrit, & glandem
viri amplectitur, etiam si bre-
uius sit virile membrum, mo-
uetur enim vterus deorsum.
Amplius durities receptio- *Nat. m.*
nem prohibet: nam prohibet
motum attractionis. Attra-
hi enim semē ab Vtero testa-
tur Gal. Imbecillitas quoque *3. fa. na. 13*
attractionis est in superfluis
purgationibus Vteri, ex mor-
bo, & cum nimis hians est,
aut prolapsus. Non continet
autē genituram ob læuorem,
aut ex cicatrice magna, aut
ob humiditatem, ut contin-
git

git in fluxu albo, & aquoso,
Nat. mu. & ubi Cotyledones sunt pitui
5. Aph. 45 ta pleni, in his enim est imbe-
cillitas contentiua: & in flu-
xu superfluo & hiatu. Cor-
rumpitur autem genitura à
sanguine morbofo, ab vlcere
purulento. Extinguitur enim
calor innatus geniturae à mè-
struis derelictis incalescenti-
bus aut refrigerantibus extra
Venas. Deficit materia in
defectu menftruoꝝ aut pau-
citae: in ijs quæ multum ex-
5. Aph. 44 tenuatae sunt: imo & pinguioribus,
quia excrementum
menftruoꝝ tendit in pin-
guedinem. Videtur tamen
1. Ge. an. Aristoteles cōcedere aliquas
18. mulieres fine menftrua pur-
gatione concipere. Materia
1. Ge. an. tamen hæc neceffaria est, in-
4. quit enim. Quibus mulieri-
bus nihil foras emittitur,
quoniam non multum excre-
menti inutilis continetur, ijs
tantundem quod colligitur

De Morb. Genit. 357

in vtero est, quantum ijs quæ
foras emittūt, remanet, quod
maris facultas constituit. Vi-
deretur etiam & seminis mu-
lieris defectus conceptionem
tollere, si concurrat ad con-
ceptum constituendum: vt
traditur in libro de natura
Pueri. At nulla fit mentio hu-
ius causæ in libro de Sterili-
bus, nec in libris legitimis
Hippocratis: quasi non sit ne-
cessarium: quod comprobat
Arist. Galenus tamen ab Ari-
stotele dissentiens testatur ca-
strari à quibusdam suis femi-
nas. Reducit autem Hippo-
crates in Aphorismis omnes
causas ad 4. intemperies sim-
plices, & 4. compositas. his
verbis: Quæcunque frigidos
& spissos Vteros habent, non
conciunt. Quæcunque præ-
humidos, non concipiunt:
extinguitur enim in eis geni-
tura. Quæcunque siccos ma-
gis & adurentes, nam ex de-
fectu

1. Ge. 47.

19.

2. Sem. 4.

5. Aph. 62

Ae. aq. &

lo. in fine.

fectu alimenti corrumpitur semen. Quæcunque vero ex utrisque mediocrem habent temperaturam, eæ fœcundæ sunt. Gal. ex Platone in Theeteto, inquit: Intemperaturas excedentes infœcundos reddere tum mulieres, tum viros. Et Arist. Mulieres corrigi inuicem contrarijs; si mulier frigidior coeat cum viro calidiori, fœcundam fore: Si cum viro frigidiori, infœcundam: & è conuerso. Idem in altera contrarietate humidi, & ficci. Signa sterilitatis mulieris experimento Hipp. Mulierem pannis circumtectam desubter suffias idest Thure, Myrrha aut Styrace. Si odor videatur per corpus ire ad nares & os, nō est sterilis ex se ipsa. Nititur Gal. ostendere in qualibet intemperie verum esse. Aliud. Netopum modicum lana exceptum subdito, Si mane os oleat, concipiet, fin

4. Ge. 47. 2

3. Aph. 59

3. Aph. 62

de Ster. in
prin.

De Morb. Genit. 259

sin minus, non. Iterum paulo post & de superfœtatione. Post purgationes lauetur, caput tricetur, nihil illinatur: obuoluantur capilli linteo inodoro. Subdat Galbanum remollitum igne, quiescat. Mane eius caput denudatum quis olfaciat: hæc faciat à cibis abstinens. Si redolet, fœcunda reddita est: Sterili nūquam olet neque prægnaviti. Idem facit caput Allij derasum subditum. Si ex subditis non valde fortibus excitantur dolores articulorum, dentium stridor, Vertigo, oscitatio, spes est fertilitatis. Portio anisi triti ex aqua ante somnum, si pruritus facit circa vmbilicum, fœcunda, sin minus, non. Galenus vsitata esse huiusmodi experimenta apud Reges & Sacerdotes ob successionem, vtrum ex muliere an ex viro infœcunditas contingat. Sed ad certiores scien-

s. Aph. 32.

240 *Artis Medicae lib. 8.*

scientiam explorandi affectus
mulierum, visu, tactu, inter-
rogatione per interpretem,
obstetricem propter verecun-
diam. Quæ ex concubitu non
conciunt, interrogandæ,
an Menses prodeant, an non.

1. Mo. M. Si prodeant sani arguit duri-
tiem. An purulenti, aut fri-
gidi. Sic cognoscitur, an ex
defectu vel prauitate. An
statim exeat genitura, an po-
stera die, aut tertia, aut se-
xta, aut septima. Ex his di-
gnoscuntur Vteri affectus. Si
prodeant Menses secundum
naturam, & non concipiant,
vitium est in Vtero, impedi-
ta receptio, quia non attra-
hitur semen, vel ob duritiem,
vel quia auertitur in coitu os
Vteri. Si exeant morbofi, cor-
rumpitur genitura. Si statim
exeat, signum non recipi in-
tra os ob occlusionem, aut
distortionem, aut auersionem:
duritiem imbecillitatem At-

tra-

De Morb. Genit. 261

tractricis. Multa ex his cognoscuntur tactu intromisso digito ab obstetrice. ut oclusio, distortio, durities, cicatrix, hiatus. Visu cognoscuntur multum extenuata & prapingues. Si postridie exeat, aut tertia, Vterus prae-humectatus est, & semē cluitur. Si sexta, aut septima, semen computrescit, & putrefactum exit. Si ultra septimā asseruetur, iam conceptus est, cuius exitus Abortus dicitur. Quibus auersio aut oclusio, Menses non prodeunt, aut violenter, si morbus coegerit pro more conuerti. Sed post purgationem auertitur. Quibus os parum distortum, aut recens conclusum, prodeunt quidem Menses, sed violēter & paulatim per multos dies. Exeuntia ostendunt sanguinis prauitatem, & pus, & humores. Menstruorum examen fit super duo lintea, vnum

262 *Artis Medice lib.8.*

vnum nocturnum, alterum
diurnum. Siccentur super ci-
nerem obscuro loco: postea
lauentur. Macula muccosa,
1. Mo. Mu ex pituita est, fulua & subli-
uida ex bile, falsugine. Vel
Ster. siccentur super arenam: nam
pallidus color in biliosa, muc-
cosus in pituitosa. Prognosti-
6. Ep. 8. ca. Vitia ab ortu insanabi-
lia: & quæ confirmata sunt,
vt Scirrus, Cicatrix. Idem si
factæ sunt viragines.

Curatio Sterilitatis.

Cap. 6.

Superf. **A**Vferendæ Sterilitatis
causæ, scilicet vitia to-
tius, & Vteri, deinde reme-
dia adhibenda ad fœcundita-
tem præstādā. Totius vitia,
nimia pinguedo, nimia exte-
nuatio, Cacochymia. Hipp.
inquit: Mulier præter natu-
ram crassa & pinguis, & pi-
uita repleta non concipit
hoc

hoc tempore, quæ verò ex natura talis est, horum gratia concipit, si non aliud quippiam impediat. Impedit Omēti crassitudo cōprimens Vteri os. defectus materiæ, quia transit in pinguedinem. breuitas virilis mēbri ob mulieris crassitudinem non pertingēs intimius, Aet. Scytharum *40. 29.* gens parum foecunda, ob vitam ociosam, ob pinguedinem, & humiditatem. Non continent semen: Menstrua diminuta, & intempestiua: os Vteri concluditur. Oportet igitur attenuare victu extenuante. Venam secare per annum ex manibus & cruribus, si nihil prodit. Purgare *1. Mo. 24. Ste.* deorsum pituitā, ad Vterum apponere quod purgat, ac flatum inducit. Paul. & Aet. Flatuosa in victu conuenire semen gignentia non siccantia. At obesorum extenuatio *14. Me. 15* apud Gal. fit victu calefaciente

te

264 *Artis Medice lib. 8.*

te & siccante, attenuante,
 exercitationibus, cursu velo-
 ci, inunctionibus digerenti-
 bus, balneis naturalibus, non
 cibus post Balneum, sed
 somnus aut quies ante cibū:
 medicamenta vrinam ducen-
 tia, Theriaca, Sinapi coctum:
 sumat ieiuna, & Vinū merum
 E. Mo. m. n. superbibat: Apponat Nitrum
 rubrum & Cuminum, & Resi-
 nam, Cornu Cerui vstum,
 Sal. dia. cum farina Hordei, & Vino.
 12. obsonia ex Sesamo, & dulcia-
 rijs: pingua sint: sic enim
 paucissimis saturabūtur (qui-
 dam codices legunt, non
 πύρα, idest pingua, sed πλείονα,
 idest plura) labor ante cibum:
 adhuc anhelantibus offerre
 præpoto Vino diluto non
 admodum frigido: semel in
 die, sine Balneo: Stratum du-
 rum; nudum quantum fieri
 potest, deambulare. Sed mul-
 ta ex his nō probat Gal. Cor-
 pora extenuata reficienda
 sunt

De Morb. Genit. 265

sunt cibus incrassantibus: Vi-
no crasso: Exercitationes pau^{14. Met. 16}
ca, Frictiones moderata: Inu^{6. Tu. fa. 8}
ctio, Picatio: Balnea aquæ
dulcis post cibum. Ieiuni non ^{Sal. dia 14}
laborent, sæpius in die cibum
sumant. Lac summo mane
primo Asininum, postea
transferatur ad crassiora. Bo-
nus habitus, vt corpus con-
tractum & iusta mole conser-
uetur, paucis Balneis vtatur,
exercitatione multa & lenta.
Cacochymū purgatione eget ^{I. Mo. mu.}
sursum vel deorsum. Sursum
si ex bile, si distillatio à ca-
pite: vomitus etiam cum in-
stant Menses. deorsum cum
etiā Vterus affectus est cum
toto. Præmittendum fomen-
tum, vbi per inferiora tātum,
Elleborum, Scamonium, Pe- ^{Superf.}
plirium. Postea lac Asinæ: ^{I. Mo. mu.}
nam perficit purgationem, &
corrigit noxam medicamēti.
Hodie mitioribus vtimur, ad
Bilem, Rhabbaro, Mirabo-
m lanis

266 *Artis Medicae lib. 8.*

lanis Citrinis. Sy. rosato solutiuo, Electuario rosato. Ad Pituitam, Agaricum, Diaphnicon, Mel rosatum solutiuum: Ad Melanch. Sena, Polypodium, Epithymum, Confectio Hamech, Mirabolani, Tudi.

3. Aph. 62

Ad totius intemperiem frigidam ex Pau. & Aet. Signa. Menstruorum retentio ob angustiam vasorum. Stupor quidam in Ventre inferiori, Lumbis, & Cruribus. Veneris modica appetentia, Victus frigidus & crassus. Curatur purgatione Pituitæ. Conuenit calefactio totius & Vteri, leuitur infantia Pau. ad dilatandum & incitandum, Vinum calidum modice sumptum, Eruca, Horminum, Erysimum, non Ruta, nec Calamentum. sed Castorium, Cuminum, Anisum, Pulegiū, Iuniperi fructus, Piper. Quæ Menses moueant cum propin qui

qui sunt: olera odorata & acria, Scandyx, Crithmum, Fœniculum, Apium Smyrnum: Sed Apium Plinio sterilitatem facit. Fomenta & suffitus calefacientes ex decocto Saluæ, Artemisiæ, Rutæ, Squinanthi, Cyperi, Pulegij, Seminum odoratorum ad regionem infra Umbilicum spōgij, in seffu & per arundinem intra pudendum. Pessi ex Myrrha, Ruta, Galbano, Castorio, Exercitationes.

Ad caliditatem, cuius signa. Totum corpus calidius, Menses pauci, laboriosi, exulcerantes: Salacitas. Refrigerandum victu ex oleribus, Lactuca, Cicorio, Acetosa, Malua, Blito, Atriplice, Cucurbita, Cucumis, Pepon, Portulaca. Vinum album tenue, aquosius, somnus lōgior, Balnea aquæ dulcis. Infra Umbilicum succus Solani, Umbilici Veneris cum Rosaceo ex

lana.

268 *Artis Medicae lib. 8.*

lana. Cataplasma ex Mercuriali Lumbis & pectini.

Ad humidam intemperiem, cuius signa: menstrua multa & tenuia, humiditas in coitu, victus exsiccans, labores, Fricationes superiorum, Vomitus. Ablutio Vteri ex decocto Lentisci, Myrthorum, Rosarum, Rhus, Balauftia, Rubi teneri ramuli, Galla. Purgato prius toto corpore, ne astrictione recurrat humor ad principia, Aet. Ad siccum cuius signa: Gracilitas, Menses pauci: Victus humectans. Compositæ intemperaturæ patent ex simplicibus.

Localia remedia ad Vteri occlusionem & distortionem. Cap. 7.

AD affectus Vteri prohibentes ingressum seminis, Occlusio, si ob membrum fiat ante os, quæ digito discernitur.

Nat. mu.

De Morb. Genit. 269

nitur. Subditiū exterens ex
flore aris, melle, & Resina lin-
teo exceptis, filo appenso,
penitissime inditum. Pessum
vocat Paulus. Postea eluere
ex astringenti Vino incocto
Myrtho. Si sola astrictio ad-
sit, ob quam Menses non
prodeunt: indantur aperien-
tia. Formetur glans ex linteo
tenuissimo melle imbuto, &
fici succo tincto, & appona-
tur, deinde amplius intru-
datur. Vbi defluxerit aqua,
abluatur ex Vino & Oleo: &
cum viro dormiat, præsum-
pto Pulegio in Vino Cedrato.
Aliud ex Resina, melle, Cu-
mino, nitro rubro. Si ad sit
durities, nam aliquando gros-
sum æmulatur, & digitum nō
admittit. Post totius purga-
tionem deorsum, lauetur Mul-
sa calida, & apponantur emol-
lientia, ex pinguedine Ana-
tis, oleo Amygdalarum dul-
cium, Butyro, postea specil-
m 3 lum

270 *Artis Medicae lib. 8.*

lum intromittatur, vel digitus: & calidam asperge. Cum fuerit emollitum, apponantur, quæ sanguinem purgant. Quàm diù durum est os Vteri, nihil acre indatur, ne exulceret. nam penitus steriles fiunt. Crithmi cortex in Vino bibendus, ut sanguis per Vterum feratur. Si asperitas adiuncta veluti arena, post emollitionem & apertionem, exterere oportet ex Cyclamino, sale, ficu cruda, melle formata glande: deinde fomento adhibito purgatoria infundere. Edat Mercurialem & Brassicas, & ius sorbeat, lauetur aqua calida. Fomentum per arundinem transmissio fumo in Vterum ex Vino iucundissimo aqua temperato incocto Fœniculi semine, & radice, & adiecto oleo Rosaceo. Purgatorium molliens ex Caricis decoctis abiectis granulis cū Rosaceo. Aliud.
Me.

De Morb. Genit. 271

Medulla Bouis, aut Cerui, pin-
guedo Anseris magnitudine
fabæ affuso Rosaceo & lacte
muliebri, quo illinatur os.

Ad distorsionem directio. *2. Mo. mn.*

Distorsionis causa est, Vteri *6. lo. aff.*

tensio ob plenitudinem non *5.*

erūpentibus menstruis, nunc

æqualiter, nunc inæqualiter,

nunc sursum, nunc deorsum,

ad dextra, ad sinistra, ante,

retro. Quibuscunque Vterus *2. Mo. mn.*

ad coxendicem, si non breui

discedat, & rursus in suum

locum redeat, resiccatur ad

coxendicem: & necessarium

est osculum auersum esse, &

in supernis detineri. Cum

auersum est, conclusum esse:

vnde & durum fieri ob tē-
sionem. Conueniunt igitur re-

laxantia, vt os contractum

conuertatur inferius. Purga-

to toto corpore, si inde mor-

bus pendeat: Vterum foue-

re fumigio per arundinem

diutius, ex Allio confuso in

m 4 aqua

272 *Artis Medicæ lib. 8.*

aqua & oleo Phocæ, idest Vituli marini. Post fomentum lauetur toto corpore, & magis infideat Lumbis, & infra Umbilicum, duobus diebus, si ferat, sin, intermittatur dies. Hoc fomento inflatur Vterus & dirigitur, sed os magis auertitur, forte ob insuauitatem.

Postea per quinque dies, aut plures, singulis diebus, si ferre possit, fomentum simili modo ex radice Foeniculi in aqua, deinde lauetur, quo paulatim os conuertatur, & propinquissime adducatur. Tunc imponantur subdititia ex Thēda pinguiſſima illita ex oleo Amygdalarum dulcium. Eius longitudo sit sex digitorum indicis crassitudine gracilior, assidue ad extremum: Fiant alia minora. Indatur paulatim pars tenuior, & conseruetur, ne excidat: Singulis diebus penitus intro-

mit-

De Morb. Genit. 273

mittatur : donec intra os penetret quatuor digitis . Cum vnum eximitur , statim alterum indatur , antequam con-
niueat . Postea ex Plumbo parentur fistulæ eadem figura , & magnitudine qua Thædæ , vt per fistulam egrediantur purgamenta , expleantur fistulæ adipe ouillo , & indantur confestim post Thædam . Si Plumbum mordeat , reuertatur ad Thædam , & iterum Plūbum intromittatur aqua refrigeratum . Saltem noctu Plumbea teneatur . Postea purgantibus vtatur ex Resina magnitudine Oliuæ subdita oleo Rosaceo tincta . Nunc mollitorijs vtatur ex pinguedine & oleo , si inflammatio adsit , ante & post subditicia , & lauetur aqua calida . Si non succedat apertio , iterum reuertatur ad suffimenta .

m s Re-

*Remedia ad hiantem Vte-
rum, & superfluam pur-
gationem, & ulce-
ra. Cap. 8.*

Cum Vterus magis hiat,
quam oportet, Menses
plures fiunt, & deteriores, &
humidiores: unde imbecilli-
tas oritur, Genituram non
attrahit, nec continet. Cor-
ripit hic morbus à fluxu fan-
guinis, & cum Menses sup-
pressi, derepente eruperint,
Vel si quid in muliere fufum
fuerit, & corruptum compu-
truerit. Aliquando ex partu,
aliquando aliter. Ad putre-
dinem sequitur febris & ri-
gor, & dolor ad imum Ven-
trem, & Lumbos, & laterum
mollitudinem: morbus letha-
lis. Si diutius protraxerit,
prolabitur Vterus. Huic, cum
dolor maxime habuerit, te-
pefactoria apponito, & cum

2. *u. mu.*
2. *Mo. mu.*

re-

De Morb. Genit. 275

remiserit, Vterum foueto, & Pharmacon infra purgans bibendum dato: alibi inquit, supra ad reuellendum. Et quæ non mordeant, subdito: & post subditita purgatoria, cū acerbis colluito, & quam minimum lauato: Cibis vtatur siccissimis. Si ab his non sanatur, Pharmacum bibat, quod fursum & deorsum purget: deinde ad victum siccantem redeat: Astringentia ex decocto Myrthi, aut Rubi, Oleæ, Rosarum, Florum Labruscæ, foliorum Vitis in aqua. Partes circa Vmbilicum cum spongijs fouendæ: Inseffus in frigida & ablutio. Suffimenta siccantia, graueolentia: ad nares autem beneolentia, suffitus astringentes ex Galla, Bitumine, Pice, Oleæ folia sicca, & oleo subacta super carbones. Optimum auxilium sitis, frequens vomitus, abstinētia Balneorum.

m 6 Ea-

276 *Artis Medicae. lib. 8.*

Eadem remedia ad læuorem
ex humiditate. Victus ex ma-
rinis magis: ex Polypo: absti-
nere à pinguibus. Aluus red-
datur lubrica, ne egeat cona-
tu, quo Vterus prolabitur, ex

1. Mo. m. n. Mercuriali. Si oriantur vlce-
ra, vt contingit ex tenuibus
& saniosis humoribus, aliquā
do ex Abortu, vnde purulen-
ta & compacta exeunt, cito
curanda. Nam si negligan-
tur, cito augescunt, & pu-
trescent, quia in tenero loco.
Si inflammentur, multa gra-
ueolentia & purulenta exeūt,
velut aqua de carnibus; fe-
bris & dolor ingens aliquan-
do ad scapulas pertingens.
Prohibere oportet inflamma-
tionem, repurgare, explere,
ducere ad cicatricem. Aqua
in potu, Vinum minime, cibus
paucus. Lac Asininum co-
ctum ad mitigandam mor-
dacitatem, superbibere aquā,
si dolor capitis adsit. Capri-
num

num ad astringendum: Buba-
lum ad replendum, Serum
coctum ad purgandum post
medicamenta purgantia. Vte-
rum colluere ad pus abster-
gendum ex grossis, ex face
Vini combusta, Brassicæ deco-
cto, Butyro ad mitigandum:
Malicorio ad cicatricem:
Rosarum flore. Arida: Li-
thargyrus, Squama æris, Ae-
rugo, Thus, Myrrha, Cro-
cū, Myrthilli, Labruscæ flos,
Galla, Alumen combustum
coquantur contrita in Vino
dulci diluto ad mellis crassi-
tiem, quo bis in die illinan-
tur, prius abluta ex aqua te-
pida incocta Salvia, Hedera.
Mitigatorium morsus: Caro *1. Mo. Mo*
Rubala pinguedine illita in-
tromissa, additis pulueribus
siccantibus varijs.

Ad vlcus inflammatum,
Myrrha, adeps Anserinus ce-
ra alba, Thus, pili Leporis, *Nat. nu*
qui sub Ventre ex lana mol-
lissi.

2. Meimul. lissima. Aliud. Myrthi bac-
cas in Vino coctas ad colluē-
dum, & Melilotum apponat.
Mali Punici dulcis putamina
in Vino coquito, in quo dilue
Myrrham & Resinam: & lin-
teum intinctum impone. Ad
callum ex vlcerebus relictū,
qui tactu discernitur durus,
eximendus pennis minutissi-
mis in fasciculum deligatis
Rosaceo illitis: sursū & deor-
sum sæpius moto specillo do-
Ste. nec promineat: tunc volse-
fella placide extrahatur. Por-
rò cum prædicti affectus supra
os Vteri fuerint, inanis est
omnis labor fœcunditatis gra-
tia, redduntur enim penitus
2. M. 3. 4. steriles. Sed si in ceruice fue-
rint, nisi auferantur, impe-
diunt conceptionem.

*Remedia ad conceptum præ-
standum. Cap. 9.*

A Blatis Vteri impedimē-
tis ad conceptum præ-
stan-

standum præparationes requi-
runtur tum in viro tum in
muliere, & tempora oportu-
na. Vterus sit mundus, at
non vehementer astrictus,
ne vasa obcæcata Genituram
non apprehendant: Sit qui-
dem siccus at non densus sed
mollis. Nam medicamenta
vehementius siccantia, quæ
aliquando ad sistendos fluo-
res muliebres adhibentur in
potu, aut suffumigijs, vt Ru-
bigo ferri apud Diosc. con-
ceptum adimit. Idem ferè fa-
cit Scorix ignitæ extinctio in
suffitu, quamuis imbecillius,
aut similia medicamenta in
Pessis adhibita. Aer. Conue-
niunt igitur post purgationem
totius & Vteri, modice sic-
cantia, abstergentia, & emol-
lientia: qualis est Cedria cum
adipe bubulo in pello: Suffi-
tus ex baccis ac folijs viridi-
bus Lauri contusis, Thure,
Myrrha, Artemisia, Aniso.
adi-

adipe & cera simul contusis:

Castorio, Asinino stercore,

Allio, Styrace adipe Suillo.

Superf.

Nam his os Vteri conuertitur,

& hiat. Mollientia: Pin-

guedines, seuum Caprinum,

Galbanum, semen Lini, Me-

lanthium cum adipe Anseri-

no linteo exceptū subditum.

Pulegium siccū in linteo sub-

ditum, & in potu. In calidio-

ribus autem Lac, succus Ma-

li Punici dulcis cum Refina &

melle subditus. Mandragoræ

i. Mor. mu

radix: succus Mandragoræ

& Cucumeris siluestris cum

Lacte muliebri. subdititium,

Nat. mu.

efficax. Si mulier diu non

concepit, Mensibus apparen-

tibus tertia aut quarta die

Alumen tritum vnguento di-

lutum lana exceptum appo-

nito per tres dies: Postea Fel-

Bouis dera sum oleo subactū,

linteo exceptū apponito per

tres dies. Sequenti die cum

viro coeat. hoc enim præce-

dit

De Morb. Genit. 281

dit astrictio, ne semen elua-
tur, sequitur apertio vt susci-
piat. Assumat in cibo & potu
quæ magis expetit. Tempus *superf.*
oportunum est Vernal. Mu-
lier leiuna, Vir non sit ebrius,
neque Vinum album bibat,
sed quod fortissimum est ac
meracissimum: itemq; edu-
lia fortissima: non lauet Ca-
lida: Robustus sit, & sanus,
abstineat à cibis non confe-
rentibus ad rem.

Virum adire post adhibi *i. Mo. M.*
tam curationem, desinētibus,
aut inchoantibus Mensibus:
optimum autem est vbi quie-
uerint: dies enim hi oportu-
nissimi ad conceptum. Quod
si non successerit, reliquis be-
ne habentibus, nihil prohi-
bet in alijs diebus coire. Nā
exercitatione alacriores fiūt,
& venulæ magis laxantur.
Additur in libro de Superfec-
tatione. Si marem generare
voluerit, Mensibus desinen-
tibus

tibus aut defectis misceatur :
& quam maxime impellat,
donec emittat semen, obliget
autem testiculum sinistrum.

Ad femellam autem cum
plurimi Menses prodierint,
dum adhuc eunt, & obliget
testiculum dextrum. Sed hæc
4. *Ge. an. 1* sententiam reprobant Aristot.
quam tribuit Leophani. Præ-
terea Auic. testatur, leproso
nasci, si menstruata coeat. Ut
autem auidius Vterus semen
fascipiat, aiunt Zibettum
glandi illitum in coitu volu-
ptatem mulieri adaugere,
vnde alacrius semē admittit.

*De signis conceptus, & re-
gimine. Cap. 10.*

Signum concepisse non flu-
xisse Genituram vsque ad
septimam diem. Nam in se-
ptem diebus Genitura habet,
quæcunque corpus habere
debet. lib. de Principijs. Sed
oppo-

De Morb. Genit. 283

oppositum videtur in lib. de
Natura pueri. Die sexta re-
perta est Genitura à muliere
per saltum exclusa instar al-
buminis oui tenui pellicula
inclusi. Præterea masculū in
30. diebus perfici, feminam
in 42. An testatur Arist. prius
fieri veluti delineationem, po-
stea perfici? Delineationem
quandam vidisse testatur in
die sexta auctor libri de Na-
tura Pueri.

2. Ge. an.

4.

Idem testatur Hipp. si Ge-
nitura exeat post septimam
diem, Abortum esse. Alte-
rum signum est, si tempore
solito cessent purgationes, ne-
que febris superueniat, neque
rigor, & fastidia incidant: iu-
dica in Vtero habere. Gal.
fastidia fieri ob læsionem oris
Ventriculi vt in Pica: contin-
gere possunt propter vitiosos
humores in toto corpore, at
tunc febris & horror aderit:
non signum est concepisse. Si
non

1. Mor. Mu

5. Aph. 61

non ex alio cognoscas, ex hoc.* Oculi distracti, cauiore, eorum candidum liuidius apparet. Maculam solarem in vultu habent, Vinum odio habent, & cibos auersantur, morsus Cordis, & frequenter saliuam expuunt. Ex-

5. Aph. 41

perimentum. Aquam mulsam dormituræ da: si Alui tormina patitur, concepit, si nō: non concepit. Aliud. Mel & Anisum tenuissime tritum ex aqua bibat, & superdormiat.

Superf.

Si tormen circa Umbilicum, prægnans est, alioqui nequaquam. Ex subdititijs non valde fortibus dolores in articulis, stridor dentium, distentio membrorum & oscitatio, concepisse spes est. Māma maior est qua parte foetus existit; oculus quoq; maior & splendidior. Foetus maris in dextris magis, feminae in sinistris. Quæ marem concepit, bene colorata est:

5. Aph. 48

42.

Ster.

quæ

De Morb. Genit. 285

quæ feminam, male. Quæ maculam solarem in facie habet, feminam. Papillæ sursum cōuersæ masculum, deorsum feminam. Lac super folia emulctum, si condensetur, mas; si diffundatur, femina. Aetius. Cum Genituram acceperit, horror quidam & moderatus dolor circa pubē & Umbilicum. Os Vteri sine duritie occluditur, & sursum progreditur, siccum: languet Venus. Menses consueto tempore non apparent. Venæ pectoris virent, & Mammæ intumescūt, & in progressu Lac colligunt. Lac tertio vel quarto mense aduenit, cum foetus moueri incipit. Circa secundum mēsem salsa & acida appetunt præter cōsuetudinem. Aduenire solet Pica à secundo ad tertium mēsem in quibusdam: aliquando vsque ad quartū. Incipit vt plurimum circa 40. & nausea & vomitus.

Nat. pu.

1. Sy. ca. 7.

tus. Vrina ignita, rubens.

Ad foetum conseruandum: Vi-
ctus ratio sola, si quid non
contigerit præter naturam.

Cum concepisse cognouerit,
abstineat à Venere saltem vl-
tra nouem dies. Quæ absti-
net à coitu, facilius in partu

Superf.

liberabitur: Frequens coitus
impedit conceptum, aliquan-

I. Mo. mu.

do superfoetat. Si non exierit
Genitura, tenuis victus con-
uenit, per sex dies, melius
per septem. Motus vitet: non

lauet per omne tempus: De-
ambulatio in loco plano & leui.

Desideat super mollia. Dein-
de vsque ad dies 30. modera-

to victu vtatur ex pane, car-
nibus Palumbæ & similibus:

aut Marinis ijs quæ Aluū si-
stant, assis potius: Abstineat

ab oleribus: Caput non ma-
defaciat. Postea transeat ad

Sept. par.

consueta post primam Qua-
tragenariam, in qua magis

periculum est abortus. Si con-
tigit-

De Morb. Genit. 287

tigerit aliquid præter natu-
ram, mulierem Vtero geren- *s. Aph. 3.*
tem capi aliquo morbo acu- *55.*
to, lethale. Nam si cum febre,
perit foetus vi febris, aut ine-
dia. Quod si crebrius nutria-
nus, matrem occidemus vi-
ctu intempestiuo. Gal. Idem
in ceteris acutis sine febre.
Quæcunque Vtero gerentes à
febris corripuntur, & for-
titer calefiunt sine occasione
manifesta, difficulter pariunt,
aut ex Abortu periclitantur.
Gal. quia gravidæ non ferunt
remedia valida, & victum ex-
quisitum. Si perdurent pravi
humores usque ad partum,
difficulter parit: & valetudi-
narium. Ad bonum autem
partum requiritur virtus va-
lida vtriusque. Si gravidæ
Vterus patitur Erysipelas,
lethale. Remedia magna sunt, *s. Aph. 43*
venæ sectio, Purgatio, Ine-
dia, Aquæ frigida potus,
Ictio, vehementer alteran-
tia.

5. *Aph.* 31 *tia.* Venæ sectio . Sanguini
 misso ex Vena , abortit , &
 magis, si fœtus sit maior, Gal.
 ob defectum alimenti. Minus
 periculosum per Cucurbitu-
 las, aut Hirudines ex locis dis-
 stantibus ab Utero . Tutius
 in principio & ante quartum
 4. *Aph.* 1. *mens.* Purgatio. Gravidas
 5. *Aph.* 29 *purgare* turgente materia à
 quarto mense vsque ad 7. mi-
 nus has . Recentiores & se-
 niores vereri oportet . Gal.
 quia fœtus vt fructus nouel-
 lus & maturus à quocunque
 motu abscedit. Sed purgantia
 valida non solum motu , sed
 & qualitate venenosa corrū-
 punt fœtum . Eligenda igitur
 mitiora , & quæ astrictionem
 participant . Sy. rosatus so-
 lutius Tamarindi , Rhabar-
 barum , Mirabolani . Paul.
 Rhaponticum gravidis tum
 ante cibum, tum post exhibet
 Si Aluus plurimum profluat
 periculum est ne abortiat

Gal.

De Morb. Genit. 289

Gal. ob defectum alimenti
melius per superiora, ex aqua
tepida aut decocto Anethi,
non Clysteres. Victus tenuis
in primis mensibus non peri-
culosus, cum foetus modico
eget: imo iuuat ad continen-
dum foetum. In prima septi- *1. Mo. Mes.*
mana exquisitus: non solus
potus, sed sorbitiones vali-
diores. Aquæ frigida potus
non gelida, nec in magna
copia, ne extinguatur foetus.
Si lauare opus sit, pauca &
nō valde calida lauetur. Non
inustiones, & quæcunque
horrorem incutiant, aut mo-
tum quemcunque vehemen-
tem, præsertim intra Umbili-
cum & Crura. Non Opiata,
nec vehementer alterantia,
quia corrumpunt foetum. Si
ex remedio aut vi morbi A-
bortus contingat, adhuc gra-
uius laborat mulier. Nam
accessio fit alterius morbi ex
Vteri hiatu, aut inflamma-
n tio-

tione. Minus si partus sit naturalis: quia minus laceratur Vterus. Inquit Hipp. Abortus grauiores sunt, quam partus, quia sine violentia non fiunt: aut ex Pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititijs medicamentis, aut aliqua alia re. In his periculum, ne Vterus exulceretur, aut inflammetur, quod periculosum. Aberrant igitur, qui deditita opera tamquam remedium Abortum parant. Si prægnanti menstrua fluant singulis mensibus, tenuis redditur, & debilis: aliquando febris corripit, pallida, licet pauci exeant. Foetus quoque tenuis ac debilis redditur. Si purgationes eant, impossibile est foetum esse sanum. Gal. *s. Ap. 60* inquit: Si paucus semel aut bis excernatur, repertum est, foetum non pati. Sed si pari quantitate, & singulis mensibus exeat, impossibile

foe-

foetum sanum esse. non enim
attrahit. Exire autem in his
non ex fundo, sed ex ceruice.
Si curetur, melior euadit foe- *1. Mo. m. 11.*
tus & mulier. Si non curetur,
foetus corrumpitur, & ipsa
quoque periclitatur, ne mor-
bus fiat diuturnus, & ex Abor-
tu, ne Vterus magis hiet. Re-
media requiruntur astringen-
tia & repellentia. Stercus A-
sininum siccum, & Rubricam,
& Sepiæ testam terito, & lin-
teo illigata apponito. Aut
Pæoniæ semina nigra in Vino
diluta bibenda dato: Diosco-
rides laudat rubra. Si inter-
coeundum imus Venter do-
let, & sanguis recens exeat,
Lini semen tusum & Muscum
mollē, & adipem Anserinum
mixta, & molli lana excepta
apponito: nam mollit, con-
coquit, & exsiccat. Abstineat
à coitu. Si prægnanti distil-
latio à capite in Vêtrem fiat:
febris debilis corripit. Pal-
n a pita-

pitaciones quibusdam debiles, quæ redduntur acutæ: cibi fastidium, impotentia. Periculum est ne foetus corrumpatur. Ipsa quoque in periculum adducitur, si non curetur. Vbi effugerit, nempe fluido Ventre, statim constringere oportet. Nos commodè euacuabimus ex Rhabarbaro in substantia sumpto: Deinde astringentibus utemur, Saccharo rosaceo, Diacitonio, Bolo Armeno. Si dolor in Ventre aut Lumbis fuerit, formidare oportet, ne abruptis pelliculis foetus dejiciatur. Mitigandus fomentis ex aqua calida incocto Chamæmelo, Anetho, Clysteribus mollibus, purgatione leni, si opus sit.

Si cōtingat Vteri suffocatio, quod maxime fit, vbi mulier laborauerit, & cibum fastidit, Vtero calfacto, & pauciore humore foetui accedente, unde

De Morb. Genit. 293

de commotio ad Hepar & Præcordia. Vel cum à capite distillatio in Thoracé fit, unde respiratio tollitur, satis est motum sedare assumpto cibo, qui celeriter ad Vterum feratur. Vinum cum modico panis tosti. Nam reliqua remedia gravidis non conveniunt. Ad cibi fastidium, & Picam vomitus ex aqua tepida, Pau. & Aet. Cibi varij, & varie conditi. Lambere Amilum pro terra: Venter robore astringentibus.

De Conceptu falso. Cap. 11.

Videntur aliquando mulieres concepisse, cum Vterus intumescit, & Menses deficiunt: aut ex morbo, aut ex concubitu, unde conceptus depravatus fiat, quæ Mola appellatur. Ex morbo in *Nat. m.* Hydrops Vteri: in quo Menses pauciores, ac deteriores fiunt: deinde repete deficiunt: & Venter intumescit, & mam

ma sicca fiunt, & reliqua male habet: & in Ventre sibi habere videtur. Deprehenditur autem ex aqua laborare etiã tactu. Nam os Vteri gracile, calidum, humectum: In processu dolor circa imum Ventrẽ, Lumbos, & Laterũ molli tudinẽ. Fit maxime ex Abortu: fit & ex alijs causis, ex inflammatione. Augescit aliquando usque ad decimum mensem: Tunc venter aqua impletur, & Umbilicus eminet, & pedes intumescunt, clauiculæ attenuantur. Contingit in hoc morbo Vtero gestare per duos menses aut paulo amplius: Sed fœtus corrumpitur à multa aqua: Ex Abortu autem effusa multa aqua plerunque moritur. Rigor aliquando & febris corripit. Ex flatu: cum ex Ventre flatum acceperit, eleuatur, & intumescit Mensibus non prodeuntibus: ex sanguine non

1. Mo. m. u.

Nat. p. u.

non erumpente ob clausio-
nem, crassitiem, viscositatē:
Dolet in coitu, grauitas. Ven-
ter prominet. Desiderijs simi-
liter afficitur, vt pręgnantiũ. 1. Mo. m. 19.

Dolor stomachi pręcipue
post dies 30. alias atq; alias in
Vētre circa Umbilicum, Col-
lũ, Inguina, Lumbos. Aliquan-
do post duos vel tres menses
menstrua erumpunt in pu-
dēdum acervatim veluti car-
nea ex corruptione foetus.

Quibusdam alterius. Aliquā-
do ad sex menses erumpunt
suppurata supra Inguen.

Iterum Hipp. Vbi Vterus con- 2. Mo. m. 11.
clusus fuerit, vt Menses sur-
sum ad mammas, & ad pe-
ctus secedant: & imus Ven-
ter attollitur, inexpertę pu-
tant in Ventre habere. Vsq̃ue
ad 7. & 8. menses Venter pro
ratione crescit, & pectora
eleuantur, & Lac innasci vi-
detur. Post id tempus māmę
gracilescunt & Venter, & Lac

euanesceat, quo tempore se
parituram sperabat, Venter
euanesceat, & concidit. His
contingētibus Vterus modi-
co tempore fortiter contra-
hitur, & osculū reperire non
datur, præ contractione &
ficcatione. In mammis au-
tem tubercula fiunt dura par-
tim maiora partim minora:
non suppurantur, sed semper
duriora, vnde Canceri occulti,
& alia grauiā symptomata
superueniunt vnde pereant,

2. Mo. m. u. nisi cito curentur. Mola con-
ceptus est deprauatus à cras-

*Ster. &
1. Mor. m. u.*

sa Genitura intus retenta. Fit
cum multa menstrua modi-
cum & morbosum semen cō-
ceperint: Vnde foetus non
rectus, & Venter plenus est
vt prægnantis. Sed nihil in
Ventre mouetur: neque Lac
in mammis fit, licet sint tur-
gidæ. Nam in foetu natura-
li mouetur tertio mense in
masculis, quarto in feminis.

Eo-

De Morb. Genit. 297

Eodem tempore Lac gignitur in mammis. Perdurat Mola ad duos annos & tres. Si vnica caro est, incurabilis est, sed perit cum in ingentem molem excreuerit. Si plures erumpit per pudendum sanguis multus & carnosus. Si id modice fiat, seruatur: fin, ex fluxu moritur. Arist. prodit, 4. *Ge. an. 7* Molam fieri, cum pro coctione inquinatio fit ob imbecillitatem caloris & multitudinem menstrui. Durasse aliquando annos quatuor, & Abortu dysenteria peperisse carnem adeo duram, vt ferro transigi non posset, ac periclitatam: comitari aliquando per totam vitam. Raro cōtingere & solis mulieribus. Auic. inquit, existimari duplicem esse causam, quarum vna est multitudo materierū effusarum ad Vterum cum vehementia caliditatis: altera, apprehensio aquæ mulieris in
n s coitu

coitu. An semen præter naturam humectatum non retinet figuras eorum quæ coagulantur, ideo foetus informis fit? Quod autem præter naturam crassum inest, non separatur à partibus coagulatis, sed simul cum partibus concrevit: unde durities. Paul. & Aet. Tumorem induratum instar lapidis interim in ostiolo, interim per totum Vterum. Unde in progressu tendit in Hydropem. Fieri ex inflammatione, aut ex ulcere, cui supercreuerit caro. Quidam, inquit Paul. Molam asserunt carnem informem Vteri tunicae adherentem, edi in lucem foetus modo. Ras. & Auic. unde posteriores acceperunt. Molam vocant omnem affectum similem prægnanti, Flatusam, Aquosam, Humorosam, Carnosam. Sed molam vere dictam esse carnem informem, quæ
& mo-

De Morb. Genit. 299

& mouetur alio modo quam foetus naturalis. Ras. moueri inquit, cum duriter tangitur.

Curatio ad Vteri Hydro-
pem. Cap. 12.

Prius dolores mitigandi: *Nat. mss.*
Calida lauare oportet,
& tepefactoria adhibere, donec sedetur. Postea Pharmacum purgans deorsum bibendum scilicet ex ijs, quæ trahunt aquas, vt in Hydrope dictum est. Post purgationem Fomentum ex stercore Bubalo. Vltimo Subdititia, quæ Vterum expurgant, & Menses eliciunt: vt tandem cum viro dormiat. Nam si pepererit, sana redditur. Eadem *1. Mo. mss.*
fermè repetuntur alibi. post purgationem perseverandum in medicamentis subdititijs. Bibat corticem Crithmi alternis diebus. Pæoniæ grana

n 6 ni

nigra quinque, Sambuci fructum in Vino ieiuna, Mercurialem quamplurimam edat, & Allium crudum, & coctum. Ad somnum vtatur mollibus & multa potione: Obsonijs marinis potius quam carnibus. Si interim conceperit, & pepererit, cum puerperij purgamentis subpurgatur etiam quæ prius inerant. Sed si multum tempus processerit hydrops, & in Ventre habuerit, corrumpit, & eijcit, & cum foetu aqua effunditur, & mulier plerunque moritur. Sanguis autem corrumpitur, & aquosus redditur. Huic Lac bibendum dato, & Papauer album potandum, donec foetus moueri poterit. Nam ante hoc tempus, vt plurimum abortit. Si febris superuenerit, aut aliquis æstus in Ventrículo, & sitierit vehementer, ex potu aquæ Splen attollitur, vnde Venter & cru-

ra aqua implentur. Ideo continere oportet. Iterum alibi inquit. Cum sic habuerit, *2. Mo. 7714.* Pharmacum infra purgans bibat: Subdititijs vtatur, & fomentis odoratis. Per diem, penicillis plumbeis vtatur, prius aqua calida non mordente colluatur. Post appositionem colluat ex decocto Cnestri, idest Timælex: in aqua admixto oleo Narcissino, aut Anethino. Si permanferit, iterum Pharmaca bibat ad aquam purgandam: Cibis vtatur panibus & oleribus elixis, & marinis potius quam carnibus, aut extremis partibus coctis flaccidis. A pinguibus & dulcibus abstineat. Victus frigidus & glutinosus ad Hydropem, quia aqua, tenuis à calido fit. Quod Celsus notauit in Hydrope. Laboret plurimum ante & post cibum, nō lauet frigida. Adiatum bibat in Vino diluto iei-

iunā

302 *Artis Medicæ lib. 8.*

iuna diebus inter purgationes. Subditiua aquam purgantia : Cyclamen in lin-
teolo, Cuminum, Vua passa
alba, Vrticæ semen, Ari ra-
dix. Cantharides modico tem-
pore & per longa interualla
cum Cupressi succo ex aqua
2. Mo. M^o. efficax. Vnguentum Narcis-
sinum : Cuminum quod edi-
tur, Myrrha, Thus, Absin-
thium, Cyperum, Vnguen-
tum Rosaceum cum puluere
ex Lino dum pectitur, de us-
so, subdatur per totam no-
ctem : lauet, & aqua odora-
ta perluat. Aliud ex Myrrha,
Sale, Cumino, Felle Tauri,
Melle.

2. Mo. M^o. Si flatus in Vtero sit : ar-
dorem facit, & præ ardore
intumescit, & dolet. qua fla-
tus exit, stridet, mordet; to-
ta intumescit, febris oritur,
& ardor. Præ dolore exilit
valde, virum non admittit,
erigi non potest, neque diri-
gi.

gi. Onus graue in Vtero iacet, Capitis dolor, anxietas, loqui non potest. Cum dolor exacerbatur, clamat, & dolet omnia, Lumbos, pubem, & sedem. Vrina supprimitur, Venter suffocatur. mori cupit, & Præcordia distenduntur, Stomachus mordet, os amarum: Vomit acida & pura: Frequenter ructat, & melius habet: si minus, intumescit, & si tetigeris, renititur, & dolet. Contingunt hæc quia ventus in Vtero est & Genitura.

Desideat in oleo calido iniectis aromatis, Iunci flore: aut in aqua Lauri, aut marina. Optimum prius Ventrem purgare molli Clysteri, aut glande ex lana illota cum Melle, aut efficacius Capa in Oleum & Mel tincta. Vterum colluere ex aqua mulsa aut aceto mulso & oleo. Subdititia & potiones. Aromata

ta omnia & Vnguenta odorata, Laurus, Myrthus, Salvia, Cedri, & Cupressi ramenta contusa & cribrata inspergantur in Vino odorato, & oleo Rosaceo infundantur. Folia Lini & semen trita, & lana excepta appone. Efficacius vnguentum Irinum, Crocum, Lini folia, Adeps gallinaceus, Lac muliebre. excipiantur rasura linteoli. Potio. Salvia, Cyperus, tusa noctu madefiant, mane cremor excolitur, Tritici farina adiecta & aceto & Laser pitio Fabæ magnitudine modice coctis. Cuminum & Anisum sumere. Hodie in usu Diacuminum. Si inueterauerit, deficientibus menstruis præmittenda Venæ sectio, aut purgatio.

Remedia ad Molam carnosam. Cap. 13.

Ster.

Inquit Hipp. Hanc maxime quidem ne curato, aut

De Morb. Genit. 305

aut certe cum prædictione:
quia ante quartum mensem
non cognoscitur, sine Lacte,
& sine motu. In progressu in-
duratur, & cum nunquam
maturescat, coalescit. Pri-
mum totum corpus foueto,
deinde per sedem Clysterem
adhibeto, quo purgetur. Mu-
liere enim à Pharmaco cale-
facta fortasse commouebitur
quod conceptum est, vt vi-
deatur foetus. Amplius Vte-
rum colluito, vt sanguinem
educas: sin minus, subdititijs
vtatur ex Buprestis. Bibat Di-
ctamum Creticum in Vino,
aut Castorium, Cucurbitam
retro ad laterum mollitudi-
nem affigito, & plurimum
sanguinem detrahito pro vi-
rium robore: nam aufert
nutrimentum. Item Thim-
bram tritam in aceto & aqua
bibendam dato: aut Hyoscy-
ami semen tritum. Vterum
colluito cum Muria ac Laser-
pitio

2. Mo. mu.

pitio & aceto, aut cum aqua.
 Optimum infundere aquam
 mulsam cum aqua Lentium,
 aut Erui, aut flore Viola,
 idest Leucoij. Si purgationes
 exeant tanquam exusta, Myr-
 thum coquito & perluito. Et
 apponito Myrrham & Netopum,
 idest Oleum Amygdalarum
 dulcium cū lana. Ras-
 pillulas foetidas sæpius exhi-
 bet. Decoctum de seminibus,
 Oleum de Cherua, Trociscos
 de Myrrha. Indit pessaria
 educentia foetum præcipue
 ex Ruta & Mentastro. Ad tu-
 morem scirrosum Vteri, qui
 videtur veluti lapis tangenti:
 Os asperum multis radicibus
 præditum digitum non ad-
 mittit. Superuenit febris cir-
 cum refrigerans, fremitus:
 dolor in imum Ventrem, &
 laterum mollitudinem, &
 Lumbos, cum scilicet Men-
 ses computruerint: aliquan-
 do ex partu & frigore: aut
 pra-

2. Mo. m. h.

De Morb. Genit. 307

praua victus ratione. Huic
medicamenta purgantia dan-
da sunt. Lauare multa aqua
calida, item oleo: & fomen-
tum adhibere qua parte do-
lor fuerit. Cum recens lota
fuerit aut fota: immisso spe-
cillo, os Vteri dilatare, aut
digito. iterum fouere diutur-
ne cum decocto Cucumeris
syl. Deinde mollitoria appo-
nere, quæ tribus diebus adhi-
beantur. Cum os molle ap-
paruerit, intromittendus pe-
nicillus ex Lino crudo longi-
tudine quinque digitorum,
non crassior paruo digito, in-
cipiendo à tenuiori, illitus adi-
pe Anserino. Postea adhibi-
to fomento odorato suffito:
Glans mollitoria indatur,
aut Nitrum superillitum,
ne exulceret: non enim mor-
deat. Teneat per duos dies:
decidet ex hoc veluti cortex
& pellicula crassa. Interimis
vero tribus diebus, Cyclam-
inum

minum cum Narcissino sub-
dito. Si hæc non purgarint,
cū multa consideratione ap-
ponito id quod cum Bupresti
paratur, & cum fortiter mo-
morderit, glandem extrahat,
& pudendum colluat cum
aqua calida, & in oleo infi-
deat. Postridie adhibeat adi-
pem Ceruinum cum lana. Si
adhuc purgatione egeat, fiat
per mollitoria post tres dies:
ex Narcissino primum, dein-
de Netopo. Iterum odoratis
colluito & pinguibus. Postri-
die Pulegium indito per vnū
diem: postridie fove cum
Aromatis. Utatur cibis acri-
bus marinis, aut carnibus.
& in Mensibus Castorium su-
mat. Paul. & Aet. Molam ef-
se tumorem induratum aut
ex inflammatione, aut ex vl-
cere, cum supercreuerit ca-
ro. Insequitur grauitas deor-
sum trahens, gracilitas, color
vitiatus, inappetentia: solet
in

De Morb. Genit. 309

in Hydropem conuerti: licet incurabilis putetur, non negligenda remedia, Cataplasmata laxantia, Fomenta, Pessi mollitorij, non acres: infusiones. Cerata ex Althæa, Oleo Cyprino, Caricis, Pinguedine: Cucurbitulæ cum scarificatione, Dropaces, Rubificatoria. at hæc non probat Hipp. Suffitus aquæ marinæ vel Muria incoctis Lauri baccis, Pulegio, Salvia, Artemisia, & alijs digerentibus. His remedijs sæpe plurima copia egreditur sanguinis grumosi & atri, vnde affectio dissoluitur. sed periculum de nimio fluxu Hipp. Philosophus quidam vsus est in vxore Vino generoso incocta Ruta & Anetho, potu continuo calido, vnde excreuit sanguinis copiam.

De

De Abortu causæ, & signa.
*Cap. 14.*1. *in 6. Ep.*
2.*An Ani-
mal sit q
in Vr. 5.*2. *Nat. fa.*
12.

A Bortus est foetus deper-
ditio, idest imperfecti
foetus emissio. Qui dedita
opera parant, subiacent legi-
bus tanquam de homicidio:
vt fatetur Gal. & Hipp. in
Iusiurando. Aetius tamen me-
dicamenta abortiua docet: &
in libro de facile parabilibus
ad Solonem. Num forte li-
ceat aliquando, vt matrem
superstitem habeamus? nam
ea pereunte, etiam foetum
perire necesse est. An remedia
aduersus morbum danda
sunt, non ad foetum perden-
dum? Quod si vi morbi, aut
remedijs quibusdam necessa-
rijs perdatur, medicus excu-
sabilis est. Cause Abortus ad
summum tres sunt. Moles
nimia, Pondus, Morsus. Mo-
les, cum Vterus distendi am-
plius

olius nequit ad perfectum in-
crementum. Sunt enim quæ *I. Mo. m. u.*
lam, quæ facile concipiunt,
sed gestare nequeunt, ideo
perdunt ut plurimum tertio,
aut quarto mense, nulla causa
manifesta. In causa est imbe-
cillitas. Hipp. Quæcunque
præter naturam tenues exi- *5. Aph. 44*
tentes Vtero gerunt, abor-
iunt antequam foetus crasse-
cat. Menstruum aut bime- *Ste. et Su-*
stre, trimestre, aut amplius *perf.*
erre nequeunt, cum Vterus
enuis fuerit, nec amplius di-
tendi potest. Iterum inquit:
Mulier præter naturam exte- *Nat. m. u.*
uata augere foetum amplius
on potest. Quæcunque au- *5. Aph. 45*
em mediocriter corpora ha- *Nat. m. u.*
entes abortiunt secundo aut
ertio mense, sine occasione
manifesta, ijs acetabula Vte-
i plena muceoris sunt, & nō
ossunt ex pondere foetum
ontinere, sed abrumpuntur.
lia ratione, si qua mulier na-
tura

tura sterilis forte concipiat,
 abortit, defectu scilicet nu-
 trimenti, cum alio vertatur
 nutrimentum: aut quia men-
 strua nō secundum rationem
 procedant, vnde mulier la-
 borat. & deijcit foetum: vt

Nat. mu.

innuit Hipp. Hoc modo Abortus
 similis est Partui natura-
 li, cum sponte ex defectu nu-
 trimenti paulatim abscedat,
 non per abruptionem. Abru-
 ptionem faciunt violentam,
 motus, saltatio, ponderis

L. Mor. mu.

elevatio, Percussio, Vocife-
 ratio, & alia multa etiam
 animi motus. Morsus irri-
 tantes ad expulsionem: vt Me-
 dicamenta, Pessi acres. Cibi
 acres, & quæcunque turbant
 Ventrem, seu humores distil-
 lantes, seu putredines. Quæ-
 dam ex his foetum enecant
 vnde sequitur Abortus. quæ-
 cunque vehementer alterant
 vt Venena, & Medicamenta
 purgantia, odores prauis: &

quæ

quæ auferunt alimentum, vt
magnæ euacuationes, Venæ
sectio, inædia.

Signa futuri Abortus: Si 5. *Aph.* 37

38. 53.

mammæ repente gracilescunt,
abortit. Si altera mamma ge-
minos habenti dextra aut si-
nistra, alterum abortit, marē,
aut feminam. Et rursus. Quæ
corrupturæ sunt foetus, ijs
mammæ gracilescunt. Si vero
rursus duræ fiant, non cor-
rumpent. Nam simul natura
per Venas dispensat Vtero &
mammis, vt patet in conce-
ptu. Mulieri Vtero gerenti, si 5. *Aph.* 52
Lac multum è mammis ef-
fluat, foetum imbecillem si-
gnificat: Si vero mammæ so-
lidæ fuerint, foetum sanio-
rem significant. Quod enim de-
buisse tendere in alimentum
foetus, effluit ex mammis, vt
in auersantibus cibum vomit-
us. Si vero mammæ solidæ,
significat a seruari materiam
pro Lacte, quanto magis foe-

o

tus

tus augetur. Hic enim est partium consensus: ut vna læsa altera lædatur. Conuertuntur igitur propositiones. Si mammae gracilescant, aut multum Lac effundant, corruptio futura est, aut foetus imbecillis est. Si vero solidæ fiant, idest plenæ non effundentes, foetum saniores significant. Si rursus duræ, idest plenæ, non corrumpent. Quamquam Galen. aliter in Comæntariis sentiat. Quæ abortiunt non ex defectu nutrimenti, sed ex violenta abruptione, ijs non paulatim mammae gracilescunt, sed repente. Sed quæ corrupturæ sunt foetum, deficiente paulatim alimento, ex necessitate mammae paulatim gracilescunt. Nam in partu maturo, licet multa purgatio succedat, non tamen gracilescunt mammae: quia iam collecta est materia pro Lacte, nec duobus amplius

De Morb. Genit. 315

olius natura incūbit : & quod
n Vtero collectum erat, su-
perfluum est. Fieri autem
Abortum ex acetabulis muc-
cosis, cognoscitur Hipp. quia *Nat. m.*
numida fit, & mucosum
quid defluit, & non mordet:
& in Mensibus vbi fuerit pur-
gata, per duos, aut tres dies
mucci ab Vtero prodeunt.

Si autem ex mordentibus, *1. Mo. m.*
& irritantibus Abortus fiat,
horrores & febriculæ con-
tingunt: dolores in alijs, &
alijs partibus: cibi fastidium,
oris amaritudo. Hæc si bilio-
sa per secessum egerat, quod
sæpe contingit, melius deget.
Prognostica. Abortus peri-
culosior est partu, ob violen-
tiam. Periculum ne Vterus
exulceretur, aut inflamme-
tur. Plurimi Abortus fiunt in
primo Quatragenario: nam
eo præterito, foetus fortio-
res fiunt. Iterum in sexto *Sept. pa.*
Quatragenario, cum foetus *Oct. pa.*

o 2 de-

descēdit laxatis membranīs
 Si nascantur in octauo mēse
 Abortus sunt: in septimo au-
 tem quidam vitales, ante
 quam ex descensu foetus la-
 bore: robustior enim est.

Præseruatio ab Abortu.

Cap. 15.

CAuere oportet à causis
 Abortum facientibus
 Sed quædam præsentē foetus
 auferri nō possunt: vt imbecil-
 litas Vteri propter extenua-
 tionem, vt propter humecta-
 tos cotyledones. Sed ante
 conceptum crassēfacere opo-
 tet, & Vterum siccare, ac ro-
 borare. Dum Vtero ferunt so-
 lum ad causas recentes occu-
 rere licet, ne abrumpant, ne
 auferant alimentum, ne cor-
 rumpant. Ideo compescendū
 fluxus, & optimo nutrimento
 reficiendæ mulieres, & Vte-
 rus astringentibus roboran-
 dus.

De Morb. Genit. 317

us. Si morsus adfit, humo-
res mordentes euacuare, ex
Manna, Rhabarbaro: Contem-
perare victus ratione.

In fluxu à capite, Ventre *I. Mo. m.*

quido periculum effugitur,
sed statim concludere, ac cō-
ringere oportet. Si mulier
grōtauerit, & Venter con-
cludatur, aut magnus fiat,
tiam sic puer perit à labore,
affectus, & à tumore pres-
sus. In his modica sanguinis
missio iuuat ex brachio. Si
biliosa fuerit, & doloribus
vexata, si per secessum deie-
cerit biliosa, melius deget.

Vt mulier non abortiat: Can- *Dinam.*

cer fluuiatilis in Vino tritus
in potu: nam facit ad Tabe-
scientes. Non Leporis præ-
gnantis coagulum, vt qui-
dam tradunt, in Vino, licet
sistat fluxiones Vteri, sed ene

cat foetum, Diosc. Hipp. Si in *Ster.*

uita Abortum facit, nec eij-
cere velit, triticum torrefa-

o 3 ctum

318 *Artis Medicae lib. 8.*

Cum & molitum, Vuam pas-
sam albam ex aqua mulsa
cum modico oleo bibat ie-
iuna. Postea Raphani semen
tritum cum aceto & adipe
Anserino bibat. Origanum,
Pulegium cum Polenta ex
aqua: Lauri folia cum Gum-
mi ex aqua: Pastinacæ semen
ex Vino diluto.

Conueniunt igitur Empla-
stica ad tollendam asperita-
tem, siue ex mordentibus, si-
ue ex motu abrupte: adiun-
genda quæ ferant ad Vterum
modice acria. Hodie vtuntur
ouis sorbilibus cum Cocco.
Extrinsècus autem Vnguento
de Comitissa ad Lumbos, &
supra pectinem: nam astrin-
gendo corroborat. Ad vitia
autè antiqua, ex quibus abor-
tit: curanda est, cum non

Nat. mu. Vtero gerit. Cum in Ventro
habens foetum menstruum,
aut bimestrem corruperit, &
ad perfectionem gestare non
possit

possit, & tenuis præter natu-
ram fiat, huius Vterum pur-
gare oportet, & corpus pin-
guetificare. Non enim prius
foetum perferre poterit, quam
Vterus crassus fiat, & robu-
stus: Iterum: Post Pharmaca
purgantia sursum & deor-
sum, Lac Asininum aut Serū
bibendum dato. Postea adhi-
bito fomento Vterum purga-
to ijs quæ non mordeant: Po-
stea aceto colluat, & suffiat
aromata. Ut omnia facta
sint prima die Mensium. Po-
stea lota & leuiter pasta, suf-
fusa affuso Netopo, & Rosa-
ceo coeat. Iterum si Vterus
distendi nequeat ad perfectā
magnitudinem: cognoscitur, *Ste. et Sm-*
cum sæpe statuto tēpore eo- *perf.*
dem sine causa manifesta
abortit. Huius Vterum col-
luere oportet, & subdititijs
quam maxime inflare Cucu-
merario medicamento. Cu-
cumeris syl. medulla contun-
datur

datur & cribretur: eius modicum excipiatur multo Melle cocto, addito modico Laserpitij. Summo specillo indatur in os Vteri, vt penitus penetret: Sinatur, donec liquatum fuerit. Tertia quoque die repetat, aut pluribus interiectis. Elaterium idem præstat, & Colocyntidis medulla eodem modo. Post hoc tempus edat Allia plurima, & Sylpij caulē & quidquid flatum inducit. Interiectis diebus mollientibus vtendum: & post Mensium apparitionem, vbi sicca fuerit, cum viro misceatur. Flatum etiam inducit in Vterum Allij caput integrum & Laserpitium in subdititijs. Sed noxa mollientibus corrigenda intus & extra pinguedine Anatis, oleo Amygdalarum dulcium, affricatis supra pectinem. Si ob Cotyledones pituita plenos: hanc succo grossorum eluito:

Postea

De Morb. Genit. 321

Postea per acerba bis aut ter
Alumine, Galla, Malicorio.
deinde apponito quæ pituitā
purgent: & mollia fomenta
ex Lauro: Colluito aqua &
aceto pari mensura, & in
Mensibus aromata suffito: Im-
pasta & illota cum viro dor-
miat: Fascijs crura circundet,
& oleo illinat. Purgant pitui-
tam, aquam, & muccos, &
non exulcerant, Subditiua:
Myrrha optima, Salis Gru-
mum, Pix Aromatis imbuta:
& trita apponito. Aliud. Gra-
na Gnidia decorticata 30. In-
dicum, quod Persæ Piper vo-
cant, in quo rotundum inest,
Myrthidanum vocatum, idest
vt puto Gariophyllus, cum
Lacte muliebri & Melle ex
lana pennæ inuoluta indito,
& per diem finito.

2. Mo. m. m.

De Partu naturali. Cap. 16.

P Artus secūdum naturam *Oct. p. m.*
perfectissimus septem.

o s Qua-

322 *Artis Medicæ lib. 8.*

Quatragenarijs constat, qui
dies 280. ad summum conti-
nent. Decimestres appellan-
tur, quia continent 9. Lunas
integras, & paulo amplius:
singulis Lunis assignando dies
29. cum dimidio & paulo am-
plius ab vno nouilunio ad al-
terum. Desunt autem vsque
ad dies 280. dies 14. cum di-
midio, quæ est pars decimi-
mensis, aliquando vndecimi.
Si enim cõceptio fuerit vltra
plenilunium, attingit men-
sem vndecimū. Nouimestres
minus perfecti sunt: adhuc
minus. Septimestres, vitales,
tamen in diebus 182. cum di-
midio, quod est anni dimidiū:
ad minus continet menses
quinque integros, primum, &
vltimum non integros. In li-
bro de Principijs perducitur
ad dies 210. qui attingit men-
sem octauum & prætergredi-
tur quintā Quatragenariam.
Sed apud hunc mensis est die-
rum

in triginta Gal. ad summum *Sept. parv.*
peruenire ad dies 204. In se-
xto Quatragenario laborat
foetus in Vtero, qui octauum
mensē includit, aliquando
partem septimi vel noni. La-
borat autem quia mature-
scente foetu pelliculæ spica-
rum more laxantur in septi-
mo mensē, vnde foetus præ-
grauitate descendit propin-
quior factus ad exitum. Ex
tensione Vmbilicus cōuulsus
dolorem matri inducit, Mul-
tæ etiam febricitāt: quædam
pereunt cū foetu. Aliquando
claudi & cæci nascuntur. For-
tissimi & plenissimi foetus in
laxatione pellicularum vio-
lantes & disrumpētes partum
fieri cogunt. sed plurimi in-
tereunt: quia cum parui sint,
40. dierum afflictionem ferre
nequeunt extra Vterum, vt
Decimestres perfectissime fa-
ciunt. At si in 8. mensē exeāt,
omnes moriūtur, quia adhuc

agrotus ex laxatione pellicu-
 larum in 7. mense, cogitur ex
 partu laborare. In septimo
 Quatragenario quibus bene
 futurum est, soluantur inflam-
 mationes tum matris, tum
 foetus. Venter fit mollior, tu-
 mor à Præcordijs descendit.
 facilius ferunt: donec conti-
 gerit foetum verti: Os Vteri
 propè pudendum. Tunc do-
 lores partus, & labores fiunt.
 Nam deficiente alimento per
 Umbilicum, puer copiosius
 desiderans calcitrat, disrum-
 pit membranas, & conuer-
 titur.

Quibus modici sunt Men-
 ses, alimentum citius deficit,
 vt quædam non perueniant
 ad decimum mensem. Eadem
 vt plurimum sine Lacte sunt.
 Conceptus & Abortus & Par-
 tus mulieribus in eodem tem-
 pore, in quo etiam morbi, &
 sanitas, & mors omnibus fiunt:
 partim secundum dies, par-
 tim

tim secundum menses, par-
tim secundum dierum Qua-
tragen. partim secundum an-
nos. Sed vt distinctius habea-
tur dierum computatio gesta-
tionis foetus, hoc modo con-
sideretur. Septem Quatrage-
narij, qui terminus summus
est, continet dies 280. Con-
tinet Lunas nouem integras,
dierum scilicet 29. & horas
15. scilicet dies 265. & horas
15. Vsque ad 280. desunt dies
14. & horæ 9. decimi mensis.
Si conceptio contingat vltra
plenilunium, vt die 16. primi
Mensis relinquuntur dies 13.
& horæ 15. vt compleatur
mensis decimus: supersunt
adhuc horæ nouem vndecimi
mensis, vt ad summam per-
ueniatur dierum 280. Si tar-
dius adhuc conceptio fiat, vt,
vt die 20. Lunæ. relinquuntur
dies 9. & horæ 15. mensis de-
cimi. Hæc peruenire poterit
ad diem 5. vndecimi mensis.

Se-

326 *Artis Medica lib. 8.*

Septimestres partus quinque
Quatragenarijs absolui pos-
sunt, ad minus diebus 182.
cum dimidio, quod est anni
dimidium. Continent men-
ses quinque integros, qui dies
147. cum dimidio: primi men-
sis & vltimi plus dimidio, vt
saltem perueniāt ad dies 35.

Sept. pa. Ad summum perueniunt ad
dies 204. vt Galenus testatur:
semel tantum vidisse, vt plu-
rimū non excedunt dies 200.
At liber de Principijs perdu-
ci ad dies 210. qui sunt men-
ses septem dierum 30.

De partu facili, & difficili.

Cap. 17.

Nat. pu.

Modus secundum natu-
ram est, vt disruptis
membranis puer exeat in ca-
put. Si pueri momentum in-
caput inclinatum prædomi-
nabitur, mulier facile parit,
4. Ca. 22. 9 inquit Arist. Proni in caput

con-

conuertuntur, quia pars ab
Vmbilico superior plus pon-
deris habet. Disruptis mem-
branis prius effluit aquosus
humor, qui inter eas conti-
nebatur: deinde infans, vlti-
mo membranæ ab Vmbilico
appensa, quæ Secunda voca-
tur, quia secundo loco post
infantem exit. Aqua viam
præparat, infans Secundam
trahit. Difficilis est omnibus,
præcipue Primiparis, quia
in hiatu Vteri maior violen-
tia fit. Nam coxendices di-
sparantur, dolet totum cor-
pus maxime Lumbi & co-
xendices. Difficilior si exeat
in pedes, aut obliquus. Nam
sæpe foetus perimitur, ali-
quando & mulier. Contingit
peruersio ob iactationē, cum
inexpertæ, aut propter incon-
tinentiam non quiescunt, In
peruersione Vmbilicus collo-
sæpe circumducitur.

Mortui foetus difficiliter
eiciun-

328 *Artis Medicae lib. 8.*

ejiciuntur, & languidi, quia
robur requiritur non solum
in muliere, sed etiam in infan-
te. Nam adiuuat impulsu &
3. *Aph. 55* calcitratu. Gal. Post exitum
infantis aliquando moratur
Secunda præ imbecillitate:
aut quia adhæreat Cotyledo-
nibus, quod in Abortu magis
contingit, cum foetus non
maturus est. Alia impedi-
ta affert Aet. Loci angustiam,
ob pinguedinem: Si moles am-
plior. Si tuberculus adsit, aut
inflammatio: Lapis in Vesica,
Excrementa crassa: Siccitas,
cum ante tempus debitum
3. *Aph. 12* aqua proruperit: Aquilonia
constitutio præcipue Veris.
3. *Mo. mu.* Signa instantis partus. Fre-
quens respiratio. dolor Lum-
borum, Ventriculi signa dif-
ficilis partus: febribus corri-
pi: Fortiter incallescere sine
3. *Aph. 55* causa manifesta. Quibus cir-
ca 7. aut 8. mensem derepen-
te mammarum & Ventris
ple-

De Morb. Genit. 329

plenitudo collabatur, & Vbera gracilescunt, & Lac non apparet, his dicendum, puerum aut mortuum esse, aut debilem viuere. Si Lac multum è mammis effluat, foetum imbecillem significat: Si *s. Aph. 52* mammae solidæ, foetum saniores. Si Vtero gerenti purgationes eant, impossibile est foetum sanum esse. Si cui ex *s. Aph. 60* partu laboranti fluxus multus sanguinolentus citra dolorem ante puerum prodeat, periculum est, puerum exol- uendum esse, & non vitalem processurum. Nam significa- tur sanguinem pueri exire per Venas Umbilicales. Si puer diu in genitalibus hæ- reat, & non facile exeat, sed cum labore, & Medici machi- namentis, modicæ vitæ est. Talis omnino obliquus aut *I. Mo. m. 10.* in pedes procedit. Vnde saepe aut matres pereunt, aut puer, aut ambo. Si cui exeat *Secund. Superf.*
da

da, priusquā puer foras procedere incipiat, ægre parit, & periculosus, si caput nō præcedat. Si simul exeant, & ad os Vteri rumpatur Secunda, facilius parit. Sed Secunda hæret, & seipsam retrahit, & manet. Cum puer immortuus fuerit, tum alijs signis coniectari licet: tum iubere, vt mulier de vno Latere in alterum conuertatur. Si mortuus, translabitur pondus, quo se verterit, veluti lapidis: & pecten frigidus. E contra pecten calidus, & totus Venter tumens translabitur.

*Curatio Parturientis.**Cap. 18.*

I. M. m. m.

INquit Hipp. Custodia & multa scientia opus est mulieribus, vt in Vtero gestent puerum, enutrient, & vt euadant ab ipso in partu. Aet. circa octauum mensem, qui

De Morb. Genit. 331

qui molestissimus est, alimen-
tum contrahendum est, & mo-
tus vehementiores præscri-
bendi: Alius humectanda:
nono mense Balneo frequen-
ter utendum relaxandi gratia,
ut dolores partus ferre possit.
In Partu situs quærendus est
rectus, declivis, firmus, ut
foetus conuertatur in caput.
Eniti oportet retento spiritu,
& truso deorsum, ut Septo
transverso & musculis Abdo-
minis expressio fiat ad infe-
riora. Arist. Mulieres si in
partu vel oscitando, vel ali-
qua huiusmodi causa retra-
hant, difficilius pariunt. At
frustra enituntur, antequam
os Vteri hiarit: quod Obste-
trices digito cognoscunt. Hu-
mectum enim & laxatum os
reperitur pudendo propinquis-
simum. Nā inutile antequam
tungeat. Si ægre pariat, locis
præclusis manentibus, & sici-
cis: insideat in aqua calida &
oleo,

1. Ge. an.

11.

4. Pro. 9.

333 *Artis Medicae lib. 8.*

oleo, crebris perfusionibus,
incocta Malua Fæno Græco
semine Lini. Inunctio Loco-
rum ex oleo Cyprino, pingue-
dine: Bibat oleum, apud nos

l. Ad o. m. n. ol. Amygd. dulcium. Nam,
lubricat, & dolores lenit. Suf-
fitus ex Resina, Cumino, cor-
tice Pinus. Si prodire volen-
tes non facile exeant, cum
situs sit secundum naturam,
talibus sternutatorium admo-
ueto, & nasum apprehendi-
to, & os comprimito, ac sic
sternutet, ut sit efficax. Vten-
dum & concussionibus super
lectulum stratum, cui supina
alligatur fascia ad pectus, &
axillas recuruis cruribus,
malleolis apprehensis deti-
netur. Cum accedunt dolo-
res, attollitur lectus ad ca-
put, ut declivis sit in pedes,
at non prona. Decidat postea
lectus non in suos pedes, sed
in fascem sarmentorum para-
tum ad caput, ut concussio
mol-

De Morb. Genit. 333

mollior fiat. Si prima concussione non exeat, rursus interstitio facto concutito: & in lectulo gestatam attollito ac agitato. Interim illinire oportet & perfundere ex decocto Maluæ, Fœnogræci, aut potius succo Ptisanæ triticeæ usque ad Inguina, & sedem, & pudendum fovere, & insidere, ubi partus dolores maxime infestarint: & nihil aliud mente versare. Obstetrix molliter oscula aperiat: Umbilicum vero vna attrahat cum fœtu. Ad fœtus situ deprauato i. Mor. mul.

Quicumque duplicati in osculo Vteri incumbunt, aut foras præmittunt manum, aut os, aut vtrumque, siue viui siue mortui: rursus retro protrusos vertere oportet, quo secundum naturam in caput exeant. Supina collocanda est in lecto vt reclinet in caput, substratis molli-
libus

334 *Artis Medicae lib. 8.*

libus ad coxas, & sub lecti
pedibus sensim aliquid sub-
ponendo, vt mulieris pedes
attollantur, nullo cervicali
sub capite. Obstetrix manu
peruncta foetum dirigat in si-
tum naturalem. Deinde sen-
sim mulier constituatur, vt re-
clinat in pedes, & caput al-
tius sit: & si opus fuerit, con-
cutito. Interim vires refocil-
lare, & in aquam calidam re-
fidere. Si foetus mortuus fue-
rit, non semper licet detru-
dere, & dirigere: quia intum-
escit. Tunc membratim se-
cundo extrahendus, cauendo
ne Venter scindatur, sed per-
foretur tantum, vt flatus exeat.

Superf.

Intumescit etiam viuentis pars,
quæ extra Vterum manet, re-
liquo corpore intra. Tunc fo-
uere oportet odoratis, vt hu-
meatissimus Vterus redda-
tur: & tumor desideat, vt in-
tromitti & dirigi possit. Si à
fomento non processerit, os

Vte-

De Morb. Genit. 335

Vteri Elaterio crasso aqua
diluto oblines, quo inducat
parturitionem: Et pudenda
cerato illinenda, si sicciora
videantur. Vbi defaticata, &
nullum auxilium à foetu im-
becilli, aut mortuo, prouo-
canda est parturitio: à poti-
bus & cibis. Partum accele-
rant ægre parienti, Lauri
radix derafa, & Lauri bac-
ca dimidijs acetabuli mensu-
ra in aqua calefacta biben-
da data. Dictami oboli duo
in aqua calida. Abrotoni
drachma & Lauri bacca, &
Anisum in Vini dulcis ve-
teris cyatho vno, & aquæ
cyatho affuso bibat. Hoc bo-
num etiam ante dolores par-
tus. Dictami, Myrrhæ vtriuf-
que obolos duos Nitri obol.
vnus in Vini dulcis cyatho
vno, & aquæ calidæ cyathis
duobus. Dein calida lauato.
Resinam Terebinthinam, Mel
Oleum duplum horum, Vi-
num

I. Mo. mu.

336 *Artis Medicæ lib.8.*

num odoratum suauissimum
 hæc mixta tepesfacta sæpe bi-
 benda dato. Interim Vterus
 sedandus, si fuerit inflamma-
 tus. Si multo tempore cohi-
 beatur, & parere non possit,
 diebus pluribus doloribus ex
 partu laboret. Et iuuenis in
 vigore multo sanguine refer-
 ta Venas in malleolis secare
 oportet, & sanguinem extra-
 here virium respectu. Postea
 calida lauare incoctis Lauri
 corticibus. Et semen Viricis
 & Dictamum Creticum par-
 pondere in Vino albo, aut
 aqua bibat. Subdititium ex
 Galbano, baccis Lauri, oleo
 Rosaceo in lana. Polypodium
 Quercinum in Vino bibitum
 Adiantum in Vino merace
 bibitum, & ex oleo illitum
 Cibi qui etiã faciunt ad pur-
 gamenta partus: Triticum
 trimestre fractum, & fresum
 in aqua coquito vt ter, au-
 quater efferbuerit, sorben-
 dum

1. Mo. m. m.

dum dato: aut Brassicas co-
ctas & Porrum, & Fœnicu-
lum, & Anethum, & Poly-
pos, & Locustas, pisciculos.

*Remedia ad Secundam, &
Purgationem ex partu.*

Cap. 19.

CV M Secunda non sta- *Superf.*
tim exierit post partum,
imi Ventris dolores contin-
gunt, & in Laterum mollitu-
dine: Rigores & febres. Si di-
fcesserit Secunda, sanatur mu-
lier. Sæpe putrescit, & disce-
dit sexta aut septima die, aut
etiam prius. Si non facile
cum foetu excidat, ad foetum
appêdere sinenda est: & Puer-
pera sedeat super sella in al-
tum extructa, quam Lasanum
vocant, vt foetus descendens
grauitate sua Secundam ex-
trahat: At sensim, non vio-
lenter: ne præter naturam
diuulsa inflammationem in-
p ducat.

338 *Artis Medicæ lib. 8.*

ducat. Substernere lanas molles recens carminatas, quo paulatim remittatur, & confidant. Aut vtres duos copulatos aqua plenos, & super vtres lanas molles foetum sustinentes. Vter vterque stilo perforetur, vt sensim aqua exeat, & confidant. Sic foetus sensim descendens Umbilicum trahit, Umbilicus Secundam. Si super Lasanum, sedere nequeat: super reclinatam sellam perforatam collocetur. Sin ob imbecillitatem non possit sedere, lectum quam erectissimū struemus, vt à capite deorsum declinet. & sic foetus grauitas quam maxime Secundam trahet. At Puerpera sub alis fascia, aut loro alliganda est ad lectum, ne deorsum labatur. Si Umbilicus abruptus sit, aut ante tempus debitum recisus, moderate grauibz ponderibus appensis, Secundæ educationem

nem facere oportet. Contin-
git relinqui in Vtero Secūda,
cum per vim Umbilicus ab-
ruptus fuerit, aut recisus per
imperitiam: retrahitur enim
fursum. Hodie si cogantur re-
scindere à puero, antequam
exeat, alligant ad coxam.
Puerperæ. Aet. Chirurgia
vititur ad extractionem, quod
periculosum est. Nam satius
sponte exire adiunātibus me-
dicamentis & artificio Hip-
pocratis. Nam & foetus mor-
tuus sponte exit tabescens in
faniem. Tunc fouere oportet
odoratis, & abluere Vterum
ob putridos vapores. Ut Se-
cundæ procidant, Sternuta-
torio imposito nares apren-
dito & os. Vterinis, & ei quæ
difficulter parit, superueniens
sternutatio, bonum. Præstat
dare ea, à quibus maxime
purgantur puerperij purga-
menta. Allia elixa in Vino, &
oleo, cum Polypis ac Sepio-
lis

Superf.

5. Aph. 49
35.

1. Mo. Mu.

p 2 lis

lis totis super prunas. Casto-
rium, aut Nardum, aut Ru-
tam in Vino nigro dulci, aut
admixto melle bibat, Brassi-
ca cum Ruta, & Mercuriali
additis seminibus odoratis.
Omnium optimum Artemi-
sia herba & Dictamnium, Violæ
albæ flos, Laserpitium fabæ
magnitudine in aqua potum.
Et si Secūdā excludere non
possit, à cibo abstineat, Postea
Viticis folia trita in Vino &
Oleo & Melle bibat, & exhibit.

Nat. pu. Purgatio ex partu nisi fiat,
morbus magnus corripiet: &
periculum vitæ incurret, nisi
cito curetur. Necessariam es-
se purgationem, vt euacuetur
id, quod à primo Quatrage-
nario non absumebatur in
foetum. Ideo respondere tem-
pus purgationis tempori ar-
ticationis foetus in feminis
diebus 42. in masculis 30. ad-
summum. Purgatio ad minus
diebus 25. in feminis. 20. in

ma-

De Morb. Genit. 341
masculis. Vel dicendum: ut
puer post partum laborat 40.
diebus, sic Puerpera. Exeunt *Sept. pa.*
purgamenta post partum ob
conturbationem sanguinis:
primum muccus sanguinolen-
tus copia heminae unius cum
dimidio paulo plus aut mi-
nus: in dies minus, donec
desinat. Similiter fit in Abor-
tu. Si sana est, procedit san- *1. Mor. m.*
guis veluti à victima qui sta-
tim congelatur. Si morbosa,
purgatio paucior procedit, &
specie deterior, nec cito con-
gelatur. Si ex partu non fue- *Nat. m.*
rit purgata, tumet Venter &
crura. Rigor & dolor corri-
pit imum Ventrem, & Lum-
bos, quandoque ad viscera
ascendit, & animo linquitur:
Febris acuta. In processu fa-
ciei partes cauae rubescunt: *1. Mo. m.*
moritur ut plurimum ad sum-
mum in diebus 31. Pulsus de-
biles, nunc attolluntur, nunc
deficiunt. Causa impediens

purgationē est os conclusum
 ex inflammatione. Obtor-
 quetur enim os Vteri post
 pueri egressum: Quodcumq;
 horum fuerit, purgatio non
 procedet. Hinc febris, hor-
 ror, Ventris inflatio: dolor
 ad tactum, & alia multa sym-
 ptomata. Primiparæ & Abor-
 tus magis obnoxij ob violen-
 tiam, & quibus partus diffi-
 cilis. Ad purgationem ex par-
 tu, fomento adhibito ad Vte-
 rum ex Vrina, aut decocto
 Sambuci, & suffitu. Cycla-
 minum apponito: aut alia
 subdititia. Cucumeris syl. in-
 terna pars oboli tres, Arte-
 misia, Thus, obolus vnus cum
 Melle & lana ad Vteri os, te-
 neat die ac nocte per dies
 quinque. Bibat medicamen-
 tum cum Thæda præpara-
 tum, donec fluxus fuerit com-
 motus. Potiones multæ recen-
 sentur ab Hipp. Sambuci fo-
 lia coquito, & oleo affuso bi-
 benda.

*Nat. mu**Nat. mu.**1. Mor. mu*

benda dato. Erysimum in
aqua coquito, & oleo affuso
bibendum dato; aut tritum
cum aqua & oleo Polentæ in-
sperge & coquito. Trifolium
ex vino. Si purgatio in gru-
mos coacta exit, Porrum co-
ctum & olera cum oleo exhi-
be. Lauet tertio quoque die,
caueat frigus, nungat. Ad
os Vteri applicetur emollien-
tia. adeps Anserinus, Myr-
ra, Resina tepesfacta. Deam-
bulatio. Sumat ante cibum
Mercurialem coctam & Al-
lium, & Porrum: & Brassicæ
succum sorbeat. Cibis molli-
bus vtatur magis marinis.
Abstineat à pinguibus & dul-
cibus, donec sana fiat. La-
uetur calida. Si febris adsit,
ne lauato, à balneis abstinere
oportet: Sed fomentis & te-
pesfactorijs ad imum Vētre
& Lumbos curare oportet. In
potu exhibere Pharmaca vte-
rina admixtis Sepiæ ouis, aut

Castorio: Post hoc farinam,
 cum Ruta coctam, aut Ptisanæ
 succum. Pharmacum au-
 tem, si turgeat, sit, quod Bi-
 lem ducat aut Pituitam, si bi-
 liosa aut pituitosa fuerit. Pro-
 dest & Anisum, & quæ Uri-
 nam cient: Vomat: & sudo-
 res eliciantur: Clysteres ex
 succo Ptisanæ, Melle, Ovis,
 Maluæ decocto. Admiscenda
 refrigerantia, & astringentia
 post usum attrahentium. Vi-
 tis pampini, aut folia viridia
 trita ex melle cum lana. Cu-
 pressi fructus, & Thus trita
 cum Rosaceo & Melle.

De inflammatione Vteri.

Cap. 20.

V Teri inflāmatio vt plu-
 rimum ex partu diffi-
 li contrahitur aut ex Abortu:
 cū præ frigore materiæ mul-
 titudo & crassities obstruit, &
 putrescit deficientibus purga-
 men.

De Morb. Genit. 343

mentis. Oriri etiam potest ex alijs causis ob defectum menstruorum. Nam primum obstructio fit putredo, & febris de genere synoche ob magna vasa, quæ in Vtero sunt: Succedit autem inflammatio, si non recte curetur. Ad inflammationem febris vehemens. Vteri ceruix variegatur multis tenuibus Venis ad similitudinem telæ aranear.

1. in 6. Ep.

2.

2. Mo. m. 11.

Aliquando febris debilis: *1. Mo. M. 11.*

Caligo, Caliditas perpetua in Ventre, Sitis, Dolor ad coxas: unus Venter intumescit: Aluus turbatur: excrementa olida, tunc calor vehemens. Cibi fastidium: dolor circa synciput: Ventriculi imbecillitas. Nisi statim curentur, plurimæ moriuntur. Si fiat Erysipelas, tumor incipit a pedibus, procedit ad Crura, & Lumbos, postea intumescit Venter: Rigor & febris, imbecillitas. Præ dolore iacet

p s seip-

seipsam: ex imo Ventre ascen-
dit ad Lumbos, & Præcordia,
Pectus, & Caput: Mori sibi
videtur. Cum remiserit, oc-
cupat torpor ad manus, ali-
quando ad inguina, & liuida
fit. Intervalla quædam mitio-

s. Aph. 43 ra: Corpus impletur pustulis,

2. Mo. Mu. Faciei rubor, Sitis vehemens,

Fauces siccæ, Tumores fiunt
liuidissimi exorsi à pedibus,
liuores in poplitibus, cum
dolor solutus fuerit. Curatio.

Quæ ex partu vel Abortu, nõ
Venæ sectio Aet. neque qui-
bus multus effluxit, sed leui-
ter Aluum mollientia. Sam-

Nat. mu. buci folia tenerrima in tritici
farina cocta sorbeat tepida.

1. Mo. Mu. Resinam terebinthinam, &
Mel & Vinum tepidũ, oleum
Amygdalarum dulcium, nam
sedant dolores, & inflamma-
tionem. Ad Vterum relaxan-

11. Met. 16 tia non repellentia. Quicun-
que tumores Vteri in partu,
aut ex partu fiunt, eos astrin-
gere

De Morb. Genit. 347

gere non oportet, vt Medici *I. Mo. 100. 101.*
faciunt, sed digerere potio-
nibus ex Cumino, Aniso, Se-
feli, Pæoniæ radice aut semi-
ne in Vino albo odorato iei-
næ: Refrigerantia tamen ali-
quando adhibet Hipp. vbi in- *I. Mo. 100. 101.*
quit: Si ex partu Vterus in- *Nat. m. 11.*
flammatus fuerit, Solani suc-
cum infundito, aut Betæ, aut
Rhamni actu frigida, & vbi
incaluerit, alium: aut Lenti-
sci, aut Cucurbitæ succum
expressum, & medullam dera-
sam in longitudine indito: Ce-
russam ex aqua lana exceptā,
Cataplasma frigidum impo-
ne ad pectinem. Ventrem
quoque frigefacere oportet,
cauendo ne horrescat. Vbi
calor debilis, sed imus Ven-
ter igne ardet. Sorbitiones
actu frigida: sed extrinsecus
calefacere oportet ad relaxā-
dum & extrahendum: præci-
pue vbi ex frigore condensatus
fuerit Vterus. Cataplasma.

p 6 ex

348 *Artis Medicae lib. 8.*

ex Musco marino, farina Hordei, Cinere sarmentorum, semine Lini tosto ex oleo & aceto ad ignem addensatis, ut pasta: & calidissimum imponatur: & si oporteat scarificare, id quoque fiat. Postea subdititia ad inflammationem consequentia, relaxantia, dolorem mitigantia, digerentia, & extrahentia. Pessi, suffitus, lotiones: ex pinguedine Anatis, oleo Amygd. dulcium, Rosaceo, Butyro, Myrrha, Thure: Ovi vitellum. Cataplasma imo Ventri ex palmulis, Caricis, Meliloto, Aet. Ruta, Parietaria, Artemisia. Tandem Pessi purgantes. Aqua mulsa in potu & Vinum aquosum. Cibum quam minimum edat, & Venter sistatur: & caput curet. Aet. Capiti Oxyrhodinum imponit. Hepar Ovinum, aut Caprinum sub cineribus obruito, postea elixato: edat, & Vinum

De Morb. Genit. 349

Vinum meracum bibat vetustius, si nihil prohibet, ad dies quatuor, si longe aberit à partu. Si post partum sanguinem vomat, multa calida lauare oportet, & lac Asininum detur ad dies septem. Postea, Vaccæ nigræ ad dies 40. sine alio cibo, si fieri poterit.

Ad Vteri inflammationem ex retentis menstruis: Venæ sectio in Cubito Aet. si nihil prohibeat, repetitio fiat altera die & tertia. Non ex ore, nisi instantibus menstruis.

*Cu. per.
san. 18.*

Purgans medicamentum. Ad Vterum quæ purgant, & non mordent. postea ablutio ex aqua & aceto. Edat Mercurialem & succum eius farina inspersa vel cocta: Cotyledonis folia & Porrum in tritici farina cocta oleo affuso edenda. Si dolores vehementes adsint, fouere spongijs calidis ex aqua & oleo expressis.

Nat. mu.

2. Mo. mu.

Subdititia mollia ex medul-

la

350 *Artis Medicae lib. 8.*

la Cerui, adipe Anserino, cera alba, oui luteo: aut ceratum picatum cū Resina subdito. Ablutio ex Vino, aut Lacte Caprino, iusculo volucris ex Vino & oleo Rosaceo Aet. Vinum ne bibat, & Ptilianæ sucum sorbeat. Suffumigia ex Vino suauissimo, & aqua pari, Fœniculi radice & semine, & oleo Rosaceo, quæ in olla ferueant, vt fumus recipiatur. addatur & Scylla ad oscula aperienda. Si ex hoc excitentur pustulæ: superponatur intra pudendum caro Bubala illita cū Butyro, aut adipe Anserino & Aniso. Ad pus in Vtero, cum non est inclusum in tuberculo: Lacte Equino cocto & colato abluatur per fistulam Vesicæ alligatam: deinde fumum recipiat ex Vino odoratissimo, siccissimo, & vetustissimo, iniectis lapidibus nigris cādentibus. Ad Erysipelas purgandum

8107.

2. M. 1111.

De Morb. Genit. 351

dum ex Lacte Asinino, si non
soluatur, Ventrem mollibus
frigefactorijs subluere: Sub-
dititijs non molestis & leui-
bus paulatim Vterum purga-
re: vomere, ex Sambuci fo-
lijs coctis cum Origano, aut
Thymo, aut Ruta: Cum fe-
bris dimiserit, etiam Vinum
& cibos dulces dato: verun-
tamen pauca curantur. Fri- *Nat. m.*
gefactoria adhibenda: & Ven-
trem turbare ex solis cibis &
potibus: si pragnans sit, ijs
quæ foetum nō corrumpant:
vt Lac Asininum, & Clysteres
molles: Si non pragnans, ex
Pharmaco: Cibis paucissimis
vtatur, mollissimis ac frigi-
dis: Mercurialem edat & Sam-
bucum: abstineat à salsis, pin-
guibus, & acribus. Postquam
calor & strangulatio remise-
rit, & tumor non fuerit seda-
tus: medicamentum fortius
infra purgans bibat: pauca
tamen effugiunt. Vtrum con-
ueniat:

ueniat aquæ frigida potus,
 5. qui à Galeno in Erysipelate
 interno laudatur non expe-
 ctata coctione? An conueni-
 ret, si exquisitum esset Erysi-
 pelas? At in Vtero prohibe-
 retur eius purgatio.

De fluxu Vteri. Cap. 21.

9. Met. 10 **E**X immodico Vteri flu-
 xu morbi fiunt ex ina-
 nitione. Nam aut mors repen-
 tina sequitur, aut graues mor-
 bi: nam prauus habitus inse-
 6. lo. af. 5. quuntur: color fædus: Pedes
 molli tumore attolluntur, ro-
 bur totius prostermitur, vitia-
 tur coactio, & appetitus.
 5. Aph. 56 In fluxu muliebri, si con-
 uulsio & animi defectus se-
 2. Mo. mu. quatur, malum. Differentiæ.
 Quidam ruber, quidam al-
 bus, qui Fluor muliebris ap-
 pellatur, quidam fuluus. Ru-
 ber contingit aliquando ex fe-
 bre: sed magis ex Abortu aut
 Partu

partu difficili : aliquando in
coitu violento ob ruptionem
Venarum , aut apertionem
osculorum . Fit aliquando ex
Mensium retentione , cum con-
clusi repente eruperint : Ali-
quando ex vlcere ob erosio-
nem . Si fluxus plures fiant
quam oportet , etiam crassio-
res , & plurimi prodeunt die-
bus intermedijs . Incipientes
autem & desinentes paucio-
res & tenuiores effluunt . His
os Vteri propè pudendum est
hians , & ob imperum magis
dilatatur , & à toto corpore
fluxionem recipit . In mulie-
re laxa & pituitosa , sanies po-
tius subrubra interdum aquo-
sa aut subpallida . Aliquando
sanguis purus veluti à disse-
cta Vena , quando ob erosio-
nem præcipue in ceruice fiat .
His prædicere in principio
oportet periculum , vt cito re-
media adhibeantur . Curatio
superflui fluxus rubri : Reuul-
sio :

fio: Sedatio perturbationis:
Tandem vitia Vteri, aut to-
tius corrigere. Reuulsio per
Venæ sectionem iteratam in
brachio, vbi vires consen-

1. *Aph. 50* tiunt. Cucurbitula magna sub
mammis eleuata & detracta
nunc ad dextra nunc ad fini-

2. *Mo. m.* stra, sine scarificatione. Vin-
cula ad manus, supra cubi-
tos, & ad poplites supra ge-
nua. Sedatio perturbationis
per medicamenta ficcātia, &
victum mane danda sunt ter,
& quater in die, si sanguis
multus discessit. multa descri-
buntur ab Hipp. Cornu Cerui
vstum cum duplo farinæ hor-
dei in Vino Pramnio. Adian-
ti radix, Cicer torrefactum,
farina lentium in potu, aut
ex melle. Aspalathi radix ex-
tollitur in Vino albo cocta
ante cibum. Refert Hipp. iu-
uenculam ex fluxu rubro la-
borantem, quæ neque medi-
camentis datis, neque capite
pur-

Ster.

urgato, neque Vena lecta,
quidquam proficiebat: cura-
a est ex Aspalathi radice in
Vino albo cocta. Hodie ha-
bemus radicem Sassatras ex
India Occidentali: non absti-
nilem Aspalatho. Mali Puni-
i dulcis assati succus cum Vi-
no nigro: Hodie utimur Tro-
iscis de Carabo, cum saccha-
ro Rosaceo. Aet. Hypocisti-
dem exhibet, Acaciam, Ly-
cium, Terram Samiam, &
alia astringentia. Dieta Hip-
pocrati sine febre ex cibis, si febrili-
tetur, sorbitionibus ex Pani-
co, farina Hordei, Tritici, Ha-
rica. Cibi panis assatus in-
cinere, caro Leporina, Colum-
ba tum elixa, tum assa: Hædi
caro assata cum aceto. Hepar
Caprinum, Vitulinum sub ci-
nere assatum, Oua, Caseus
insulsus: abstineat ab oleri-
bus & balneis. Cibis siccis
utatur, & Vino nigro vinoso.
Sed Paul. abstinet à Vino, uti-
tur

tur aqua Chalybeata cū Vi-
 a. Mo. mn. no Granatorū. Si ad hęc non
 sedetur fluxus, habita virium
 ratione, & considerata natu-
 ra mulieris, vtrum biliosa,
 aut pituitosa, si robusta fue-
 rit, Veratrum dare oportet,
 & si non obediat, Caput pur-
 gare: facta autem purgatio-
 ne, per diætā reliqua cura-
 re. Gal. inquit: Vbi affectio
 in toto corpore est, non in
 6. lo. af. 5. Vtero, hæc sufficiunt. Ad
 Vteri affectus: idest osculorū
 relaxationem, intemperiem
 calidam, & humores irritan-
 tes: imo Ventri refrigerantiā,
 imponenda, mulier autem
 elatis pedibus decumbat. Ex
 sponsia madida, aut linteis
 laceris in aqua frigida tin-
 ctis & aceto, at non diutius
 ne horreat. Indat subdititia
 ficcantia, astringentia & ab-
 stergentia: Grossum ficcum
 cōtusum & cribratum linteis
 exceptum impone. Oleæ syl-
 folia

De Morb. Genit. 357

folia in aceto cocta perluat
boudenda: Rhus eodem mo-
do: melius ex aqua & Vino
austero, si acetum offendat,
nam Vtero inimicum.

Myrthi folia, Lauri, He-
lera in aqua, collant tepida.
Lentiscus, Labrusca germina,
Cyperus, Vua passa ex Muls
euter tepida. Cupressi fru-
tus, Mali Punici. Gal. Suc-
co Plantaginis utebatur. Fo-
nenta & Cataplasmata leui-
ter tepida. Vbi dolores affue-
runt, ex iisdem, aut ex dige-
rentibus: Farina Lolij in po-
ca, lentes torrefactæ & de-
orticatæ in aqua coctæ. Sal-
ia. Loti ramenta & Cupres-
i in cremore Vuæ passæ. Illi-
ones ex Rosaceo, Butyro,
Resina, adipe Anserino, me-
sulla & adipe Suillo, oleum
eminis Lini. Suffitus ex Hor-
reo tosto prunis insperso,
ornu Cerui cum oliuis im-
aturis; Palea hordei & ster-
cus

cus Bubalum, Vinum nigrum
 in quo ramenta Loti, Cupres-
 si, & Rhus. Galbanum, man-
 na Thuris, aut Resina Vino
 subacta. Vinacea vrantur in
 scrobe, & super cinerem ir-
 rora Vinum odoratum, & mu-
 lier circū sedens seipsam cōre-
 gēs excipiat fumū. Aromata,
 Cinnamomum, Thus, Styrax,
 Myrrha cum folijs Rubi, Ro-
 sarum, Mentha, in cinere sar-
 mentorum vitis. Sed cauere
 oportet, ne odor ad nares,
 nam melius esset non suffire.
 Subdititia ex ijsdem cum
 oleo Rosaceo. Myrrha & Bul-
 bion cum melle tritum: Por-
 rum, Calamentum in Vino
 nigro coctum crustam indu-
 cant. Hyoscyami folia, Cicu-
 ta similiter cocta obstupefa-
 ciunt.

De fluxu albo. Cap. 22.

Fluxus albus, Muliebris
 fluxus, vel fluor vocatur
 Paul.

De Morb. Genit. 359

aul. & Aet. Menses decolo-
res dicuntur. Est expurgatio 5. Aph. 36
per Vterum prauorum humo-
rum in corpore existentium,
nunc continue, nunc per in-
terualla. Senioribus mulieri- 2. Mo. mu.
bus magis fit. Ruber autem
iunioribus, Rufus in vtrisque:
Albus pituitam significat, Ru-
bus bilem, Arist. Quæ alba 2. Ge. 22.
vocatur, paruis adhuc & puel- 4.
lis proueniunt. Vterq; fluxus,
scilicet albus & ruber, cum
modice fit, seruat corpora
integra. Per Menses decolo-
res omnes intelliguntur præ-
ter rubrum: Hipp. ad sex spe- 2. Mo. mu.
cies reducit. Prima, in qua
quod defluit, est veluti Vrina
Asini: tumores albi apparent
in facie, sub oculis specie Hy-
dropis: In cruribus laxi, quod
digito presseris, relinquitur
fovea: saliuam multa, lachrymæ:
anhelatio, cum ad accliuem
locum procedunt: Refrigera-
tio inferiorum partium: Os
Vte-

360 *Artis Medicæ lib. 8.*

Vteri hiat præter rationem
cum grauitate plumbea, diffi-
cile liberantur, quia ætate
prouectioribus aduenit, &
conſeſcunt. Secunda, Ruſa
eſt, veluti ex ouo vitioſo, gra-
ueolens cum inflammatione
& dolore in Lumbis, & Ingui-
nibus.

Si cito non liberetur, cum
multitudine effluxus: quæ re-
linquuntur, reliqua putrefa-
ciunt: vnde rigor & febris
acuta: deſluit humor veluti à
carnibus aſſatis, & multæ pe-
reunt. Tertia mixtionem ha-
bet ex bile & pituita: purga-
tur album ſubluteum, cum
mingit, morſum percipit, lan-
cinatur. Vterus vlceratur
febris acuta, calor multus
ſitis, vigiliæ, deliria: cum
aliquid feſtinanter egerit, an-
helatio, exolutio. Quarta
Deſluit veluti Vrina ouilla
Color albus, tota intumeſcit
in tibijs eminentiæ laxæ rubi-
cundæ

De Morb. Genit. 361

Secundæ; Si quid ederit, imple-
tur, & inflammatur, in motu
inhelatio, dolor, color albus,
quandoque subluteus. Quin-
ta, exit subluteum veluti ex
ovo, viscosum: Venter imus
intumescit & durus fit, dolet
ad tactum, dentibus stridet:
febris, animi deliquium. an-
xietas, perfrigeratio, sudor
multus. Pulsus ad manum ac-
celerantes, debiles, deficien-
tes, & statim pereunt. Sexta,
luxus est saniosus, fluit sub-
cruentus veluti à carnibus
assatis: mordet vt Muria, cor-
rodit, & ulcerat pudenda, &
Vterum, ac circumstantia, &
femora, & alias partes. Ve-
stes ea tinguntur, vt ægre elui
possint. Venter attollitur, &
durus fit: dolor, color vt Ar-
quati. In progressu causæ par-
tes attolluntur, & pedes in-
tumescent. Oritur maxime
ex Abortu, aut ex partu, cum
quid delaniatum fuerit. Tan-

q dem

362 *Artis Medicæ lib. 8.*

dem quicumque fluxus, nunc
tenuis est & aquosus, nunc
crassus, vel calidus, vel frigi-
dus. Exulcerans, mordens, sa-
niosus velut lotura carnis e-
xit post sanguinis fluxum: Pu-
rulentus in vlceribus, & sup-
purationibus. Purulenta, &
compacta post Abortum, aut
difficilem partum, si quid re-
lictum in Vtero sit, quod pu-
truerit. Tenuia autem & sa-
niosa ex toto corpore fluunt.

1. Mo. mu.

5. Aph. 36

Nat. mu.

Curatio. Qui ex vlcere tã-
tum Vteri fit, remedijs tãtum
ad Vterum eget. Qui ex toto
corpore, Purgatione totius
pro humorum vitio. Siccatio
in pituitosa, contemperatio
in biliosa. Ad fluxum album,
si adfuerit Alui fluxus, prius
astringentibus sistere oportet
ex cortice Papaueris albi &
rubri pari mensura, & fructu
Acanthæ, ides Acaciæ in Vi-
no diluto & insperso polentæ.
Adde & Malicorium torrefa-
ctum:

De Morb. Genit. 363

Stum: cibi sicci & frigidi.
Confirmato Ventre purgan-
dum prius per superiora, &
post purgationem, Lac Asi-
ninum. Iterum purgandum
per inferiora, postea Lac Bu-
balum per dies 40. Alibi & 2. Mo. mu.
Paul. purgat per Vrinam cien-
tia, & quæ caput purgant.
Abstinere à balneo, Potus E-
mithimi: Deambulatio: om-
nis reficcatio in victu. Itera- I. Mo. mu.
tis vomitibus, post fomenta
toti corpori adhibita tertia,
vel quarta quaque die ex mul-
tis & acribus oleribus & ci-
ois multis quos voluerit, &
multo vino aquoso, à quibus
vomat.
Post vomitum, victus ex
pane & aqua nullo obsonio,
quam Vino nigro meraco:
Melius autē esse, si prius per
Pharmaca purgetur. Ad flu-
xum solum & mixtum Bilē,
aut etiam pituitam purgare
per superiora & inferiora eo-

q 2 dem

dem modo per Elleborum, si
 non affuerit febris. Aet. Rha-
 barbaro. An & Myrabolanis,
 Tamarindis? Post purgatio-
 nem potiones astringentes, &
 contemperantes, Serum, Lac:
 ubi ex morbo aut medicamē-
 tis refectione egent. Papauer
 album, Vrticæ semen; & quod
 præstat, Mali Punici dulcis
 radix & folia: Rhas: Galla
 in Vino acerbo bibenda. Suc-
 cus Mali Punici: Caseus Ca-
 prinus.

Ad Vterum, si inflamma-
 tus est, & dolet. Fomenta,
 mollia, ablutiones, Subdititia
 emollientia: Lac Caprinum
 decoctum & refrigeratum,
 cum Mulsâ bibat. Cum ces-
 sauerit inflammatio, abster-
 gentia, & purgantia primum
 ex Vini sæce, postea ex Sca-
 monij succo ad bilem, Tha-
 psia ad Pituitam ex aqua, &
 Melle, & oleo Narcissino, aut
 Anethi: postea ex Vino, Mel-
 le

De Morb. Genit. 365

le & oleo: Deinde suffitus per
astringētia ex Malicorio. Ad
aquam fluentem Clyster in
Vterum ex Resina sicca, My-
rica folijs, Thure, semine Li-
ni in Vino tritis, & adipe An-
serino, Gallinaceo. Amylum,
farina purissima cum lana ad
os. Sulphur & Mandragoras
in Vino meraco ex lana. Dor-
miamat supina & immota. Vi-
ctus contemperans ex oleri-
bus refrigerantibus, Amy-
gdalis, Sesamo: Pisces saxa-
tiles. Caro Ouilla, aut volu-
cres, Leporina, elixa potius
quam assa. Deambulatio ma-
ne, & à cibo. Gestatio: Cur-
rus in declinatione.

De Procidencia Vteri.

Cap. 23.

Procidencia Vteri, De-
scensus, vt extra puden-
dum promineat magis, &
minus. In Partu ab expulsi-
3. na. fa. 3

q 3 ce

ce violentius cencitata, nam
2. Mo. m. m. simul decidit cum foetu. Post
 partum, si recens cum viro
 dormierit, aut defaticata. In
 fluxu muliebri, Vtero relaxa-
 to & humectato, & calefacto.
 Sterilibus maxime contingit.
 Euertitur os per cernicem ad
Nat. m. m. locum refrigerij: Calor senti-
 tur maxime ad pudenda & se-
 dem. Urina paulatim distil-
 lat & mordet. Cum penitus
 prolapsus est, dependet velu-
 ti Scrotum: Dolor in imo Ven-
 tre & Lumbis, ad Inguina. .
 Cum tempus processerit, non
 vult in suum locum redire: in-
 tumescit: morbus consenescit.
 Os durum semper extra: fluit
 humor saniosus. Si breui cu-
 retur, sana fit, sed sterilis re-
 linquitur. Aliquando retrusa
 instabilis est, ex quacunque
 occasione exit: cum supina
 fuerit, manet: Cum surrexe-
 rit, aut à somno expergisci-
 tur, aut se inclinauerit, exit,
 saepe

De Morb. Genit. 367

sape etiam dum quiescit. Aetius scribit, nō esse Vteri prolapsū à suis sedibus, ut multi putant, non enim restitui posset, sed euersionem esse, ideo quod prominet, esse simile ouo struthiocameli modo maius, modo minus. Sed mirum, quod scribit, aliquando putrescere totum quod prominet, & recisum sanari. Quod testari possum Romæ cōtigisse in pluribus: & quædam post excisionem, non solum sanata est, sed & concepit, & peperit. Quod fieri omnino impossibile esset, si id quod excidit, esset fundi Vteri pars inuersa. Potius putandum est esse, quas alibi idem Aetius, & Paulus Hæmorrhoidas Vteri vocat, pendentes modo ex ceruice, modo ex Vteri ore: quemadmodum videmus ex naribus Polypos pendentes, has Hipp. columellas vocat. Vidi aliquan-

*2. Mo. 367.
in f.*

q 4 do

do in muliere viragine paulatim ex pudendo egredi instar genitalis virilis inæqualis crassitudinis: hæc fluorem album patiebatur, aliquando rubrum. Curatio: Retrudere: Astringere: Reuellere ad superiora: Fluxionem sistere. Si parum egressus fuerit, retruditur manu: si valde, machinamentis. Astrictio ex Myrthi baccis, Loti ramentis in aqua decoctis. Refrigeretur decoctio noctu sub dio, & quam frigidissima perfundantur pudenda. Eadem trita pro Cataplasmate adhibeantur. Reuulsio per vomitum ex decocto Lentium Melle & Aceto donec Vterus fuerit eleuatus. Iaceat pedibus altioribus.

Graueolentia ad pudendum suffiantur: odorata ad nares. Cucurbitula ad Umbilicum Act. Duæ ad Ilia. Hipp. non ad coxas, vt praelegi-

De Morb. Genit. 369

legitur. Fluxio sistitur potio-
nibus ex Papauere, Caseo, &
polenta: Cibis mollissimis &
frigidis. Vinum aquosum al-
bum. Non lauetur, nec cum
viro dormiat. Si penitus pro-
lapsus: Ad dolores mitigan-
dos fomenta ad pudendum
refrigerantia. Quod extra
depurgare: abluere Vino ni-
gro incocto Malo Punico. In-
tro protrudere. Mel & Resi-
nam simul liquata intra pu-
dendum infundere. Spongias
fascia alligatas ad Lumbos.
Abstineat à cibis. Potu quam
paucissimo vtatur vsq; ad 7.
dies. Si non redeat, deradere
summas Vteri partes: abluere:
Ceratum picatum illini-
re. Pedes ad Scalam deligare,
vt caput deorsum pendeat: &
manu introtrudere, Scalam
concutere, crura inuicem
colligare: sinatur sic per no-
ctem & diem. Ptisanæ succum
frigidum modicū dato, aliud

q s ni-

370. *Artis Medicae lib. 8.*

nihil. Postera die recliano, & Cucurbitam quā maximam affigito ad Ilium, & multo tempore finito sine scarificatione. Sola Ptisana vsque ad 7. dies, si sitiat, aquæ modicum. Postea mollissimis & paucissimis cibis vtatur. Si Vētre exonerare oporteat, decumbens faciat, vsque ad

Nat. mu. dies 14. vel 40. Postea colluatur tepidis fomentis, melius ad solem calefactis: paucissime deambulet. Non lauetur. Ventrem ne solueris: Gestet subligas. Si multo tempore promineat vt refrigeratus, & stupidus redditus sit abluatur ex aqua calida: illinatur ex oleo, & Vino. Indito & deligato, & reliqua prædicta facito. Si iam infletur, etiam acetum ad aquam admisce-to. In aqua incoquatur Laurus, Myrthus, Absinthium. Oleum ne adhibeto, neque aliud pingue.

Si

De Morb. Genit. 371

Si instabilis sit. Intromitte
pomum Mali Granati perfor-
ratum ad Umbilicum magni-
tudine, quæ quadret: in Vi-
no picato calefactum: deli-
getur fascia, ne excidat. Aut
globum ex Hedera siccissima
trita linteo excepta: vt humi-
ditatem manantem excipiat.
In potu, Triticum recens, Pa-
pauer album, Salvia, Cype-
rus, Anisum in Vino diluta,
cum fursibus Hordei bis in
die. Si igitur Vteri Prociden-
tia morbus est in situ. Reme-
dia ab Hippocrate explicata
satisfaciunt. Si autem ex ge-
nere abscessuum sunt, vt Hæ-
morrhoides apud Paulum,
curantur reprimētibus, quod
si non succedat, abscissione:
quam coguntur præstare,
cum putruerit.

*De Vteri strangulatione, &
Histericis. Cap. 24.*

Strangulatio Vteri voca-
tur, seu suffocatio, cum

q 6 inter

inter cetera symptomata inducit priuationem respirationis. Hyſtericæ autem mulieres appellantur, quæ vitio Vteri huiusmodi symptomata patiuntur. Eorum causa difficilis cognitu visa est. Firma enim est fieri ob Vteri errores, impetentes varias partes, nunc Hepar, Septi transversum, Ventriculum, Caput, nunc inferiores, Coxas, Pedes. Citat Gal. Platonis verba: Vterum esse tãquam animal, & desiderio prolis petere diuersas partes, vnde Hysterici affectus oriuntur. Arist. Vterum protendi superius vsque ad Septum trãsuerſum, quod in ouiparis manifestum est, quia oua in superiori parte nascuntur, licet descendant ad incrementum. At in Viuiparis, vt in homine, licet deorsum foetus contineatur, membranosa tamen substantia ad Septum pertingit, vt carno-

sa

6. lo. af. s.

se. an.

II.

sa in ouiparis. Hinc fit, ut
inanis Vterus sursum adiun-
ctus strangulet. Locus enim
cum sit vitalis, motum per-
ferre non potest. Ex hoc pa-
tet inanitionem causam esse
contractionis Vteri, quæ com-
municata superioribus suffo-
cationem facit. Eadem est sen-
tentia Hipp. inquit enim: Si
suffocatio de repente accesse-
rit, fit autem maxime ijs, quæ
cum viris non coeunt, & se-
nioribus magis quam iunio-
ribus, leuiiores enim Vteri ip-
sorum sunt: Fit autem potis-
simum tunc, vbi mulieris va-
sa euacuata fuerint, aut plus
solito laborauerit, resiccati à
labore Vteri conuertuntur, ut
qui vacui sint, ac leues. Est
enim ipsis locus spaciosus, ut
conuertantur: vtpote Ventre
vacuo existente. Dum autem
conuertuntur, impetunt He-
par, & iuxta consistunt, & ad
præcordia irruunt. Currunt
enim

I. Mo. m. m.

enim & progrediuntur sursum
ad humiditatem; tamquam à
labore magis quam oportu-
num est, resiccati. Hepar au-
tem humidum est. Postquam
autem impetierint Hepar, suf-
focationem faciunt, de repen-
te per spirationē intercipientes.
Si interim descendat à ca-
pite pituita, simul cum deflu-
xu ad locum suum reuertun-
tur, & cessat suffocatio. Dum
strangulatur, mulier albas
oculorum partes subuertit, &
frigida fit, sunt autem & quæ
liuidæ fiunt, quædam etiam
dentibus frendunt, & saliuæ
ad os fluunt, & similes sunt
ijs, qui ab Herculeo morbo
detinentur. Quandoque vero
ubi mulier vasa euacuata ha-
buerit, & insuper laborarit,
Vteri conuersi ad Vesicæ sto-
machum allabuntur, & vri-
næ stillicidium inducunt, aliud
autem nihil mali habet, &
curata cito sanescit, quâdoq;
etiam

De Morb. Genit. 375

tiam sponte. Quibusdam
vero ex labore aut linedia, ad
lumbos aut ad Ilia allapsi do-
lores exhibent. Obtorquetur
autem Vterus quibus angu-
lus est, aut cervix procul à
pudendo sita: cum abstinere à
venere, quia humectare cupit.

Sed Gal. hanc sententiam 6. lo. aff.
refellit. Non ut à semine hu- 5.
meetur, sed ut semen pro-
prium excernat. Indicio quan-
dam viduam sanatam emissio-
ne semine, dum pudenda contre-
staret. Ideo Strangulationem
à repletionem fieri putat, aut
retentis menstribus, aut potius
semine. hoc enim si putrescat,
contrahere vim venenosam. In
libro de Virginū morbis scri-
bitur: Virgines viro maturas
pati vterinas affectiones una
cum Mensium descensu: antea
minime: Confluente scilicet
sanguine ad Vterum, si exitus
intercludatur: regurgitat e-
nim ad Cor, & Septum trans-
versum

uersum, à quibus locis tarde
refluit, quia Venæ insunt obli-
quæ, & locus periculosus ad
desipientiam & insaniam: mœ-
rores, stupores, & febres. Etiã
viro coniunctæ patiuntur, sed
magis quæ steriles. Hæc affe-
ctio à plenitudine quidem fit:
at non strangulatio. Aetius
flatuosam esse refrigeratio-
nem: nam semen in Vte-
ro paulatim coaceruatũ, aut
alia quædam materia insita,
ac putrefacta perfrigeratur,
& ad Cerebrum, aut Cor fri-
giditatem transmittit, vnde
accidentia dicta fiunt, Refri-
geratio totius, deperditio
pulsus, & respirationis. Si
acris & mordax, conuulsio-
nes facit. Si Melancholica, tri-
stitiam, animi deliquium se-
quitur ad magnitudinem af-
fectuum Cordis, aut Ventri-
culi. Communicari aliquan-
do Vtero à ventre, Hepate,
Liene: vasis repletis, vnde
Vte-

Vterus pendet. At si ex femi-
nis retentione in mulieribus
fiunt, cur non in viris? Sed
sanatio arguit potius ab ina-
nitione fieri, quam repletio-
ne. Hipp. Errores Vteri, & 3. Arziz.
contractiones consensus esse 100.
admirabilis scribit. Ex solo
enim eius motu, quocunque
inclinauerit, consensus fiunt,
tanto magis, si materiam
aliquam transmiserit, seu be-
nignam, seu malignam. A
quacunque autem occasione
Vterus propelli potest, si quid
mali habet. Nam frigiditas 2. Mo. mm.
Pedum, Lumborum, Saltatio,
Terror, lignorum sectio, Cur-
sus seu ad accliuem locū, seu
decliuem, & alia multa. Signa
cōsensus ad varias partes tra-
dūtur. Si ad caput, aliud alijs
indiciū. Deest suffocatio,
sed caput grauatur. Venæ in
naso & sub oculis dolent. So-
por altior tenet, & spumant,
vbi leuius habuerint. Sym-
pto-

ptomata Epilepsiae similia. Si ad Cor conuersio fiat, suffocationem facit. Aer violenter attrahitur, anxietas, vomitus. Quibusdam statim tractus deorsum, cedit, & flatus exit. Quaedam vomit spumosa: Quaedam quiescit manet.

6. lo. af. 5. Gal. hæc addit. Quibusdam

neque pulsus, neq; respiratio deprehendi potest: videretur mortua, nisi exiguum quendam calorem in medijs partibus haberet. Quibusdam exiguum respirationis signum apparet, si naribus admoueat floccus: aut flamma exigua: aut cyathus aquæ plenus pectori imponatur: deprehenditur enim quidam motus. Quaedam sine sensu iacent immobiles cum obscuro paroque pulsu vel nullo. Quaedam sentiunt, & moueri possunt, integra ratione, sed animi deliquium adest, & difficilis respiratio. Quaedam crura, & bra-

De Morb. Genit. 379

brachia contrahunt. Tandem
multas esse affectuum differē-
tias, vel pro causæ magnitu-
ne, & paruitate, vel speciei dif-
ferentia. Si ad Hypochōdria:
Suffocatio vt ab Elleboro, Or-
thopnea, Cordis morsus: &
cum ad summum peruenerit,
vomitus feruidus acris corri-
pit: & modico tempore mi-
tior fit: & dolor ad caput, &
collum penetrat. Si cito non *2. Mo mra.*
discedat, obmutescunt, tor-
por ad linguam. Si ad Hepar, *Nat. mra.*
muta repente fit, dentes con-
ferit: color niger: hæc fiunt
repente, dum sana est, præci-
pue virginibus antiquis, & vi-
duis iunioribus, quæ pepe-
rerunt; & sterilibus ex partu,
quia deest puerperij purga-
mentum. ijs non intumescit
Vterus, non mollitur, neque
vomunt. Si ad latus, tussis,
& dolor ad costas. Vterus du-
rus veluti pila, dolet ad ta-
ctum. Contabescit, videtur
Pe.

Peripneumonia: conuellitur,
gibba fit: Menſes omnino non
apparent, ſi aut cum apparue-
rint, euanescunt, & deterius
tunc habet. Si ad Lumbos,
aut inania: Spiritus ſublimis,
Suffocatio, Aſthma, nec mo-
ueri vult, nempe ob Lumbo-
rum dolorem. Si ad Ventrem
dolor acutus, & vehemens ad
Ilium, Lumbos, & inania,
Crus claudicat. Ad ſedem,
prohibet ſeceſſum, dolor ad
nates, imum Ventrem, Lum-
bos. Si ad Ilium, durities fit
ad mollitudinē: dolores Lum-
borum, Mollitudines, & imi
Ventricis, & Cruris: tenditur
& ſuppuratur: pereunt, niſi
ſeces aut vras. Ad Veſicam,
Vrinæ compreſſio, dolor in-
gens, ſi cito non ſanatur, ſup-
purantur quo decurrerint,
aut in mollitudine, aut in In-
guine, pectine. Si ad crura
& pedes, Pedum digiti con-
uelluntur ſub ungues: dolor
cru-

De Morb. Genit. 381

cruris & femoris. Hoc modo Vterus afficit omnes partes à capite vsque ad pedes.

Curatio Hystericarum.

Cap. 25.

Curatio Hystericarum, una ad symptomata; altera ad causas. Cum vrget, suffocatio, animi deliquium, dolor, conuulsio. Ascendens Vterum, aut euaporationem detrudere à superioribus: Allicere ad inferiora: iter intercludere. Digerere, Obstupescere, immobilem reddere. Truditur deorsum non repellentibus frigidis, vt in ceteris fluxionibus, sed grauiolentibus ad nares. Allicitur deorsum non calidis attrahentibus, sed beneolentibus ad Vterum. Hipp. An. *Nat. mu.* quia requiritur opus naturæ *1. & 2. Mo* expellentis & attrahentis? *mul.* expellit autem natura quæ cun-

cunque ingrata sunt, attrahit iucunda. Fertur sponte ad iucunda, aufugit iniucunda.

Natura autem spiritus qui in homine continetur, quo omnes operationes perficiuntur, abhorret foetida, gaudet odoratis. Ideo ad hæc allicitur, auertitur autem à foetidis. Recta autem ratione, Plato Vterum tamquam animal esse dixit: Impetu enim naturali fertur ad iucunda, auersatur autem iniucunda.

Quod in nullis alijs partibus adeo euidenter cōspicitur. Instrumenta enim sensus in suo genere lætitiā & tristitiā ostendunt: Auditus enim gaudet harmonia, dissonantia audire non potest. Oculi coloribus perfectioribus oblectantur, fuscis fastidiunt.

Omnes partes nutrimentum familiare attrahūt, inimicum expellunt. At Vterus præter hæc alium impetum ad prolem

De Morb. Genit. 383

em scilicet gignendam ha-
bet. Ideo ægre fert, cum eo
officio frustratur.

sed gaudet coitu, gaudet &
conceptu. Repleri loca non
quibuscunque appetit, sed ijs
quæ ad prolem faciant: inani-
ter ægre fert, & quasi indigna-
tur; ideo huc illuc commo-

uetur, vnde vterinæ passio-
nes oriuntur, præcipue Vi-

duis: & ijs quæ viro coniun-
ctæ sunt, sed steriles. Hæ nam-

que etsi multo sanguine re-
pletæ sint, non tamen ob id

commouetur Vterus, sed de-
siderio prolis. Nā postquam

Vterus à conceptu repletus
fuerit, non patitur commo-

tionem prædictas, nisi cum
infans nutrimento eget: Per

secutiones autem & inanitiones
sæpius commouetur, quia

ut inquit Hipp. Vterus levis
redditur: cum grauis est, quie-

scit. His prænotatis magis
oportet curatio. Ad Strangu-

latio-

lationem igitur sub nares suffitus fiant lanæ accensæ: pili vsti: Bitumen in ignem coniectum: Sulphur, Pix, cornu Cerui: Lucernarum extinctio: Coenū foetidissimum, Castorium. His etiam vidimus viros à sopore excitari. Ad Inguina, & foemora, & intus inungere vnguento odoratissimo. Nos Gallam muscatam ex oleo Rosaceo, Mosco, Ambra, Aromata quæcunque: Aqua Rosacea, Lamfa, ex floribus Myrthi. Digeruntur vapores pravi Castorio, aut Conyza, aut vtrisque in Vino potis. Radix Pæoniæ in Vino odorato: Coriandrum, Cuminum, Aristolochia, Peucedanum, Panax, Angelica. Nux Muscata, Gariophylli; Gutta olei Anisi per distillationem extracti, aut ex Vino, aut Mulsæ. Composita electuaria. Diaciminum: Triphera magna cum Opio, pilulæ

ulæ paratæ pro Matrice, nã
propiatæ sunt. Galen. Agarici 9. Cat. 10.
drachmam vnã, bibat cum
Vino: Onyx ex Conchilio.
acetum Scylliticum absor-
ptum. Plantaginis semen, &
succus: quod solum inter ce-
tera repellit: Ruta, Allium,
Cæpa: Indit in anũ Rutã cum
Melle lana exceptã: quæ om-
nia ad digerendum faciunt.
Aetius motum attractionis
deorsum adiuuat Cucurbitu-
la vtrinque sub Inguinibus
apposita. Iter intercluditur
Hipp. fascia ad Umbilicum,
aut sub Hypochondrijs, cum
prius manu deorsum expres-
sus fuerit flatus. Nos in ip-
sum Umbilicum grana duo
Moschi gossipio inclusi indi-
mus. Ad causas, sedata suffo-
catione. Si ex Mensium reten-
tione Aet. & Auic. Venæ se-
ctio ex basilica eiusdem late-
ris, in quem declinauerit Ute-
rus: Si non cesset suffocatio,

r

cx

386 *Artis Medicae lib. 8.*

ex Saphena, aut ex Poplite

Gal. Non si ex Spermate re-
tento, aut ex frigidityte. Hip.

Virg. mo. Virgines sola missione sangui-
nis curari: postea suadet, vt
cum viro cohabitent. Item.

Superf. Si virginum Menses maturi
non prodeant, & febricitent:
Dolet, sitit, esurit, vomit, fu-
rit, & rursus relipiscit. Vte-
rus mouetur, cum vertitur
ad viscera, vomitus a febris,
& delirium, vbi sedatur Vte-
rus, & illa quiescunt, esurit,
& sitit. Hepiala. Huic pelles
agninas calidas ad Ventrem
apponito, & suffitum ad pu-
denda, vt quam penitissime
admittat, ex Myrrha fabæ ma-
gnitudine, Thuris duplo ad-
mixta cū Zea fresa in ignem
dum ieiuna est: & multa cali-
da lauare. Apponere Arte-
misiā tritā Vino subactam.
Si prauī humores adsint, Pur-
gatio ex Hiera picra, aut pil-
lulis foetidīs Auic. Agarico
sæpius

apius iteratis. Hipp. Phar-
nacum deorsum purgans da-
re oportet, si quidem biliosa
uerit, quod bilem purgat: si
pituitosa, quod Pituitam.
Postea Lac Asininum coctum
bibendū prabeto, & Vterum
odoratis foueto: & medica-
menta subdito, quæ Vterum
purgant, per interualla fouen-
do cum odoratis. Hæc viduæ
facito, Virginem ne attingi-
to, inquit Hipp. Sed persua-
deto vt nubat: quasi hoc so-
lum sit remedium ad Vteri
furorem compescendum. At
vero ijs quæ castitatem vo-
uerunt, danda sunt, quæ ve-
nerem compescunt: siccan-
tia, & frigefacientia, Ruta,
Calamentum, semen Viricis
in potu: & folia substragulis.
Inunctio Lumborum ex oleo
Nymphææ. Victus refrigerās
ex Lacte, piscibus ex aceto:
salsamenta. Abstinere à fla-
tuosis, & multum replenti-
bus.

bus. Assis vti potius quam
elixis: modico VINO. Ad Vte-
ri errores ad diuersas partes
varia remedia. Si ad caput,
Nat. mu. multa calida lauare oportet
etiam in capite, incocta Lau-
ro, & Myrtho: Caput Rosa-
ceo illine. Odorata subter
applicentur, ad nares gra-
ueolentia. Edat Brassicam, &
succum sorbeat. Si nō audiat,
2. Mo. mu. frigido eodē lauacro vtatur,
etiam in capite. Auic. omni-
no contrariam curationem
adhibet. Nam ad commotio-
nem Vteri superfundit super
caput oleum odoriferum ca-
lesfactiuum, vt Nardinum.

11. Met.
18.

Si per remedia deorsum
vehementer trahentia non
redit anhelitus: effunde super
caput oleum feruens, aut Cau-
terium fiat in syncipite. An
hæc est communis ratio ad
excitandū sensum & extrahē-
dum extra, qua vtimur? In vi-
ris ex Gal. in principio repel-
lentia

De Morb. Genit. 389

lencia per oxyrhodinum, Extrahentia cum nihil influit. At non similis est curatio mulierū Hipp. inquit enim: Cum urgent symptomata, cum spiritus aceruatim sursum, commotus fuerit, & grauitas, & mens percussa, & loqui non potuerit, cum perfrigeratione, spiritus offendens, oculi obscurati; caput citissime exsicca: fascia obducito, & si oportuerit, ad Umbilicum dato Castorium, Conyzam, Rutę aquam, Cuminum, semen Raphani, Sulphur, Myrrham, Graueolentia ad nares, Beneolentia ad Vterum: Sternutatoria ex Vetro in naribus: Optimum eructare, sedentem collocare. Si ad Cor: Porri semen, & Papauer ex aquæ cyathis tribus bibat. Aceti albi cyathus potatus. Pæoniæ & Viticis semen, Abrotonum, Ruta, Iuniperi fructus, & Saluia, cum
r 3 aceto,

aceto, aut Vino. Calefacere
Glādulam supponere ex adi
pe Anserino Cerato resinato
& pice liquatis: Melanthior
ex Melle.

Si ad latera, Pharmacum
deorsum purgans: Lauatio ex
multa aqua calida: Fomenta
tepefactoria: Apponere, qua
sanguinem purgent. Semen
Lini torrefactum, & Papauer,
& Saluiam cum tenui polen-
ta ex Vino bibat ieiuna. Fre-
quens fomentum, & calida
asperfio, & Ceratum molle,
vt à Latere discedat: & latus
fascia lata deligato. Postea
Lac Bubalum ad dies 40. exhi-
beto: cibos quam mollissi-
mos. Nam morbus vehemēs,
lethalis, & paucae effugiunt.

Si ad Hypochondria: pri-
mum tepefactoria apponito,
& graueolentia ad nares, &
beneolentia ad Vterum: Dein
de bibat Myrrham, Corian-
drum, Resinam, Pæoniæ ra-
dicem,

dicem: Cuminum ex Vino albo, & aqua, aut Mulla leuiter tepida. Peucedanum, Cæpæ lachryma, Panax, in Vino, aut aqua Aristolochia, Apium, Fœniculum, Anisum, Piper, Opium. Cum dolores quieuerint, Pharmacum deorsum purgans, non supra: nam cæcitas imminet.

Si ad Hepar: depulsio cum manu fiat sub Hepate, aut præcordijs, & fascia deligato: & aperto ore Vinum odoratissimum infunde: Naribus graueolentia, Vtero beneolentia. Si fiat soporosa, Pharmacum infra purgans: postea Lac Asininum: Purgantia. Vterum interiectis fomentis odoratis. Si ad Lumbos, Glandula longa & crassa ad sedem ex Myrrha, & Melle, aut Bitumine, Sulphure, & Cicuta. Oleum calidum in Vterum infunde, fomentum. Desideat in aqua & oleo: Suffiat gra-

4 uco-

ueolentia odorata ad nares
 Cum dolor quieuerit, Phar-
 macum fursum purgans, non
 deorsum, nisi cum Vterus
 confederit. Postea Lac Asini-
 num. Si ad Ilium, Vterū odo-
 ratis fouere, dein digito re-
 uellere ab Ilio, & thædulis,
 aut fistulis plumbeis dirige-
 re. Si ad sedem, Calida laua-
 re, Fomentum Lumbis: Gra-
 ueolentia suffire & apponere,
 quæ Vterum purgant, & pro-
 pellant fursum.

2. Mo. mu.

Si ad Inguina, suffito Ca-
 prini stercoreis pillulas, & Le-
 poris pilos cum adipe Phocæ.
 Hederæ fructus, folia, & cor-
 tex ficcata: folia Quercus cū
 Resina & oleo: Bubalum ster-
 cus, & cornu ramenta, Bitu-
 men: Vinacea, Cedri baccas
 cum Resina pinea: Fomenta
 tepida ex stercore Bubalo,
 aceto, & Muria, incocto Er-
 uo, Sambuci folijs cum Myr-
 tho. Vomitus ex decocto leni-
 ticu.

De Morb. Genit. 393

ticulæ : Postea farinam for-
beat ex Vino : Vrinam cien-
tia, Ciceres, & Vux passæ de-
coctum, Saluia, semen Lini,
in Vino diluto & polenta. Si
ad Vesicam, odorata ad na-
res, graueolentia suffito ad
Vterum. Fomentum adhibe-
to, & pectinem illinito. Desi-
deat in decocto Rosarum, aut
Rubi, aut Myrthi, Oleæ, Pam-
pinorum vitis, Iuniperi bac-
cæ, Saluia. Ad stillicidium,
Myrrhæ suffumigium intra
pudendum per Cucumerem.

Si ad crura & pedes, multa
calida lauare, fomentum, si
ferre possit, Graueolentia
suffire: Femora inungere ex
Rosaceo. Si repente crura re-
frigescent, & genua, & ma-
nus; obmutescant: Cor vi-
bratur, dentium stridor, su-
dor, & alia, vt in Epilepsia.
His frigidam aquam multam
affundere oportet super cru-
ra, & manus, & alia facere

r 5 vt

ut prius dictum est. Nam
per antiperistasis reuocatur
calor.

*Mammarum constitutio &
vitia. Cap. 26.*

14. v. p. 4. 5
8.

1. Aph. 53

Mammæ ad partes ge-
nitales spectant: Lactis
enim gratia datæ sunt, ideo
magnus est earum consensus
cum Vtero. Nam simul intum-
escunt, cum incipiunt men-
strua in pubertate: & cum
concipiunt, augescunt cum
foetu; gracilescent in sene-
ctute. Attenuantur, cum in
Vtero foetus corrumpitur,
modo ambæ, modo altera, se-
cundum rectitudinem foetus.
In brutis tot mammæ, quot
sinus in Vtero. Nutriuntur
per Venas communes duas
ascendentes ex Venæ cavæ
bipartitione ad crura; & duas
descendentes ex axillari. Ca-
ro est spongiosa, glandulosa,
in

in qua insunt meatus exigui
frequentes ad papillas, vnde
fugitur Lac. Lactis generatio 4. Ge. an.
per concoctionem ex eadem 8.
materia, ex qua mōstrua: sup-
peditatur per Venas commu-
nes. Cum Lac effluit, defi-
ciunt menstrua: Cum conce-
perit, extinguitur. Si Lac mul 5. Aph. 32
tum effluat in prægnante, foe 39.
tus imbecillis redditur. Si Lac
habet neque prægnans, neque
puerpera, menstrua defece-
runt. Mammarum affectus in
Puerpera: Lactis defectus,
aut deprauatio. Lac in mam-
mis coagulatum: Dolor in-
fugendo: Tumores, Vlcera.
Lactis defectus ijs vt pluri-
mum contingit, quæ paucos
Menses demittunt. Quæ sic. Nat. pn.
ciores, & densiorem carnem
habent, aut natura sine Lacte
sunt, aut deficit ante tempus:
Huiusmodi sunt viragines. 1. Mo. mn.
Deficit etiam quibus sanguis
est paucus, vel vitiosus ex 5. Sim. ar.
r 6 mor-

morbo aut victus ratione. Iis,
 quæ natura tales sunt, non
 reuocatur Lac. Quæ ex mor-
 bo, aut praua victus ratione,
 curantur, refectione, & pra-
 uorum purgatione, & conco-
 ctione.

Gignunt Lac alimenta bo-
 ni succi humida & tepide ca-
 lida: ad naturam sanguinis
 accedentia: quia Lac calidius
 est pituita, paulo frigidius san-
 guine. Medicamenta pitui-
 tam concoquentia, calida in
 primo aut secundo gradu, non
 siccantia. Potiora sunt, quæ
 simul nutrimenta sunt, & me-
 dicamenta: Eruca, Fœnicu-
 lus, Anethum: non herbæ sic-
 cæ, sed virides. Smyrnum,
 Apium, Sion, Polium. Paucæ
 sunt huiusmodi. Sed quæ Lac
 ficcant, multa sunt, siccantia
 omnia tum calida, tum frigi-
 da, partim quia sanguinem
 minuunt, partim quia vitiāt.

Na. mu. Hipp. Calida lauetur, & sub-
 cali-

3. *De Morb. Genit.* 397

calidum bibat, Foeniculi semen & radicem Hippomara-
tron, Hipposelinon simul co-
ctas cum Butyro. Porrum tri-
tum aqua dilutum. Brassicam
edat, Cytisi folia simul cocta,
& succum sorbeat. Saluam,
Cedri aut Iuniperi baccis ad-
iectis coquat, & decocto Vi-
num affundat, & bibat. Ad
cetera farina inspersa, addi-
toq. Bulbo & modico oleo
edat. Vitet acra & acida, &
falsa, & cruda olera omnia.
Nasturtium in Vino potum,
commodum est, nam Lac pur-
gat. Hordeum mollitum, ac
Butyrum simul coquito, &
frigidum bibat: Caseus Ca-
præ. Viticis fructus in Vino:
Betæ succus potatus multum
Lac facit. Sefamum recens &
Hordeum trimestre trita in
mortario, & succum expres-
sum, & Mel aut Amamelidas,
idest Azaroli fructus misce,
& Vino nigro affuso bibat.

I. Mo. 1724.

Paul.

Paul. non frequenter medica-
mentis vtendum.

De Lacte vitiato. Cap. 27.

Vitiatur Lac à prauis hu-
moribus, victu prauo,
& à coitu Paul. & Aet. à con-
ceptu non solum vitiatum, sed
& tollitur. Discernitur colo-
re, odore, sapore, crassitie
& tenuitate. Optimum can-
didum, dulce, beneolens, me-
diocri crassitie, vt neque Se-
rum, neque caseus superet.
Paul. Discernitur crassities si
vngui instilletur, vt neq; su-
bito neque tarde diffluat, Ae-
tius pilo Lacte madido & su-
spenso, vt æqualiter hæreat.
Si non hæret, liquidius est:
Si guttulæ hærent, crassius.
Colores alieni linteis candi-
dissimis Lacte madidis, & in
vmbra siccatis. Acredo & fal-
sèdo partim sapore, partim
effectu cognoscitur. Nam
aut

De Morb. Genit. 399

aut papillas exulcerat, aut
infantis os : excretionem in-
fantis plures, mordaces. Cras-
sum Lac tubercula parit, Ven-
trem cohibet, & Vrinas. Indi-
catur igitur prætorum humo-
rum purgatio. Aetius recu- *5. Sim. 21.*
fat prorsus : præsertim si nu-
trices solitæ sint eo vitio la-
borare dum lactant : sed sola
victus ratione contentus est.
Nam pharmaca purgantia
infantes lædunt. Si cogantur,
eo tempore infans alia nutri-
ce utatur : nisi etiam puer
egeat purgatione. Quæ falso
humore abundant, Balneis,
& Vini diluti potione utan-
tur : In cibo assumant Lac ex
alijs animalibus, probatissi-
mum est, quod forma & simi-
litudine humani speciem re-
ferat. An Asininum? Ptisana:
idem victus ad biliosum. Ad
tenue & ferosum, non Bal-
neum. In victu Alica, Oua
forbilia, pedes & extremita-
tes

tes porcinae, Hædinæ, Volu-
crum teneriorum carnes; Vi-
num dulce, quies. Ad Craf-
sum, victus attenuans, Bal-
nea frequentia: vomitus ex
oxymelite, labores. Si Lac
cohibere oporteat, aut quia
mortuus sit infans, aut alia
ratione non libeat lactare: Vi-
ctus exsicicans modico cibo,
& potu. Mammis imponen-
da, quæ Lactis cōgelationem
prohibent. Crocum cum ouo,
& oleo Cyprino, Aet. aut cum
Foenogræci succo aut Cumi-
ni decocto. Quædã solo Cro-
co vtuntur inter mammas:
Cæra alba trium granorum
Erui magnitudine deuorata
singulis diebus: Terra Cimo-
lia ex aceto, & aqua, & oleo
Rosaceo imposita: puluis mar-
moris albi eodem modo. Si
multitudine Lactis mammae
inflammantur, vnde febres
Puerperis oriuntur de natura
Ephemeræ, priusquam putre-
scat:

scat: quod vt plurimum primiparis contingit, cum Lactis egressus per vias angustas fit. Quandoque etiam febræ ad papillas definentes conuellantur, vnde dolor infugendo, qui morbus pilaris vulgo appellatur, & *Setole*.
-lis in processu à nimio calore Lac retetum coit in grumos: Vnde insequitur mammarum durities & dolor ad tactum. Curandæ in initio molliter repellentibus ex Posca cū spongia Dein concoquere oportet, emollire, & digerere. Cataplasma ex palmulis cum pane & Posca. Vincire, & moderate constringere. Furfures in aceto coctos cū Rutæ decocto: Menta cum polenta: Juglans cum Ruta, & Melle, ouum totum cum Rosaceo: Ricini folia, & Cuminū cum polenta: Capita Papauerum cocta cū Melle: Crocus cum Lacte: Muria fomentum:

Apium

Apium viride, quod & grummos dissoluit; Alumen & Psyllium cum aceto & Coriandri succo: Pyrites cum Rosaceo, & aceto Lac restringunt. Aet. Si distentio oborta est, Paul. Panis ex Hydræleo, aut Mulso: Panis cum Parietaria viridi & Carato bis in die. Perfusio ex oleo calente dulci. Fouere ex decocto Fœnogræci, Althææ, seminis Apij. Delinire ex polline farinæ seminis Lini, Fœnogræci, cum Hydræleo, Sesamo, cum Melle & Butyro. Cauere, ne Lac sugatur, nam attrahit: Concedit tamen Aet. in principio, ne coeat. Si suppurauerit: secundum.

a. Mo. mu.

Fiunt aliquando in mammis tubercula dura nunc maiora nunc minora: ob retentionem menstruorum, quæ non suppurantur, sed semper fiunt duriora: Deinde ex ipsis Canceri occulti nascuntur. Præcedunt

De Morb. Genit. 403

cedunt oris amaritudo : quæ cum ederint, omnia amara videntur : mente percelluntur, oculi duri : Ex mamma ad iugulum & sub scapulis dolores fiunt, sitis, mammae graciles, & totum corpus attenuatur. Cū peruenerint ad hæc, sanæ fieri non possunt. Si antea curentur, vt Menses soluti fuerint, euadunt.

De Genitura, & virilium genitalium constitutione. Cap. 28.

Genitalia eadem esse in mare & femina testatur Galenus, solum positione differre, nam in mare foras egressa esse ob caliditatem, in femina intro condita. Viri genitale proportionem respondere Vtero, esse enim Vterum inuersum foras egressum ex peritonæo vnâ cum testiculis. Vnde aliquando immutatum sexum

14. vs. pa.

6.

2. Sem. 5.

sexum in adultis scribitur.
6.Ep. | vlt. Phætusæ & Namysia cum
 prius fœcundæ essent, corpus
 virile factum esse. At non pu-
 tandum est muliebria extra
 prodijisse: non enim Hippo-
 crates tentasset mēstruas pur-
 gationes. Præterea si genita-
 le esset Vteri inuersio foras,
 procidentia esset absq; mea-
 tu ad externa: Neque testes
 penderent ex vasis supra os
 pubis: sed aut intro laterent,
 vt in ouiparis, aut prodirent
 infra os pubis. Non solum,
 igitur positione, sed & figura,
 vt patet, atq; alijs differentijs
 differunt.

Genitale ex osse pubis du-
 plici exortu dextro, & sinistro
 producitur extra, veluti duo
 corpora coniuncta in vnicam
 glandē: quemadmodū Vterus
 in brutis bifidus in vnicū os,
 non absimile glandi. Eius
 substantia nulli alij similis,
 neruosa vt ligamentum, sed

15. vs. pa.
1.

ca-

De Morb. Genit. 405

cauernosa, vt flatu distendi
possit, qui ex Arterijs proue-
nit in coitu. Meatus seminis
communis cum ceruice Ve-
ficæ dilatatur in tentigine ad
seminis projectionem recto
itinere: Flectitur hic in Semi-
spadonibus ob vinculū, quod
præputium cum glande ne-
ctit: quo exciso foecundi sunt.
Genitura ex testiculis proue-
nit per vasa seminaria eiacu-
lantia sursum retractis: Con-
fici vult Galenus in testibus.
Arist. non confici, sed per-
fici tradit in testibus: inquit
enim: Testes alijs intus, alijs
extra, propterea quod ijs
quoque operimento & vela-
mine opus est, tum vt seruen-
tur, tum vt semen genitale
perficere possint; non enim
posse fieri potest, vt frigentes & ge-
lidi possint retrahi atq; emit-
tere genituram. In libro de
Genitura, qui adscribitur Hip-
pocrati, scribitur, ex toto cor-
pore

15. vs. p. 2.

3.

1. Ge. An.

12.

pore ab omnibus partibus
prodire: humido spumescen-
te id quod robustissimum est
& pinguiissimum secerni, & ad
spinalem medullam venire, &
ex cerebro in Lumbos, & me-
dullā: Ex medulla ad Renes,
à Renibus ad pudendum per
medios testes.

Exestos autem infœcun-
dos fieri obcæcatis meati-
1. Ge. 47. bus. Arist. autem semen esse
18. excrementum vltimi alimen-
ti, quod in corde fit, ideo vti-
le: & ad omnes partes tende-

1. Sem. 12 re: Quod & Gal. significare
videtur, tradēs gigni semē in
omnibus Venis & Arterijs,
quo partes albæ alantur. Na-
turam genituræ inquit Arist.

2. Ge. 47. 5 similem esse cerebro, aquosa
enim est materia: ideo in coi-
tu immodico oculi languent,
quia sedes eorum maxime
4. Prob. 2. feminalis est. Iterum: Oculi
& Renes vim ad procreatio-
nem maximam obtinent. In-
dicat

De Morb. Genit. 407

dicat Venæ sectio post aures:
si enim inde multus sanguis
extrahatur, infœcundos fie-
ri testatur Hipp. Ad testes igitur *Ac. 49. 9.*
tur ex toto corpore, & magis *Ex de Gen.*
ex cerebro per spinalem me-
dullā genitura pervenit: ibiq;
perficitur, & nimio coitu ab-
sumitur albarum partium nu-
trimentum. Paul. Testiculo-
rum tunicas ex peritonæo ha-
berit, vasa autem ex spinali
medulla: At certum est ex Ve-
nis & Arterijs prope Renes
ortū ducere. Vitia contingūt,
Infœcunditas, vt Sterilitas
in muliere. Gonorrhoea, Pria-
pismus: Ulcera, Testiculorum
tumores: Hernia.

De Infœcunditate. Cap. 29.

QUæcunque intemperies
viri tam simplex quam
composita infœcun-
dum semen facere potest si
magna fuerit: vt de sterilita-

te

te mulierum dictum est: Si vero modica, corrigi potest à contraria qualitate Vteri: vt

5. *Aph. 62* Galenus ex Platone colligit,
1. *Na. hu.* & ex Hipp. Idem Arist. testa-
12.

4. *Ge. an. 2* tur, Moderationem quandam
requiri temperamenti ad foe-

cunditatem, ideo quidam

non inter se foecundi sunt.

idest tam vir, quam mulier:

sed cum alijs foecundi repe-

riuntur: idest modicæ intem-

peraturæ similes cum simili-

bus infoecundæ, cum contra-

rijs autem foecundæ. Alio mo-

5. *Aph. 63* do videtur Hipp. in maribus
infoecunditatem colligere:

cum inquit: Aut propter cor-

poris raritatem spiritus ex-

tra fertur, vt semen non

transmittatur ad os, aut pro-

pter spissitudinem humor nō

exit foras. Vel propter frigi-

ditatem non concalescit, vt

colligatur ad hūc locum. Vel

propter caliditatē hoc idem

accidit. Galenus eum Apho-

rismum

rismum non approbat. Simi-
li tamen modo in maribus ut
in feminis : ad densitatem, &
intemperiem reduxit : sed in
masculis amplius ad rarita-
tem. Sed Galenus modum
non videns, ideo negavit. Ob-
laxitatem igitur infoecundos
fieri viros testatur Hipp. pa-
tere apud Scythas. Cēs enim
ea minus foecunda est ob cor-
poris laxitatem, quia infan-
tes non stringuntur fascijs, &
adulti in ocio degunt : Ven-
tres mollissimi, & ob aeris
frigidityatem frigidi, unde
coitum non appetunt : Acce-
dit Venæ sectio post aures,
unde multus sanguis exiens
sterilitatem facit : nam mul-
tus spiritus exit, qui in capi-
te est. Semen igitur infoecun-
dum redditur, quia sine spi-
ritu est : & non incalescenti-
bus humoribus præ frigore,
non generatur spiritus. In cor-
poribus igitur rarioribus, in-
quit

Aer. aqu.
10. 11.

quit Hipp. spiritus extrafer-
tur, idest exhalat, vt semen
non transmittatur ad os: eget
enim multo spiritu vt diriga-
tur semen ad os Vteri. Quod
autem subiungitur: propter
spissitudinem non exit foras:
vel propter frigiditatem non
incalescit, vt colligatur ad
hunc locum: significat, non
ad os Vteri, sed ad testiculos,
vnde fit eiaculatio. Materia
enim seminalis in toto cor-
pore existens, præcipue in ca-
pite, ob spissitudinem, idest
meatum angustiam nõ per-
uenit ad testiculos, vnde est
exitus foras. Nam in libro
de Genitura, inquit: Quibus
iuxta aures Venæ sectæ sunt,
hi coeunt quidem, & genitu-
ram emittunt, verum modi-
cam & debilem & infoecun-
dam, quia plurima genituræ
pars à capite iuxta aures in
spinalem medullam proce-
dit, ipse autem transitus cica-
trice

De Morb. Genit. 411

trice sectioni inducta consoli-
datus est. At vero pueris ve-
nulæ tenues, & repletæ exi-
stentes genituræ transitum
impediunt: & quæ sequuntur.
Densitas igitur in viris hoc
modo infœcunditatem parit.
Reliqua manifesta sunt: Nam
frigida intemperies genituram
inualidam præstat, quia sine
spirituosa substantia, neque
fertur ad hunc locum, neque
si feratur, foecunda est. ut
contingit ijs qui superfluo coi-
tu utuntur. Ob eandem cau-
sam, quibus varices adsunt,
infœcundi sunt, Arist. quia 4.Pro. 21.
spiritus ad varices deflecti-
tur. Propter caliditatem au-
tem idē accidere inquit Hip.
idest non colligi ad pudenda
semen, dissoluta magna par-
te genituræ. Alias infœcun-
ditati causas affert Aetius: vi-
tia scilicet instrumenti, exci-
sio testium, aut vasorum at-
ritio, quibus meatus obca-

f 2 can-

1. Ge. an.

6.

2. Ge. an. 5

cantur. Pudendi canalıs non rectus, obstructus: brevis, ut non pertingat ad os Vteri. Etiam longior, quia in itinere semen refrigeratur. Signa foecunditatis genituræ: probatio in aqua. Nam quæ aquosior est, tenuis & frigida, diffunditur cito & supernatat. Quod foecundum est, ad imum descendit, quia calidum, concoctum, densum, & crassum est. At si eius substantia spumosa est, debuisset ascendere: An veluti spuma est, non spiritus, sed in spiritum facillime vertitur? ut Argentum viuum quamvis spirituosā sit substantia, grauißima tamen est, antequam in spiritum vertatur. Si igitur huiusmodi est genitura foecundissima, non est necesse extendi per Vteri cavitatem, & tectorij modo illiniri, ut Galenus putat. Sed rationi magis consentaneum est, oui instar vndique complecti

De Morb. Genit. 413

plecti ab Vtero: sic enim intra membranam conceptus fieri potest lineis in vnum, Umbilicum coeuntibus, vt traditur in libro de Natura pueri. Curatio infœcunditatis Ad habitus laxiores, pingues, & pituitosos: Victus ficior ex ijs quæ boni succi: Exercitatio: Modicus somnus: Non balnea. Ad densiores & duriores, & qui multis laboribus assueti sunt: Victus humectans: Balnea aquæ dulcis: Inunctiones: Exercitationes moderatæ: Somnus moderatus. Ad frigidos vel in regione frigida: Aromata in cibis: Vina generosa: Ad Calidos, vel in regione calida, in Aestate, Refrigerantia, olera, fructus, Cucumeres, Melopepones, Ficus, Vuæ, Cerasa, Pruna, Persica, Pomma. Omnibus conueniunt Gignentia semen, & Veneremproritantia, cum bona temperies

peries acquisita fuerit. *5. Sim. 23.* Gnunt semen cibi, qui bene nutriunt, & flatuosi sunt, ac tota substantia familiares. Calidi & humidi. Bulbi, Cicer, Faba, Polypus, Ostrea: nuclei Pinei, Pistacia, semen Lini, Eruca, Menta inter medicamenta, Satyrion, Scynus. Extingunt quæ contraria sunt, siccantia, & refrigerantia. Ruta, Vitex, Nymphaea. Vir non sit ebrius, neque Vinum album bibat, sed fortius & meracius: Cibos edat fortissimos: Non lauetur calida, & robustus sit, ac sanus. A cibis abstineat, qui ad rem non conducunt. Monet Aetius abstinendum à venere superflua: nam frequenti usu semen inualidum fit, non concoctum, ut aliquando sanguis exeat. Aduersus salacitatem, refrigerantia, non solum in victus ratione, sed & balneis & unctionibus ex Rosaceo,

San.

De Morb. Genit. 415

Sandalino ad Lumbos & Testiculos. Multi hodie ex maleficio redditi sunt infocundi, alij omnino impotentes ad rem veneream. Meretrices ut plurimum hæc perpetrant opera demonum: aliquando ut cum solis ijs exercere possint rem veneream, cum alijs nequaquam. Aetius merito causam hanc occultam esse scribit. Hipp. apud Scythas creditum esse, euiratos fieri a dijs: Dæmones enim deos putabant. ideo illis munera ferebant, ut inquit, decepti a sacerdotibus. Nititur autem ostendere eorum causas esse naturales. Sed hæc non pertinent ad nos.

Ad vitia instrumentorum: Si per excisionem, aut attritionem testium, vel vasorum, meatus obæcati sint, incurabiles sunt. Si canalis pudendi obstructus sit a carne super vlcus excrecente, exteri potest,

test, vt in Vrinæ difficultate dictum est. Si canalis intortus ob vinculum vt in semispadonibus: Vinculi sectio fieri potest, vt sub lingua apud Gal. Alia vitia ab ortu, seu breuitatis, seu longitudinis tolli nequeunt.

De Gonorrhoea. Cap. 30.

Gonorrhœa idest Genitura profluuium, communis est maribus cum mulieribus: Aet. Nam fluxus albus sæpe est ipsius seminis. Est excretio seminis morbosa, in qua tabescit corpus, decoloraturque. Fit soluto robore vasorum seminalium, vt semen non retineant. Vel irritata expultrice: Gonorrhœa est inuita seminis effluxio, vt in vehemētibus Epilepsiis ob conuulsionē totius: hæc in solis vasis spermaticis fit ijs, qui genitale semen copiosum cal-

Defin.

14. vs. pa.

10.

6. Tu. sa.

14

De Morb. Genit. 417

calidumq. gignunt, quod
ad sui expulsionem proritat.
Vnde os Ventriculi resolui-
tur, & totum corpus relaxa-
tur, imbecillis, sicci, graci-
lis, pallidi, cauisq. oculis.
Laduntur etiam à coitus ab-
stinencia: Nam capitis mole-
stia, & stomachi fastidia fiunt.
Augetur & nocturna polluti-
tio, vnde eadem incommoda
reuertuntur. Qui multo semi-
ne abundant & fluido, quasi
arbor in fructificatione luxu-
rians, ob maximas in vene-
re voluptates, & molestias
insaniunt. Oriri solet in mor-
bo, quem Hipp. Typhon vo-
cat: ex atra bile calefacta, *Ani.mo.6*
vnde cutis nigredo: tenuis fit,
& valde gracilis: grauatur à
cibis, gaudet odore lucernæ
extinctæ: frequenter semen
per somnum effundit, sæpe
etiam inter eundem: Corri-
pit post annos 29. Si non cu-
retur, perseverat annos 20. *Int.aff.*

¶ 5 In

2. Mor.

In Tabes dorsali: Corripit maxime recentes sponfos, & Ventri deditos sine febre. Bene cibum capiunt, ac consumuntur. Sentiunt à capite in spinam veluti formicas descendentes. Vbi mingit, aut aluum exonerat, prodit semen multum & liquidum, minime foecundum, & in somnis semen profundit: Anhelatio in cursu, aut ascensu, imbecillitas, capitis grauitas, aurium sonitus. In progressu temporis febres fortes lypiriae

6. in 6. Ep.
in fi.

perdunt. Satyrus cū esset 25. annorum saepe per somnū semen effudit, & interdū frequenter prodibat. Anno 30.

4. Ep. in fi.

tabidus mortuus est. Nicippus in febribus per sompnum semen effudit, & nihil ad piras processit. Sæpe id factum, & nihil læsit. Desuit, postquam febres iudicatæ sunt, vt prædictum fuit. Nam coitus morbis ex pituita commodus est.

Cau.

Causa explicatur, quia exitus ^{5. in 6. Ep.}
est excrementi pituitosi. In ^{23.}
morbo crasso apud Hipp. te- ^{4. Pro. 17.}
stes contrahuntur, calor, & ^{Int. aff.}
dolor ad sedem & Vesicam;
sæpe per somnum semen effun-
dit; genitura subcruenta, &
subliuida, quæ in coitu. Mor-
bus 6. annis curabilis, alioqui
ad annos decem peruenit, sæ-
pe ad mortem. Incipit in Au-
tumno vt plurimum, & ex usu
fructuum, pomorum, ob ca-
lorem Solis, & aquæ potum.
Alius est affectus Gonorrhœe
similis, quem vulgo vocant
Sfilato. Saniei fluxus ex vlce-
re intra pudendum, aliquan-
do cum dolore cum vlcus re-
cens est, & inflammatum.
Aliquando sine dolore, cum
inueterauerit. Aut nullo exi-
stente vlcere manifesto, sanio-
sus fluxus exit ex vasis sper-
maticis, aut ipso semine in
saniem conuerso, aut humo-
ribus prauis ad eam partem

confluentibus, ut in muliebri
fluore contingit. Signa: Di-
stinguitur semen à sanie, visu,
loco, & modo exeundi. Nam
semen album est: Sanies varij
coloris. Semen nonnisi ex va-
sis spermaticis: ideo Lumbo-
rum calor adest, aut dolor te-
sticulis communicans. Sanies
ex ulcere in pudendo, aut ex
eius dolore cognoscitur, aut
quia prius exit quam Urina:
etiam digitis exprimi potest.

6. lo. af. 6. Seminis effusio ob expultri-
cem irritatam cognoscitur,
quia cum tentigine fit, & ima-
ginibus nocturnis. irritatur
autem aut à copia seminis,
aut caliditate partium: Imbe-
cillitatem autem retentricis
significant, emissio inuolun-
taria sine venere & sine ima-
ginibus nocturnis, Hanc so-
lam Gonorrhœam ponit Cel-
sus. Fieri hanc tradit Aet. ex
seminis colliquatione ob vsū
calidorum: quod solet præ-
stare

De Morb. Genit. 421
flare Menta. distillat autem
continue humor in puden-
dum. Sed hic præcipue dege-
nerat in fluxum saniei Prog-
nostica. Gonorrhoea, si cito
non curetur, transit in Ta-
bem, quam Dorsalem vocat
Hipp. quia nutrimentum tol-
litur albarum partium. Quæ
in temperamento pituitoso
contingit, aliquando utilis,
Paul. inquit: Veneris hæc sunt
commoda: repletos inanit,
corpus agile reddit, in aug-
mentum promouet, & magis
virile efficit. Intelligentiæ
viu instaurat, mitigat iratos.
Melancholicis remedium ac
commodatissimum, sensus
integritatem restituit. Alij ci-
bum respuentes, appetentiam
recuperarunt. Quidam à con-
tinuis per somnū veneris ima-
ginibus liberati. At in habitu
Melancholico periculū ne in
insaniam trāseat. ex Platone:
Nam Melancholici libidinosi
sunt,

*Quod an.
mo. 6.*

4. Pro. 31.

sunt, ob flatum, & animi perturbationibus lætitia, & tristitia maxime agitatur ex usu veneris. Sanici fluxus putredines inducit, vlcera, & consumptionem.

Curatio Gonorrhoeæ. Cap. 31.

Curatio Gonorrhoeæ ob seminis multitudinem, in temperamento calido, & humido: Victus frigidus, & siccus. Medicamenta semen extinguentia: Aliquando euacuatio seminis: Reuellentia. Cibi cōditi ex aceto, Omphacio. Carnes volucrum assæ, Hœdinæ, Vitulinæ, Milium, Far, Oryza, Lens, Cucurbita, Lactuca, Cicorium, Pyra, Mala acida, Punica, Limones: Vinum rubrum austerum, aqua extinctionis ferri. Aet. Medicamenta, Viticis semen, assidue vescatur Rutam, semen Cannabis, Coriandrum torrefactum. Solanum non permittit in som-

6. Th. fa. 4

somnis semen effundere. Ex. 2. *Diet.*
trinsecus Balneum aquæ dul-
cis: melius Balneum de aquis.
Post Balneum, inunctio Lum-
borum ex oleo Omphacino,
Rosaceo, Melino: aut cerato
admixto succo Semperuiui,
Solani, Umbilici veneris, Psyl-
lij, Polygoni, Portulacæ, Tri-
buli, Lactucæ, cremor semi-
nis Lini, Lamina plumbea. In
stragulis folia Viticis, Rutæ,
Pampinorum, Rosarum. Ca-
uere obstupescientia ex Pa-
pauere, Mandragora, etiam si
robusti sint. Reuellentia exer-
citatione partiū superiorum
magis, vt ludis parua pilæ,
Follis: Frictione ex pannis
asperis vsq; ad ruborem, dein
ex oleo: vt postea reficiatur
ex modico pane in Vino dilu-
to, deinde tendat ad cōsuetā.
Sic corrigi Ventriculi mole-
stias. Euacuatio seminis post
aliquot dies, cū se continue-
rit, post mediocrem coenam,
ante

ante somnum coeat. Postera
 die cum satis dormierit, fri-
 ctionibus dictis vtatur. An-
 tidotum magnæ celebritatis
 Aet. Recipit seminis Salicis
 drach. 7. Calamintæ drach. 6.
 seminis Viticis drach. 5. Rutæ
 drach. 4. Seminis Cicutæ dra-
 2. Cum aqua pastillos forma.
 Dosis nucis Auellanæ magni-
 tudine cum Posca cyathis 3.
 Cortex radice Halicacabi ex
 aqua. Aufugiāt esum acrium
 omnium. & multi Vini po-
 tum, & olera. Vtatur siccanti-
 bus & astringentibus: Modi-
 ce lauandum: melius ex frigi-
 da, si nihil prohibeat. Balneū
 ex Albulis etiā in potu. Nos
 habemus aquam Villensem.
 Stratum non valde molle ex
 pellibus, decumbat in latus,
 non in Renes, ne Arteriæ su-
 percalefiant. Celsus præcipit
 vehementes frictiones, & na-
 tationes quam frigidissimas,
 & perfusiones. Nec cibi, nec
 potio

De Morb. Genit. 425

potio nisi frigida. Vitare cruditates, omnia infantia. Fovere partes internas ex decocto astringentium. & Cataplasma imo Ventri, Inguinibus, præcipue Rutam ex aceto.

Ad Atram bilem irritantē. *Int. Aff.*

Vētreū superiorem purgato ex Elleboro nigro, & inferiorē ex ScamONIO. Deinde Serum & Lac Bubalum aut Caprinum pro tempore exhibeto. Dato & Lac Asininum decoctum ad purgationem. Cibus autē quos vult assumat, & quam maxime nutriatur. Deambulet coniectura facta ad cibos. Iterum in morbo crasso, vbi subcruentum semen exit, aut subliuidū. Hip. purgat ex Cneoro, Hippophæ, grano Gnidio; deinde Lactis Asinini cocti heminas 8. bibendas dat Melle affuso. Post purgationē nutrit cibis oportunis. Si cibos ferre nequeat præ febris, sorbitiones

2. *Morb.*

nes ex Lenticula: pro potu Vinum nigrum, quam maxime austerum. Ad Tabem dorsale: Si ab initio curandū suscepis, fomento per totū corpus adhibito, Pharmacum sursum purgans, postea Caput purgato: deinde Pharmacū deorsum purgans: optandum id in Vere. Postea Serum & Lac Asininum: Ceterum Lac Bubulum per dies 40. ad vesperam utatur Halica: à cibis abstineat. Post vsum Lactis molli- bus reficito. initio modicis, & quam maxime crassum, & pingue fieri studeto, per annū ab ebrietatibus, & Venere & laboribus abstineat exceptis deambulationibus: Vitet frigus & salem: lauet tepida. Ad Saniei fluxum: dū vlcus inflā- matū est, repellentia. Succus Plantaginis, Solani ex aqua Rosacea, aut Hordei instilla- tus in meatū, & extra linteis intictis impositis. Vnguentum Rosa-

De Morb. Genit. 427

Rosatū. Sanguis Testitudinis
ad Lumbos instillatus. Cū ces-
sauerit inflammatio, si perse-
ueret fluxus, abstergentia ex
aqua hordei; Melle Rosaceo,
Thure. Ad diuturnum fluxum
optimum remedium Terebin-
thina lota cū aqua Rosacea,
uncia semis deuoretur inuolu-
ta in pasta, & superbibat a-
quam Hordei cum Melle Ro-
saceo, diebus quinque conti-
nuis. Aut Resina Terebinthi
ex Cypro eodem modo. Idem
præstat Mastiche drach. duæ
in ouo sorbili insperso pulue-
re. Etiā Terebinthina si bullie-
rit in aqua addensatur, vt cō-
minui possit in puluerē, qui
eodem modo exhibeatur. Caf-
sia cum semine Viticis ad Al-
uam exonerandam.

De Priapismo. Cap. 32.

Priapismus, Satyriasis, Sa-
tyriasmus, iuuenibus cō-
tingit, & in pueris adultiori-
bus. Est Colis erectio in lōgi-
tudi.

14. Met. 7.

3. Aph. 26

6. lo. af. 6. tudine & Circulo permanēs.

2. Met. 2.

Defi.

Est pudendi præter naturam erectio. Est genitalis affectus cum tentigine, tēsis omnibus particulis inflammatis. Sunt quibus & seminis eiectio fit cum voluptate, hi mente turbantur, Causa. Repletio ex flatu in neruo cauernoso, vt plurimū ex Arterijs repletis & dilatatis, aliquando genitis in parte, sed rarius: ex

6. lo. af. 6. imaginatione venereorū, re-
tētionē seminis: ex calefactio-
ne Lumborum, vt iacentibus
in Renes: Ex vsu medicamen-
torum & ciborum ad venerē
facientium. Impleri cauerno-
sum neruum flatuoso spiritu
ex humore semicocto, crasso,
& glutinoso, vbi calor natura-
lis imbecillior est: vnde hali-
tus crassior quā vt transpira-
re possit, præcipue si particula
densior est reddita. Aliquādo
humor frigidus, crassus, & glu-
tinus a vehemētiori calore

in

De Morb. Genit. 429

in flatus crassos attollitur. At raro ab initio id cōtingit, sed in processu tēporis ex Arterijs etiam substantia spermatica aut alij humores succedunt, vnde inflāmatio oritur, & conuulsio. Aet. inquit, de Priapismo: esse auctiōem in longum & spissum citra veneris appetentiā, cum inflammationem quandam & dolo-rem facit, vt in neruorum distensione. Signa sensui patent. Gigni in parte flatū ex eo iudicat Galen. si præcedat palpitatio. Paul. differre Satyri-
sim à Priapismo: Satyriasim
palpitationem esse ex aliqua
vasorū seminis affectione in-
flammatoria, cū tensione, quæ
nisi finiatur, in resolutionē va-
sorū seminalium finit, aut
conuulsionem. Priapismū au-
tem esse perpetuū & firmum
genitalis incrementum citra
veneris appetentiā. Sed Saty-
ria apud Arist. est, in quo præ
abun-

6. lo. af. 6.

4. Ge. an. 3

abundantia fluxionis aut flatus crudi in partes faciei decumbētis facies animalis diuerſi, & Satyri apparet. Alia vero eſt cutis & Præputij inflammatio, in qua Glans tegitur, vt nudari nequeat, de qua Celf. Prognostica. Si cito non curetur, conuulſi pereunt, Vētre inflato cum sudoribus frigidis, vt in ceteris conuulſionibus. Curatio: Ad plenitudinē Venæ ſectio in brachio niſi puer ſit. nā flatus cum ſanguine exit: vt in Palpitatione Cordis. Si prauī humores adſint in toto, purgatio cōuenit per ſuperiora magis ad reuellendum: Aet. abſtinendum in totū à purgationibus efficacioribus: ſed Clyſteres molles conueniunt ex decocto Betæ, Maluæ, & Mercurialis. Frictiones multæ, & dimotiones. Balneum ex digerentibus calidis & ſiccis: Cibi abſtinētia: Decoctū Cōcharum, nā Aluū
mo-

14. Met. 7
8.

De Morb. Genit. 43

mouent. Inedia vsque ad tres dies: Postea cib' frumētaceus paucus, potus aquæ: Cauere infantia, & Vrinam cientia.

Ad Lûbos & Genitale vsq; ad anum Refrigeraria, efficaciora ad Lumbos. Solanum, Portulaca, Hyoscyamus, Sēperuiuum: Ad Colē mitiora. Lithargyrus, Cimolia, Cerussa ex aceto, aut Posca, aut aqua. Gal. Solo cerato Rosato in tribus diebus curatū quendā post sanguinis missionem ex aqua frigida ad Lûbos, & Pudendum. Aliū ex oleo Chamamelino. In potu semen extinguētia: Nymphaeæ radices, semen Viticis, semē Rutæ, ad siccandos humores relictos. At si flatus digerētibus & siccantibus dissoluuntur, nō conueniunt refrigeraria & astringētia nisi in principio. An flatus, qui aliunde ferūtur, solis repellentibus egent, non qui in parte nascuntur? Idē in tumore

12. Met. 9.

more linguæ cōtingere patet.
 14. Met. 8. Nā solo Lactuæ succo cura-
 tus fuit quidam, remedio in
 somnis reuelato. Nam vitium
 est in latitudine vasorū, quod
 solis astringentibus curatur.
 Si relictī humores fuerint,
 concoquentibus & digerenti-
 bus vtendum, vt in ceteris
 inflammationibus.

*Testiculorum Constitutio.**Cap. 33.*

Testiculi Didymi appella-
 ti, quia gemini in eodem
 Ar. Me. 9. scroto sunt. Gal. inter partes
 principatum tenentes nume-
 Sem. 15. rat. Nam vt Cor viuendi prin-
 cipium est, sic Testiculi bene
 viuēdi, quia robur addunt, vt
 patet in exectis ob priuatio-
 nē alterius originis insiti ca-
 loris. Paradoxum hoc à nemi-
 ne antiquorum traditum est.
 Nam seminis generatio apud
 antiquos in toto corpore fit,
 maxime in Capite & Spinali
 medulla apud Hipp. Et idem
 Gal.

Gal. tradit in omnibus Venis, & Arterijs fieri. Testes & Genitalia esse locum secretionis eius excrementi. Nam ex spinali medulla in Renes & vasa seminalia descendere ad pudenda traditur in libro de Genitura. Paul. Testium nervi, inquit, quos Parastatas vocant, à quibus pendent genitales partes, spinalis medullæ ex cerebri mēbrana propagines sunt cum Venis arteriosis ad Testiculos pertinentes, per quos semen in naturalia permeat. Idē Testiculum describit substantiam glandosam, fragilem, ad genitricem seminis effectam. An vt Renes Urinam gignere dicuntur, quia illam per concoctionem separant à sanguine, sic Testes seminale excrementum? Quod pulchre ostendit Arist. cum inquit. Replica-
tionis meatus pars altera sanguinea, qua recipitur materia seminis, vasa scilicet spermati-

Ae. 29. 5.

de Gen.

1. Sem. 12.

1. Ge. 17.

18.

1. Ge. 17.

6.

t ca

2. Ge. an
12.16. vs. pa.
10.

ca deferentia, Vena & Arteria
ex Caua & Aorta iuxta Lum-
bos: altera exanguis, qua factū
iam semen transit, idest vasa
eiacularia: vt ex Renibus vasa
Vrinaria. Quod & alibi expref-
sus dixit: Testes operimento &
velamine egent, tum vt seruen-
tur, tum vt semen genitale per-
ficere possint. Nō igitur solum
prebent vsum perpendiculorū,
vt cauillatur Galenus aduer-
sus Aristotelem. Cōmunio au-
tem vasorum seminalium cum
spinali medulla & eius mem-
brana patet ex eo, quod scribit
Gal. ex Venis & Arterijs in spi-
nalem medullam ad tenuē me-
ningē vasa dispensari per singu-
las vertebrae. Descendunt au-
tem vasa spermatica inuoluta
peritonæo implexa & tortuosa
imitar Capreolorum per Ingui-
na ad testiculos: vbi constituūt
appendicem quādam iuxta po-
steriorem testiculi partē, quæ
Epididymis quasi supergemi-
nalis,

nalis, nam Didymos idest Ge-
minalis Testiculus est. Ex eadē *1. Sem. 15*

appendice egreditur vas sper-
maticum, qui neruus vocatur
à Celso, ex Testiculo ducēs se-
men confectum ad genitale lō-
go itinere: eadem via sursum
pet Inguina ascendens, & iuxta
os pubis iterum descendens ad
Vesicæ cervicem, vbi glandu-
læ sunt tali humore plenæ. Duæ
autem membranæ Testiculum
vestiunt ex eadem appendice
ortæ, quarū interna Elythroi-
des quasi virginalis ex vasis se-
minalibus oriri videtur, Exter-
na Darton appellata quasi Co-
riacea ex Peritonæo oritur. *de Vul. d.*

Scrotū Græce Oscheon, ex cu-
te constat cum sua membrana
carnosa sinum cōmunem con-
stituens vtrique Testiculo.

*De inflammatione Testiculo-
rum, & Hernia. Cap. 34.*

Testiculorū vitia, Tumor,
Inflammatio, vel ex ictu,
vel sponte. Hydrops ex aqua in *Ac. aq.*

t 2 Scro-

436 *Artis Medicæ lib. 8.*

Scroto, pueris contingit quando parui sunt, qui ætatis progressu euanesceat. Hernia aquosa à recētoribus vocatur. Hernia flutuosa, cum Scrotum impletur flatu: pertinent ad Hydroperem Ascitem, & Tympanitem. Hernia intestinorum cum labuntur intestina in Scrotum, Ramex vocatur, Græce Enterocæle. Bubonocæle cum in Inguinibus. Epiplocæle cum descendit Omentum. Paulus addit Sarcocæle idest Ramicem carnosum, aut scirrosum, aut varicosum: vitia ad Chirurgiã pertinentia. Causa cur descendant Intestina, aut Omentum est Peritonæi apertio, qua vasa seminaria descendunt. Rupta vocantur. Cōtingit apertio ex motu violento, saltu, aut ponderis eleuatione, qua spiritum cohibere oportet, qua violētia aliquando exprimuntur deorsum Intestina in Scrotum Aut sponte à flatu dilatari potest Peri-

Peritonæum cum multa humi-
ditate fuerit relaxatum. Vt au-
tem descendant humores non
est necesse aperiri Peritonæum:
ideo non proprie Ramex dici-
tur, seu Hernia, si non apertum
sit Peritonæum, vnde Intesti-
na aut Omentum labi possint.
Cū dilatatur amplius quā secū-
dū naturā, prius locus flatu im-
pletur, postea succedunt Inte-
stina: & prius in Inguinibus tu-
mor apparet, postea in Scroto.
Signa inflātionis Paul. Do-
lor, Durities, Feruor, Rubedo,
aliquando febris. Si in Scroto,
dolet primo contactu, si in Te-
sticulo, nō dolet leui tactu, sed
si validius premas, durities
profundior. Quauis Testes in-
fra Inguina sint, statim tamen
febrem accendunt ob vicinira-
tem vasorum magnitudine in-
signi ex Renibus. Pulsus durus
ob tunicam Elythroidem Peri-
tonæo adnatam & minor. Ex
Testiculo non ita durus & ma-
ior

4. Praef. 10

ior ob vasa. In Scroto Erysipelas magis, sine febre. In Testiculo Phlegmone, aut Scirrosus tumor, durities ex quocunque humore ob tensionem intratunicam Elythroidem ex vasis nascētem. Intra Darton minor tensio ex ijs quæ descēdunt ex Peritonæo. Prognostica. Tumores Testiculorum solvunt febrem ardentem Hipp. Pudendi liuor vel Testis intentus. Oppositum videtur tradi in Prognosticis. Si Genitale, & Testes conuelluntur, dolor, & periculum lethale. An aliud est Testis intentus, idest durus præ tumore: & contractus idest conuulsus? hoc enim lethale est: seu contractio in genitali sit, seu in Testibus? Tumor autem aut dolor fortis Testis, tussim finit, quod significat communionem pectoris, mamarum, genitaliū, vocis. Tussis sicca ijs qui Testes affectos habent, Et ex tussi solutio fit, Vena secta ad Testem.

*De Iud.**2. Epi. 2.**4. Acu. 17**2. Prog. 10**2. Ep. 1. &**5.**4. Epi. in
fin.*

Cu.

De Morb. Genit. 439

Curatio inflammationis Paul.
Sanguinis missione ex Talo: An
in plenitudine totius prius re-
uellere melius est ex interna
brachij? Si morbus magnus fe-
brem faciens, purgatio vt in
Priapismo. Localia ad Testem
initio repellentia & dolorem
sedantia ex Rosaceo: postea
digerentia: Si ardor infestat,
Hyoscyami folia cū farina Tri-
tici, aut Cicerum cataplasma.
Harundinis folia cum Cucur-
bita cruda: Senecion: Corian-
drum viride. Digerētia: farina
Fabarū in Vino diluto & Vuis
passis pinguibus demptis aci-
nis: Cuminū, Asphodeli radix,
Semen Lini, Fœnogræci, Lilij
radix ex Mulsa: Farina Hordei.
Si morbus vetustus est cum du-
ritie: Emollientia. Cucumeris
syl radix cocta in Mulsa & læ-
uigata cum Lolij farina: Vua-
rum passarum pulpa: Cicer fer-
uefactum: Cuminum, Sulphur,
Nitrum, Resina cum Melle. Ce

t 4 rata

rata ex Plumbagine cocta in oleo, cera & Resina Colophonia: Oleum Anethinum, Rosaceum, Resina picea, Cera, Cuminum, Stercus Asini: Superponitur ex linteo & lana. Oleum omphacinum, vel Butyrum cum Resina æquali pondere.

Ad Aquã, quæ cognoscitur cute translucida, si extra tunicas intra Scrotum, punctione tuto educitur. Si intra Elythroidẽ aut Dartõ periculosius scinditur. Paulus docet Chirurgiã.

Ad Herniam Intestinatorum, aut Omenti: quæ cognoscitur, quia tumor in Inguine est cum stat, desidet cum iacet. Initio flatu tantum impletur Inguen, postea descēdunt interanea rupto Peritonæo: Si sola dilatatio ex humiditate vt pueris, & ijs, qui aquis palustribus vtuntur, solus flatus tumorem facit in Inguine. In grandioribus insanabilis est, præcipue Ruptura: non enim glutinari potest. Sed
sola

sola Chirurgia Testiculi abscissione, & cicatrice obducta in Inguine clauditur Peritonæū: aut sine abscissione: impulso testiculo supra Inguē, vratur vsq; ad os pubis: sic enim cicatrice obducta claudetur locus intactis vasis spermaticis, vnde nō prohibetur generatio: In pueris per astringentia curari potest. Paul. in potu Cupressi decoctum cum Vino aut puluere globulorum insperso, vt triginta diebus in lecto maneat: Super Inguina intromissis optime Intestinis imponatur Malicorium, Galla incocta in Vino, & læuigata, & perfusa prius aqua frigida. Aliud. Ulmi Vesicæ in Vino coctæ: aut liquor glutinosus qui in iisdem Vesicis reperitur. Emplastrum de Pelle arietina efficacissimum est. Sed fascia & puluillo superposito astrictus locus continendus est. Quo solo egent quamdiu locus apertus est. Caueant

t 5 inte.

interim flatuosa, abstineant à copioso Vino & Balneis, & valido motu.

De Hæmorrhoidibus. Cap. 35.

Atr. 61. 4. **H**æmorrhoids idest sanguinis fluxus, symptoma est, cum per Venā sedis natura excernit humorem atrum sanguini mixtum. Ab hoc Vena sedis

7. Met. 11. nomen accepit. Nam si ab alijs partibus sanguis fluat, vt nari- bus, Hæmorrhagia vocatur.

3. Aph. 30 Plerisque autem ora Venarum in sede aperta cōsueuerunt expurgare superflua, præcipue in ætate declinante. fit cum atra bilis repente tota descendit ad

De Ham. Venas sedis. Hipp. inquit: Cum bilis aut pituita ad Venas re- cti Intestini decubuerit, sangui- nem qui in Venis est, calfacit: Venæ calfactæ ex vicinis Venu- lis sanguinem attrahunt, qui- bus repletis interna sedis pars intumescit, & capita Venarum

su-

supereminēt, & partim dum à
stercore exeunte comprimun-
tur, partim dum à coaceruato
sanguine coguntur, sanguinem
eiaculantur: maxime quidem
cum stercore, aliquando vero
etiam sine stercore. Cognoscun-
tur facile: nam supereminēt in
internam recti Intestini partē
velut Vux acini liuidæ, & cum
sedes extrahitur, sanguinem
fundunt. Hinc colligere licet
huiusmodi Venas ex ijs esse,
quæ ex Vena Portæ per Omen-
tum ad Lienem tendunt, & ad
Intestinum rectum faciem san-
guinis expurgant. Ad partem
autem sedis externam, non ex
Vena Portæ, sed ex Vena Caua
rami distribuuntur: in quo lo-
co rarius Hæmorrhoides infe-
stant, sed sæpius carnis excre-
scentia, æquiuoce Hæmorrhoi-
des vocatæ: sunt enim Thymi,
aut ficus, à Latinis Mariscæ vo-
catæ, cristarum similitudine:
ortæ ex rimula, aut exulcera-
tione

tione aliqua: Similes affectus in mulieribus ad os Vteri adnatos Paulus & Aet. Vteri Hæmorrhoidas vocant, & similem curationem habent. Oriuntur etiam hæc eadem in parte interna sedis: de quibus Hipp. inquit. Adnoscuntur ad Venam sanguifluam extuberantem, veluti Mori fructus. Quod si extra valde prominuerit extuberantia, carnis tectorium super ipsam nascitur. Prognostica:

6. Aph. 11

52.

Atrabile vexatis & Renū passionibus Hæmorrhoides superuenientes, bonum: nam sanguinem foeculentum excernunt.

Gal. A diutinis sanato Hæmorrhoidibus, si vna non seruetur, periculum est, Aquam inter cutem, vel Tabem aduenire. Ob resectas huiusmodi Venas sæpe Melancholia corripuntur, vt

Atr. 61.4

4. Praef. 9.

resectis varicibus. Ex immodica euacuatione Hæmorrhoidarum, aut insolita suppressione Hydrops oritur, vt in menstruis.

struis. Curatio: ad immodicam
euacuationem, reuellere ad su-
periora. Vene sectio in brachio
ex basilica sinistra: vt reuulsio
fiat à Liene mittente. Purgatio
per superiora, Hepati roboran-
tia frigida astringentia: in vi-
ctu & medicamētis. Rhas. Om-
phacium: Cidonia, Trocisci de
Carabe Ras. Vinum in magna
imbecillitate, & carnes. Parti
affectæ Ischemon medicamen- *4. Acu. vl.*
tum, idest sanguinem suppri-
mēs: Fici succus lana exceptus:
Porri succus: Aloe. Thus cum *5. Met. 4.*
pilis Leporinis ex albumine
oui. Si ex his non supprimatur:
claudi ostia Venarū nequeunt,
nisi vrantur. Crusta enim geni-
ta sanguinem supprimit: Sed
ablata crusta, reuertitur mor-
bus, nisi caro densa & dura gi-
gnatur. Vrit igitur Hipp. ferra-
mentis ignitis admotis propin-
que at non tangentibus, quam-
uis rectum Intestinū ferre pos-
sit multa huiusmodi tormenta
sine

446 *Artis Medica lib.8.*

sine periculo: quia crassum est.
 At inurenda solum est superfi-
 cies non corpus. Alio modo
 per medicamenta crustam in-
 ducentia, aut glande formata,
 ex Melle cocto additis vehe-
 menter siccantibus: Galla, A-
 lumine, Melātheria, Chalciti-
 de. Aut illinēdo, abscedit enim
 ex his veluti corium exustum.
 Aut digito auellit quancumq.
 supercrescētīā, quam inquit fa-
 cile auelli, & facilius inuetera-
 ta. Si abscedēte crusta, sanguis
 exit, imponendum medicamē-
 tum carnem densam faciēs ex
 flore æris tosto, & in Vrina ma-
 cerato, ac siccato. At ne ex ve-
 hementia medicamentum fiat
 inflammatio, indit Hipp. Inu-
 sitionē, Lentem, & orobum co-
 ctum ex aqua tritum. Deinde
 narcoticum. Nos mitius ex me-
 dulla & pinguedine, aut Sapa-
 lintea imbibentes Glandem
 formamus inspersis pulueri-
 bus siccantibus, & ad putrefa-
 cien-

ciendum addimus oleum Vi-
trioli, aut Sulphuris. Paulus ad
Cæcas hæmorrhoidas, quæ tu-
midæ quidem sunt, sed sangui-
nem non fundunt, applicat ape-
rientia ora venarum: quidam
sanguisugas admouent: at fa-
tius est sanguinem deriuare ad
crura lota quidē prius, vt Gal.
monet ad suppressionem hæ-
morrhoidarum. Si autem in-
flammatiō oriatur in sede, Re- *De Hir. 4.*
pellentibus mitigandus dolor
Vnguento rosato. Populeon,
Vitellum oui assatum cum Vi-
no albo tritum ex cerato Rosa-
ceo exceptum Rasis laudat ad
vehementiores dolores, cum
decocto seminis Lini: addit &
Opiū, Bdellium, Crocum, adi-
pem Gallinæ, Capa alba cocta
cum Butyro, semen Lini deco-
ctum cum Butyro: Oleum se-
minis Lini, Blattæ, vel potius
Scarabei nigri incocti in oleo
Rosaceo. Sed præmittenda Ve-
næ sectio, vbi magna est inflā-
matio.

448 *Artis Medicae lib. 8.*

matio. Victus tenuis sine Vino.
Vt fiat Alui deiection, ex lubri-
cantibus Aluum: ne dura ster-
cora laedant in exitu, Hippo-
crates laudat inter cetera fur-
fures decoctos in cibis. Sed
præcipua curatio ad suppres-
sionem Hæmorrhoidarum, &
ad Varices, humoris melan-
cholici euacuatio per medica-
menta sæpius repetita, & victu
boni succi.

De Fistulis Sedis. Cap. 36.

Fist.

Fistula sinus est callosus ha-
rundinis cavitati similis,
Paul. Vt plurimum ex absces-
su ortum ducens. Hipp. in li-
bro de Fistulis fieri ex confu-
sionibus & tuberculis, in remi-
gatione, equitatione, congre-
gato sanguine ad nates prope
sedem, qui putrescens distri-
buitur ad partes molles, & re-
ctum Intestinum. Cum autem
Inppuratus eruperit, in fistulā
abit,

abit, & manat sanie, & ftercus
per ipsum fluit, & flatus. Qua-
si fistula dicatur, etiam si callū
nondum contraxerit, quod in
progressu tēporis fit: & tūc hu-
mor tenuis excernitur certis
temporibus. Recens igitur cu- *Def.*
rationem recipit facilem ante
quam callum contraxerit. Po-
stea aut incurabilis est, aut cū
difficultate. Si dimittantur nō
curati, moriuntur. Hipp. Cu- *Fist.*
ratio. Dum abscessus crudus
est, quam citissime secandus,
antequam suppuretur ad Inte-
stinum rectum. Si vero iam
eruperit ad Intestinum: intro-
mittenda medicamenta, vehe-
menter siccantia, & glutinan-
tia. In potu quidem Sefelis
radicem tenuissime tritam,
aqua affusa per quatuor dies
maceratam, eamque aquam
trium cyathorum mēsurā Mel-
le admixto æger bibat ieiun-
us eadē aqua intromissa in se-
dem Ascarides purgantur: gi-
gnun-

gnuntur enim ex sanie.

Postea intromittendus est penicillus ex linteo byssino inuoluto ea longitudine, quam perueniat ad Intestinum erosum, qui imbuatur ex succo Thymali magni, idest Caraciæ, & insperso flore æris tosto. Est autem flos æris, quam vulgo Raminam vocant, fabri ærarij: Cum enim ollus æneas, aut alias æris massas afflatu carbonum ad ignitionem perduxerint, & in aqua extinxerint, abscedunt ramenta quædam, quas Palas vocat Plinius, & Dioscorides Psegmata. Dicebatur autem Pala Græcis Auri purgati glebula non maior semilibra: unde nomen ad alia translatum est. Et reperio apud Hipp. Palas vocari Peponis masculas, quas detracto cortice ex aqua frigida febricitantibus exhibebat ad sitim extinguendam, idest Cucumeris nostri. Sed flore æris medicamentum

3. Mo.

to apud Hipp, in frequentissi-
mo usu ad consolidanda vlce-
ra in faucibus & Pudendis, ho-
die priuantur Medici, quia flo-
rem æris non cognoscunt: pu-
tantes minutum quid esse mi-
lio simile. At hæc similitudo
manifesta est infracturis, vidē-
tur enim glebulæ, quæ in æris
extinctione abscedunt, ex mi-
nutis granulis constare: vt in-
nuie Dioscorides, cum inquit:
Dum teritur, Milio simile. Vt
autem Intestinum ad medica-
mentum comprimatur, impo-
nenda est glans cornea in se-
dem: Sinatur penicillus per
quinque dies, si interim ad fæ-
ces exonerandas cogantur exi-
mere, iterum intromittatur, ad
refrigerium autē illinatur po-
dex ex Cimolia. Sexta die exi-
matur penicillus ex carne: &
sola glās intromittatur ad in-
testinū insperfo Alumine, do-
nec liquescat, & podicem Myr-
ra illines, donec coalescat.

Alia

Alia etiā ratione corrodit fistulam intromisso Lino crudo intorto & equinis fetis inuoluta, vt singulis diebus intorqueatur, donec fistula corrodatur. Postea per spongas tritas & Melle imbutas purgat, & flore æris glutinat: interim aqua calida abluere cum spongiæ eximuntur. In septem diebus, inquit, corrodī fistulam. Paul. corrodit ex Veratro nigro duobus aut tribus diebus: Colluit autem Amurca cocta. Deinde carne explet ex Myrrha & Aloe. Vtitur etiam excisione. Sed cauere oportet ne musculus Sphinctir excidatur, nam sequitur inuoluntaria excrementorum excretio. Ad vlcera & rimas in sede ficcantia sine morfu, quia locus sensus facile inflammatur, & putrescit. Cadmia, Cerussa, Lithargyrus ex Butyro, oleo Myrthino. Verbasum tritum cum Rosacco: efficacius addi-

ta

De Morb. Genit. 453

ta Squama æris. Suffumigia
ex Thure, Aloe, Cinabrio super
Carbones. Testudinis testa suf-
fita. Ad Callosa vlcera: Glan-
des ex Galbano, Ammoniaco,
Bdellio, Sepo hircino additis
ficcantibus. Supercrescentes
carnes, si magnæ fuerint, ferro
auferendæ, postea inurendæ. Si
paruæ & tenui basi, filo appre-
hendendæ: Si lata basi, putrefa-
ciente medicamento attingen-
dæ, vt oleo Vitrioli. Alternan-
dum Galbano ob dolorē: & mi-
tioribus Anodynis. Si procidat
sede, lauandus primo locus *§. Cat. 8.*
ex Vino austero: & inspergen-
dus puluis astringens ex aridis
austeris: Galla, Malicorium,
Rhus coriariorū, Balaustium,
Rosæ, cortex Pini, Cupressi pil-
lulæ, Plumbum vstum, Lith-
gyrus, fructus Ericæ, Thus.
Deinde intromittenda est se-
des calidis linteis locum fo-
uendo.

Pe-

Peroratio.

VOS, qui auctoritatem
exercendi Medicinam
adepti estis, iusti dispensatores
estote huius doni Dei, nemini
negantes, præcipue egenis, non
lucri causa. Sed ijs tantum ne-
gate, qui Medicinam contem-
nunt. Non enim conferenda
sunt beneficia in inuitum. Stu-
dete autem, ne ob ignoran-
tiam vestram aut vitia, cui-
quam occasionem contemnen-
di artem hanc optimam præ-
beatis. Quod proculdubio suc-
cedet, si quæcunque in arte
continentur, non in perniciem
vllius feceritis, sed ad morbos
propulsandos, & vniuscuiusq;
salubritatem conseruandam di-
rexeritis. Non experimentis
nouis, neque noua doctrina
corpus humanum in pericu-
lum ducentes: sed ex auctori-
bus approbatissimis observa-
tio.

tiones fideles & iudicia sincere colligentes : quos cum diligentia euoluere debetis , vt si quando optatum finem sanitatis non consequuti estis , culpa vacetis. Mihi autem, sicubi declinare ab antiquorum decretis conspexeritis , ne credite : non enim is sum , cuius auctoritate corpus humanum omnium præstantissimum tractare sine crimine possitis . Iurastis præterea non iusiurandum Hippocratis, quod antiqui faciebant dijs falsis, sed Deo vero Domino Nostro Iesu Christo , atque eius Vicario in terris , qui Dei Maiestatem præferens cum potestate magna omnes iudicat : Iurastis inquam Catholicam fidem à Sancta Romana Ecclesia promulgatam obseruatueros , ad laudem & gloriam omnipotentis Dei . Hoc mementote.

F I N I S.

